REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE LA SANTE

FORMULAIRE THERAPEUTIQUE TUNISIEN



Direction de la Pharmacie et du Médicament

Centre collaborateur de l'OMS en matière d'enregistrement et de réglementation pharmaceutique http://www.dpm.tn

3^{ème} Edition 2012 Ce document a été élaboré par l'équipe de la Direction de la Pharmacie et du Médicament suivante : Dr Kamel Iddir, Pr Nadia Fenina, Mr Mohamed Imed Lassoued, Mr Raouf Zmerli, Mlle Samira Zeghal, Mr Mohamed Haltiti, Mme Imen Zemni, Mr Youssef Khedher, Mr Mokhtar Mzoughi, Mme Narjess Harzallah, Mme Soumaya Miled Hlaili, Mme Jamila Khrouf, Mlle Zeineb Ben Othman, Mlle Besma Ben Fredj, Mme Lioubov Blinnikova.

Remerciements:

La Direction de la Pharmacie et du Médicament remercie particulièrement l'Organisation Mondiale de la Santé pour sa contribution à l'édition de cet ouvrage et à sa réalisation.

Préface

L'usage irrationnel des médicaments engendre un gaspillage important des ressources initialement prévues pour le développement de la santé.

Ce formulaire s'adresse aux médecins, pharmaciens ainsi qu'à tous les autres professionnels de santé dans le but d'améliorer le rapport coût-efficacité des soins. Ainsi, ils ont à leur disposition l'information sur l'ensemble des spécialités pharmaceutiques agrées en Tunisie, répertoriées par classe pharmacologique et par Dénomination Commune Internationale avec indication de leurs prix.

La présente 3éme édition de cet ouvrage de référence, réalisée par l'unité de la pharmacie et du médicament et qu'il me plait d'en signer la préface, illustre le dynamisme et la volonté d'assurer une meilleure prise en charge thérapeutique des différentes pathologies, et de répondre aux objectifs de promotion d'un usage rationnel des médicaments.

Enfin, je remercie l'OMS qui, consciente de l'importance que représente pour la Tunisie la rationalisation des dépenses de santé, contribue par son soutien à la publication de cet ouvrage et à notre politique de santé.

Le Ministre de la Santé

Dr Abdellatif El Mekki

Introduction I - OMS

L'élaboration des formulaires thérapeutiques nationaux est un élément majeur de la stratégie de l'OMS pour la promotion de l'usage rationnel des médicaments par les professionnels de santé.

L'usage rationnel des médicaments suppose que les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur état clinique, dans des doses qui conviennent à leurs besoins individuels, pendant une période adéquate et au coût le plus bas pour eux-mêmes et leur collectivité.

L'usage irrationnel ou non rationnel des médicaments est un problème mondial majeur. L'OMS estime que plus de la moitié de l'ensemble des médicaments sont prescrits, distribués ou vendus de manière inappropriée. Les types courants d'usage irrationnel des médicaments sont:

- l'usage d'un trop grand nombre de médicaments par patient (poly pharmacie) ;
- l'usage inapproprié d'antimicrobiens, souvent en posologies inadéquates, pour le traitement d'infections non microbiennes;
- l'usage abusif de produits injectables quand des formulations orales seraient plus appropriées;
- la non conformité des pratiques de prescription aux directives thérapeutiques ;
- l'automédication inappropriée et fréquente de médicaments disponibles uniquement sur ordonnance.

Je tiens donc à féliciter la Direction de las Pharmacie et du Médicament, qui est entre autre un Centre Collaborateur de l'OMS en matière d'enregistrement et de réglementation pharmaceutique, pour cette 3ème mise à jour du Formulaire Thérapeutique Tunisien. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le processus de promotion de l'usage rationnel des médicaments en Tunisie, et un exemple des bénéfices pour la santé de Tunisiens suite à une collaboration étroite entre le Ministère de la Santé et le bureau pays de l'OMS.

Le Représentant de l'OMS en Tunisie

Dr Stefano LAZAARI

Introduction II – DPM/MSP

Le formulaire thérapeutique tunisien est édité par la Direction de la Pharmacie et du Médicament. L'objectif de ce guide est de promouvoir l'Usage Rationnel des Médicaments en procurant aux personnels de santé une information indépendante sur les médicaments enregistrés en Tunisie. Cette information tient compte non seulement des propriétés thérapeutiques mais également de l'aspect économique en indiquant les prix publics de chaque spécialité pharmaceutique commercialisée dans le secteur officinal.

La mention H qui figure à la place du prix pour certaines spécialités indique que celles-ci sont à usage hospitalier.

Pour faciliter l'accès à des informations complètes et promouvoir une approche comparative, les spécialités pharmaceutiques sont regroupées en différents chapitres sur la base de leurs propriétés thérapeutiques et pharmacologiques. Chaque chapitre commence par une introduction qui vise à situer les médicaments présentés et à donner les indications générales quant à leur emploi.

Cette troisième édition, permet un accès aux informations recherchées pour chaque médicament à travers sa Dénommination Commune Internationale ou son nom commercial, son dosage, sa forme, sa présentation et sa classification en médicaments vitaux, essentiels, intermédiaires et confort.

Cette approche vise à promouvoir l'utilisation des médicaments génériques et contribue ainsi à la maîtrise des dépenses de santé.

Le Directeur Général de la Pharmacie et du Médicament

Dr. Kamel IDDIR

Table des matières

1 SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE	14
1.1 MEDICAMENTS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE	14
1.1.1 Glycosides cardiotoniques	14
1.1.2 Inhibiteurs des phosphodiesterases	15
1.2 ANTIANGOREUX	
1.2.1 Dérivés nitrés	16
1.2.2 Molsidomine	17
1.3 ANTIARYTHMIQUES	17
1.3.1 Classe I	
1.3.1.1 Classe IA	18
1.3.1.1.1 Disopyramide	
1.3.1.2 Classe IB	
1.3.1.3 Classe IC 1.3.2 Classe II	
1.3.2 Classe II	
1.3.4 Classe IV	
1.4 ANTIHYPERTENSEURS	
1.4.2 Antagonistes du calcium	
1.4.3. – Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA)	
1.4.4 Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II	
1.4.5 Alpha-bloquants	
1.4.6 Antihypertenseurs à action centrale	
1.4.7 Associations	29
1.5 DIURETIQUES	
1.5.1 Diurétiques avec perte de potassium	
1.5.1.1 Thiazides et apparentés	
1.5.1.2 Diurétiques de l'anse.	
1.5.2 Diurétiques d'épargne potassique	
1.5.4 Préparations de potassium à usage oral	
1.5.5 - Médicaments de l'hyperkaliémie	
1.6 Médicaments de l'hypotension	
1.6.1 Médicaments de l'hypotension aiguë	
1.6.2 Médicaments de l'hypotension chronique	
1.6.3 Epinephrine	
1.7 MEDICAMENTS DES TROUBLES VASCULAIRES	37
1.8 SUBSTANCES VEINOTROPES ET CAPILLAROTROPES	
1.9 MEDICAMENTS ANTITHROMBOTIQUES	
1.9.1 Antiagrégants	
1.9.2.1 Afficoagulants 1.9.2.1 Héparines	
1.9.2.1.1 - Héparines non fractionnées.	
1.9.2.1.2 Héparines à bas poids moléculaire	
1.9.2.2 Antagonistes de la vitamine K	42
1.9.3 Thrombolytiques	43
1.10 ANTIHEMORRAGIQUES	43
1.10.1 Facteurs de coagulation	
1.10.2 Vitamine K	
1.10.3 Hémostatiques non spécifiques	44

1.11 HYPOLIPIDEMIANTS	
1.11.1 Fibrates	
1.11.2 Statines	45
2 SYSTEME GASTRO-INTESTINAL	48
2.1 MEDICAMENTS DE LA PATHOLOGIE GASTRIQUE ET DUODENALE	48
2.1.1 Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique	48
2.1.1.1 Antihistaminiques H2	
2.1.1.2 Inhibiteurs de la pompe à protons	
2.1.2 Médicaments renforçant les défenses de la muqueuse gastroduodénale	
2.1.3 Antacides	
2.1.4 Divers	54
2.2 SPASMOLYTIQUES	
2.2.1 Anticholinergiques	
2.2.2 Spasmolytiques musculotropes	55
2.3 FERMENTS DIGESTIFS	56
2.4 MEDICAMENTS POUR LE FOIE ET LA VESICULE : CHOLAGOGUES, CHOLERETIQUES ET HEPATOTROPES	56
2.5 ANTIEMETIQUES	56
2.5.1 Gastroprokinétiques	
2.5.2 Antagonistes 5HT ₃	
2.5.3. – Antihistaminiques H ₁	57
2.6 LAXATIFS	
2.6.1 Laxatifs de lest	
2.6.2 Paraffine liquide	
2.6.3 Laxatifs osmotiques	
2.6.3.1 Lactulose et sorbitol	
2.6.4 Laxatifs à usage rectal.	
2.7 ANTIDIARRHEIQUES	
2.7.1 Adsorbants et astringents	
2.7.2 Probiotiques	
2.7.3 Freinateurs du transit intestinal	
2.7.4 Antisecretoires intestinaux	
RACECADOTRIL	62
2.8 MEDICAMENTS DES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN	62
2.9 ANTISEPTIQUES INTESTINAUX	63
2.10 MEDICAMENTS CONTRE LES HEMORROÏDES	64
3 SYSTEME URO-GENITAL	65
3.1 MEDICAMENTS AGISSANT SUR LA VESSIE	65
3.2 MEDICAMENTS DE L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	
3.2.1 Alpha1-bloquants	
3.2.3 Médicaments à base de plantes	
3.3 MEDICAMENTS DE L'IMPUISSANCE	
4 SYSTEME RESPIRATOIRE	
4.1 MEDICAMENTS DE L'ASTHME ET DE LA bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)	
4.1.1 Sympathicomimétiques	
U 1	
4.1.4 Théophylline et dérivés	

4.1.5 Corticostéroïdes à inhaler	
4.1.6 Sympathicomimétique + corticostéroïde	
4.1.7 Inhibiteurs de la libération de médiateurs	
4.1.8 Autres antiasthmatiques	73
4.2 ANTITUSSIFS, MUCOREGULATEURS ET EXPECTORANTS	
4.2.1 Antitussifs	
4.2.1.1 Antitussifs narcotiques	
4.2.1.2 Antitussifs non narcotiques	
4.2.2 Mucolytiques et expectorants	
4.2.2.1 Dérivés de la cystéine	
4.2.2.2 Bromhexine.	
4.2.2.3 Mucolytiques et expectorants divers	77
4.2.3 Associations	77
4.3 Médicaments Des Rhinites Et Sinusites	
4.3.1 Par voie générale	
4.3.2 Préparations nasales	
4.3.2.1 Solutions salines	
4.3.2.2 Préparations contre la rhinite allergique	
4.3.2.3 Divers	
5 DOULEUR ET INFLAMMATION	82
5.1 ANALGESIQUES - ANTIPYRETIQUES	
5.1.1 Paracétamol	82
5.1.1.1 Paracétamol	
5.1.1.2 Propacétamol	
5.1.2 Salicylés	
5.1.2.1 Acide acétylsalicylique	
5.1.2.2 Autres salicylés	
5.1.3 – Associations	85
5.2 ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS	86
5.2.1 Dérivés arylcarboxyliques	87
5.2.2 Dérivés arylpropioniques	88
5.2.3 Dérivés indoliques	89
5.2.4 Oxicams	
5.2.5 Fénamates.	
5.2.6. – Pyrazolés	
5.2.7 AINS COX-2 sélectifs	91
5.3. – traitement des maladies osseuses	91
5.3.1 Calcitonine	91
5.3.2 Diphosphonates	92
5.4 Substances diverses	93
5.4.1. – Traitement de fond des rhumatismes inflammatoires.	
5.4.1.1 Antipaludéens	93
5.4.1.2. – D Pénicillamine	
5.4.1.3. – Sulfalazine	93
5.4.1.4. – Méthotrexate	93
5.4.1.5. – Léflunomide	94
5.4.1.6 Inhibiteurs du TNF	
5.4.1.7 Myorelaxants	
5.4.1.8 Traitement symptomatique de l'arthrose	
5.4.1.9 Traitement des dorsalgies essentielles	
5.4.2 Médicaments de la goutte	
5.4.3 Autres analgésiques non morohiniques	
5.4.4 Enzymes à visée anti-inflammatoire	97

6 ANALGESIQUES MORPHINIQUES	98
7 SYSTEME NERVEUX	101
7.1 HYPNOTIQUES, SEDATIFS, ANXIOLYTIQUES	
7.1.1 Benzodiazépines	101
7.1.2 Médicaments apparentés aux benzodiazépines	
7.1.3 Divers	
7.2 NEUROLEPTIQUES	
7.2.1 Phénothiazines	
7.2.3 Butyrophenones et diphenypipendines	
7.2.4 Autres neuroleptiques	
7.3 ANTIDEPRESSEURS	108
7.3.1 Antidépresseurs tricycliques, substances apparentées et ISRS	
7.3.1.1 Premier groupe	
7.3.1.2 Deuxième groupe	
7.3.3 Autres antidépresseurs	
7.4 ANTIPARKINSONIENS	
7.4.1 Lévodopa	
7.4.2 Agonistes dopaminergiques	114
7.4.3 Anticholinergiques	
7.4.4 Inhibiteur de la catéchol-O-méthyltransférase	
•	
7.5 ANTIEPILEPTIQUES	
7.5.2 Carbamazépine	
7.5.3 Barbituriques et apparentés	
7.5.4 Autres antiépileptiques	118
7.6 ANTIMIGRAINEUX	
7.6.1 Médicaments de la crise migraineuse aiguê	
7.6.2 Médicaments prophylactiques	
7.7 ANTIHISTAMINIQUES HI	
7.8 MEDICAMENTS DES ETATS SPASTIQUES	123
7.9 MEDICAMENTS DE LA SCLEROSE EN PLAQUE	123
7.10 MEDICAMENTS DE LA MALADIE D'ALZHEIMER	123
7.11 MEDICAMENTS CONTRE LE TABAGISME	124
7.12. – Addenda : Dérivés amphétaminiques	
8 SYSTEME HORMONAL	126
8.1 HORMONES CORTICO-SURRENALES ET HORMONE CORTICOTROPE	126
8.1.1 Cortisone et hydrocortisone	
8.1.2 Glucocorticoïdes de synthèse	
8.1.2.1 Bétaméthasone	
8.1.2.2 Cortivazol	
8.1.2.4 Méthylprednisolone	
8.1.2.5 Prednisolone et prednisone	129
8.1.2.6 Triamcinolone	129
8.2 MEDICAMENTS DE LA THYROÏDE	
8.2.1 Hormones thyroïdiennes	
8.2.2 Médicaments antithyroïdiens	130

8.3 HORMONES SEXUELLES	
8.3.1 Oestrogènes	
8.3.2 Modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes	133
8.3.3 Inhibiteurs de L'aromatase	133
8.3.4 Progestatifs	134
8.3.5 Estroprogestatifs	136
8.3.5.1 Associations à usage contraceptif	136
8.3.5.2 Associations à usage substitutif	137
8.3.6 Androgènes et antiandrogènes	
8.3.6.1 Androgènes	
8.3.6.2 Antiandrogènes	
8.3.7 Gonadotrophines et divers	
8.3.7.1 Gonadotrophines	
8.3.7.2 Danazol	
8.3.7.3 Hormone modulant l'action des gonadotrophines	
8.3.7.3.1 Analogues des gonadotrophines	
8.3.7.3.2 Antagonistes des gonadotrophines	
8.4 MEDICAMENTS ANTIDIABETIQUES	142
8.4.1. – Insulines et analogues	
8.4.1.1 Insulines à action rapide	
8.4.1.2 Insulines à durée d'action intermédiaire	
8.4.1.3 Insulines à durée d'action prolongée	144
8.4.1.4 Associations	
8.4.2 Sulfamidés hypoglycémiants	
8.4.3 Biguanides	
8.4.4. – Associations :	
8.4.5 Inhibiteurs des alpha-glucosidases	
8.4.6 Autres antidiabétiques	
8.4.7 Médicaments de l'hypoglycemie	
8.5 Autres médicaments du système hormonal	
8.5.1 Erythropoïétine et analogue	
8.5.2 Hormones hypophysaires et hypothalamiques	
8.5.2.1 Hormone antidiurétique	
8.5.2.2 Hormone de croissance	
8.5.2.3 Somatostatine et analogues	149
. – ANTI-INFECTIEUX	150
9.1 ANTIBACTERIENS	
9.1.1 Antibiotiques bêta-lactamines	
9.1.1.1 Pénicillines	
9.1.1.1.1 Pénicillines sensibles aux bêta-lactamases	
9.1.1.1.2 Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases	
9.1.1.1.3 Aminopénicillines	
9.1.1.1.4 Acyluréidopénicilline	
9.1.1.1.5 Autres pénicillines	
9.1.1.2 Céphalosporines	
9.1.1.2.1 - Cephalospornies 9.1.1.2.1 - Premier groupe	
9.1.1.2.2 Premier groupe	
9.1.1.2.3 Deuxieme groupe	
9.1.1.2.3 Troisieme groupe	
±	
9.1.1.4 Bêta-lactame + inhibiteur des bêta-lactamases	
9.1.2 Aminosides	
9.1.3 Macrolides	
9.1.3.1 Erythromycine	
9.1.3.2 Autres macrolides	
9.1.4 Clindamycine et lincomycine	
9.1.5 Quinolones	165

9.1.6 Sulfamides antibactériens	
9.1.7 Tétracyclines	
9.1.8 Rifamycines	
9.1.9 Antibiotiques divers	169
9.1.9.1 Acide fusidique	169
9.1.9.2 Glycopeptides	170
9.1.9.3 Fosfomycine.	170
9.1.9.4 Thiamphénicol	170
9.1.9.5 Polymyxines	171
9.1.9.6 Pristinamycine	171
9.1.10 Antiseptiques urinaires	171
9.1.10.1 Nitrofuranes	171
9.1.10.2 Nitroxoline	172
9.1.11 Antituberculeux	172
9.1.11.1 Isoniazide	172
9.1.11.2 Rifampicine	172
9.1.11.3 Pyrazinamide	173
9.1.11.4 Ethambutol	173
9.2 ANTIMYCOSIQUES	173
9.2.1 Polyènes	
9.2.2 Griséofulvine	
9.2.3 Dérivés azoliques	
9.2.4 Terbinafine	
9.3 ANTIPARASITAIRES	
9.3.1 Antihelminthiques.	
9.3.2 Antimalariques	
9.3.3 Autres antiprotozoaires	
9.3.3.1 Dérivés de l'imidazole	
9.3.3.2 Autres : Antimoniate de méglumine	178
9.4 ANTIVIRAUX	179
9.4.1 Médicaments contre les virus herpétiques	
9.4.2 Médicaments antiviraux pour l'Hépatite C	
9.4.3 Médicaments antirétroviraux	
9.4.3.1 Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse	
9.4.3.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase réverse	
9.4.3.4 Association d'antiretroviraux	
10 IMMUNITE	182
10.1. – VACCINS ET IMMUNOGLOBULINES	182
10.1.1 VACCINS ET INMUNOUCOBOBOLINES.	
10.1.1.1 Vaccins antiviraux.	
10.1.1.1.1 - Vaccin contre la poliomyélite	
10.1.1.1.2 Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons	
10.1.1.1.3 Vaccin contre l'influenza	
10.1.1.1.4 Vaccin contre l'hépatite A	
10.1.1.1.5 Vaccin contre l'hépatite B	
10.1.1.1.6 Vaccin contre la rage	
10.1.1.1.7 Vaccin contre la varicelle	
10.1.1.1.8 Vaccin anti-rotavirus	
10.1.1.1.9 Vaccin anti-papillomavirus	
10.1.1.2 Vaccins anti-paphiomavitus	
10.1.1.2.1 Vaccins antibacteriels	
Vaccin contre le tétanos	
Vaccin contre la diphtérie	
Vaccin contre la coqueluche	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Il existe deux types de vaccin contre la coqueluche: le vaccin classique cellulaire, constitué d'une	
bactéries inactivées, et le vaccin acellulaire, constitué d'antigènes spécifiques du Bordetella Pertussa	
Vaccin contre l'Heamophillus influenzae type b	
Vaccins polyvalents	
Vaccin contre les infections à méningocoques les sérogroupes A, C, W et Y	
10.1.1.2.3 Vaccin contre les infections à pneumocoques	
10.1.1.2.4 Vaccin contre la tuberculose : B.C.G	
10.1.1.2.5 Vaccin contre la fièvre thyphoïde	
10.1.2 Immunoglobulines	
10.1.2.1 Immunoglobulines polyvalentes	
10.1.2.2 Immunoglobulines spécifiques	
10.1.2.2.1 Immunoglobulines spécifiques contre l'hépatite B	
10.1.2.2.2 Immunoglobulines spécifiques contre le tétanos	
10.1.2.2.3 Immunoglobulines anti-D	
10.2 IMMUNOMODULATEURS ET IMMUNOSUPPRESSEURS	
10.2.1 Immunomodulateurs	
10.2.2 Immunosuppresseurs	189
10.3 ALLERGENES	
11 TUMEURS	191
11.1 AGENTS ALKYLANTS	191
11.2 ANTIMETABOLITES	
11.3. – INTERCALANTS	194
11.4. – les poisons du fuseau	194
11.5. –LES STABILISANTS DU FUSEAU	
11.6 DIVERS	195
11.6 ADDENDA: FACTEURS HEMATOPOÏETIQUES ET CYTOPROTECTEURS	196
12 ANESTHESIQUES	197
12.1 PARALYSANTS NEUROMUSCULAIRES	
12.2. – GAZS ANESTHESIQUES	
12.3. – ANESTHESIQUES INTRAVEINEUX	197
13 MINERAUX, VITAMINES ET TONIQUES	199
13.1 MINERAUX	199
13.1.1 Fer	
13.1.1.1 Spécialités à usage oral	199
13.1.1.2 Spécialités à usage parentéral.	
13.1.1.3 Chélateurs du fer	
13.1.2 Fluor	
13.1.3 Sels de calcium	
13.1.4 Sels de magnésium	
13.2 VITAMINES	
13.2.1 Thiamine (vitamine B1)	
13.2.3 Acide folique	
13.2.4 Acide folinique	
13.2.5 Associations de vitamines B	
13.2.6 Acide ascorbique (vitamine C)	
13.2.7 Vitamines D et dérivés	205

13.2.8 Alphatocoférol (vitamine E)	206
13.2.9 Associations	206
13.3 TONIQUES	206
USAGE EXTERNE	207
14.1 MEDICAMENTS A USAGE DERMATOLOGIQUE	207
14.1.1 Infections	207
14.1.1.1 Antiseptiques et désinfectants	207
14.1.1.2 Antibiotiques et sulfamidés	209
14.1.1.3 Antimycosiques	210
14.1.1.4 Antiviraux	212
14.1.1.5 Médicaments contre la gale et la pédiculose	212
14.1.2 Corticostéroïdes	212
14.1.2.1 Préparations très puissantes	
14.1.2.2 Préparations puissantes	
14.1.2.3 Préparations moyennement puissantes	
14.1.2.4 Préparations peu puissantes	
14.1.2.5 Associations avec des corticostéroïdes	
14.1.3 Antiprurigineux, analgésiques et anti-inflammatoires	
14.1.4 Médicaments des traumatismes et des affections veineuses	
14.1.5 Médicaments antiacnéiques	
14.1.6 Médicaments antipsoriasiques	
14.1.7 Kératolytiques	
14.1.8 Enzymes et produits apparentés	
14.1.9 Préparations protectrices ou cicatrisantes	
14.1.10 Médicaments à usage systémique en dermatologie	
14.1.10.1 Rétinoïdes	
14.1.10.2 Dépigmentants	
14.1.10.3 Stimulants de la pigmentation	
14.1.10.4 Traitement des affections phanérinnes	
14.1.11 Addenda: Minoxidil	221
14.2 MEDICAMENTS A USAGE OPHTALMIQUE	221
14.2.1 Antimicrobiens	
14.2.1.1 Antiseptiques	222
14.2.1.2 Antibiotiques	
14.2.2 Antiviraux	223
14.2.3 Antiallergiques et anti-inflammatoires.	224
14.2.3.1 Corticostéroïdes.	224
14.2.3.2 Antiinflammatoires non stéroïdiens	224
14.2.3.3 Antiallergiques	225
14.2.3.4 Corticostéroïdes + antibactériens	225
14.2.4 Mydriatiques - cycloplégiques	226
14.2.5 Médicaments du glaucome	226
14.2.5.1 Cholinomimétiques	227
14.2.5.2 Bêta-bloquants	227
14.2.5.3 Alfa-sympathicomimétiques	227
14.2.5.4 Analogues des prostaglandines	227
14.2.5.5 Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique	228
14.2.5.6 Associations	
14.2.6 Médicaments de la cataracte	
14.2.7 Larmes artificielles.	
14.2.8 Préparations protectrices ou cicatrisantes	
14.2.9 Produits de contactologie	
14.2.10 Bains et lavages oculaires	
14.2.11 Solutions à usage chirurgical	
14.2.12 Produits divers en ophtalmologie	230

14.3 MEDICAMENTS A USAGE AURICULAIRE	
14.3.1 Corticostéroïdes et/ou antimicrobiens	231
14.3.2 Préparations ramollissant le cérumen.	
14.3.3 Antivertigineux	
14.3.4 Associations diverses.	232
14.4 MEDICAMENTS DES AFFECTIONS BUCCO-PHARYNGEES	
14.4.1 Antifongique à usage stomatologique	
14.4.2 Pastilles à sucer	
14.4.3 Bains de bouche, collutoires et gargarismes	
14.4.4 Préparations pour les dents ou les gencives	
14.5 PREPARATIONS DES AFFECTIONS VULVO-VAGINALES	
14.6 ANESTHESIQUES LOCAUX	236
15 AGENTS DE DIAGNOSTIC	239
15.1 AGENTS DE RADIODIAGNOSTIC	239
15.1.1 Produits iodés	
15.1.1.1 Haute osmolalité (monomères ioniques)	
15.1.1.2 Faible osmolalité	
15.1.2 Sulfate de baryum	240
15.2 AGENTS DE DIAGNOSTIC PAR RESONANCE MAGNETIQUE	240
15.3 AUTRES AGENTS DE DIAGNOSTIC	241
16. – LES THERAPEUTIQUES COMPLEMENTAIRES ET ALTERNATIVES	242
16.1. – LES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES	242
16.2. –LES OLIGO-ELEMENTS	244
16.3. – LES MEDICAMENTS DE PHYTOTHERAPIE	244
16.4 Médicaments utiliséS dans la ménopause	244
16.5 Médicaments utilisé dans LA CRISE VERTIGINEUSE	245
16.6 Médicaments agissant sur la musculature utérine	245
16.6.1 - Ocytociques	245
16.6.2 Tocolytiques	245
16.7 Sparmicidas	246

1. - SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE

1.1. - MEDICAMENTS DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE

Sont utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque :

- des glycosides cardiotoniques
- des inhibiteurs des phosphodiestérases
- des diurétiques
- des dérivés nitrés
- des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
- des β-bloquants

Chez de nombreux patients, le traitement est entrepris avec un diurétique. Il fait de plus en plus appel à des médicaments qui ont des propriétés vasodilatatrices, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) pour lesquels une influence favorable sur la morbidité et la mortalité a été démontrée.

Les glycosides cardiotoniques peuvent améliorer la symptomatologie, probablement sans influencer la mortalité; ils sont aussi indiqués en présence de fibrillation auriculaire à réponse ventriculaire rapide.

Dans l'insuffisance cardiaque chronique, on utilise aussi des β -bloquants étant donné qu'un effet favorable sur la mortalité a été démontré. Un tel traitement doit se faire avec prudence, en commençant avec la plus faible dose possible.

Les inhibiteurs des phosphodiestérases n'ont que des indications limitées.

1.1.1. - Glycosides cardiotoniques

Les glycosides du groupe de la digitale présentent tous le même coefficient thérapeutique et, à effet inotrope égal, il existe une même probabilité d'effets indésirables. Il y a cependant des différences dans les paramètres pharmacocinétiques tels la biodisponibilité et la demi-vie plasmatique.

Les glycosides cardiotoniques sont en principe administrés par voie orale. La décision d'employer ou non une dose de charge dépend de la rapidité avec laquelle on désire digitaliser le patient. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, l'administration d'une telle dose n'est plus que rarement pratiquée en raison du risque accru de toxicité. Une éventuelle dose de charge sera faible et répartie en plusieurs prises.

La toxicité des glycosides cardiotoniques se manifeste par des troubles gastro-intestinaux, cardiaques et du système nerveux central. L'hypokaliémie augmente le danger de toxicité mais la plupart des cas de toxicité sont dus à une posologie trop élevée, par exemple lorsqu'on ne tient pas compte de facteurs tels l'âge, l'insuffisance rénale et les interactions avec d'autres médicaments.

Les glycosides digitaliques et les antacides ainsi que les adsorbants ne seront de préférence pas pris simultanément.

Les digitaliques ne sont indiqués que dans l'insuffisance cardiaque à bas débit, par contre l'insuffisance cardiaque à débit élevée et celle liée à un obstacle mécanique ou l'insuffisance cardiaque du coeur pulmonaire chronique ne constituent pas des indications pour les digitaliques.

La résorption de la *digoxine* après administration orale est incomplète et variable. Des problèmes de biodisponibilité peuvent dès lors se poser. Les différences de résorption peuvent résulter de la forme galénique (par exemple un élixir assure une meilleure résorption que des comprimés) ou de la formulation. La digoxine est surtout éliminée telle quelle au niveau des reins. Les taux plasmatiques thérapeutiques se situent entre 1 et 2 ng/ML.

Chez l'adulte avec une fonction rénale normale, la demi-vie plasmatique de la digoxine est d'environ un jour et demi et la dose d'entretien est le plus souvent de 0,25 à 0,375 mg par jour. Une éventuelle dose de charge répartie sur 24 heures ne peut en principe pas dépasser 1 mg. Si la dose de charge est répartie sur 3 jours, on donne au maximum 0,75 mg par jour. En cas d'insuffisance rénale, la demi-vie de la digoxine est allongée. Dès lors, la dose d'entretien comme la dose de charge éventuelle doivent être réduites : ainsi, en cas de diminution de moitié de la clairance de la créatinine, les deux tiers seulement de la dose d'entretien habituelle seront administrés. Chez les patients âgés, la fonction rénale est diminuée et une posologie réduite est de règle.

Les concentrations plasmatiques de digoxine peuvent fortement augmenter en cas de prise simultanée de quinidine, d'amiodarone et de certains antagonistes du calcium; une réduction de la posologie de la digoxine peut être nécessaire. En cas d'utilisation du millepertuis, les concentrations plasmatiques de digoxine peuvent diminuer.

La digitoxine est bien résorbée par voie orale et ne pose aucun problème de biodisponibilité. La digitoxine est principalement métabolisée par le foie. Sa demi-vie plasmatique est d'environ six jours, ce qui pose des problèmes en cas d'intoxication. Les taux plasmatiques thérapeutiques se situent entre 10 et 25 ng/ML.

La dose d'entretien de la digitoxine est d'environ 0,1 mg par jour; la dose de charge peut être de 0,3 mg par jour pendant trois jours. En cas d'insuffisance rénale, la posologie de la digitoxine ne doit pas nécessairement être ajustée mais la prudence s'impose. La conduite à tenir vis-à-vis de patients souffrant d'insuffisance hépatique reste mal définie.

DIGOXINE

- DIGOXINE NATIVELLE 0.250 MG Comprimé Sécable B/30 PROCTER & GAMBL TA Orale 2.532 DT [E]
- DIGOXINE NATIVELLE 5 $\mu G/0.1$ ML Gouttes Buvables FL/60 ML TEOFARMA S.R.L TA Orale 1.247 DT $^{[E]}$
- DIGOXINE NIHFI 0.250 MG Comprimé Sécable B/20 SOPHARMA(NIHFI) TA Orale 1.960 DT [E]

1.1.2. - Inhibiteurs des phosphodiesterases

La milrinone, qui exerce un effet inotrope positif et possède des propriétés vasodilatatrices, peut être utilisée par voie parentérale sous surveillance continue dans l'insuffisance cardiaque ne répondant pas au traitement classique.

MILRINONE

COROTROPE 10 MG Solution Injectable B/10/10 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale H [E]

1.2. - ANTIANGOREUX

Sont utilisés comme antiangoreux:

• des dérivés nitrés

- la molsidomine
- des β-bloquants
- des antagonistes du calcium

Lors d'une crise aiguë d'angine de poitrine, la première mesure thérapeutique consiste à essayer des dérivés nitrés par voie sublinguale. Pour le traitement d'entretien, on peut utiliser des dérivés nitrés, des β -bloquants, des antagonistes du calcium et la molsidomine. Il semble que ces médicaments peuvent également être utilisés chez les patients atteints d'ischémie silencieuse prouvée. Les patients souffrant d'angor instable doivent être en principe sous monitorage continu dans un environnement calme; les β -bloquants, les dérivés nitrés, l'acide acétylsalicylique, l'héparine et l'oxygène font partie du traitement standard.

Les antiangoreux n'influencent pas nécessairement le pronostic (morbidité, mortalité) des affections coronariennes. Il est acquis que les β -bloquants (associés à l'acide acétylsalicylique) sont utiles dans la prévention secondaire de l'infarctus du myocarde.

1.2.1. - Dérivés nitrés

La nitroglycérine et le dinitrate d'isosorbide peuvent être donnés par voie sublinguale en cas de crise d'angor ou quelques instants avant un effort susceptible de déclencher une telle crise. Les dérivés nitrés peuvent également être administrés par voie sublinguale dans l'oedème aigu du poumon et les poussées d'hypertension. Il faut expliquer clairement au patient qu'un contact étroit du médicament avec les muqueuses buccales est nécessaire. On doit également lui conseiller de prendre ces médicaments dans la mesure du possible en position assise ou couchée, étant donné les risques d'hypotension orthostatique et de syncope, surtout à doses élevées.

Pour éviter une perte d'activité, le patient doit conserver les comprimés nitrés dans un récipient adapté et non à l'air libre ou dans un morceau de papier; ceci est surtout important pour la nitroglycérine.

La nitroglycérine, le dinitrate et le mononitrate d'isosorbide sont administrés *par voie orale* en usage chronique, dans un but prophylactique; il s'agit alors souvent de préparations à libération prolongée. Ces substances sont aussi parfois utilisées comme traitement d'entretien dans l'insuffisance cardiaque.

La nitroglycérine peut aussi être donnée par voie transdermique, entre autres en employant les systèmes transdermiques à libération prolongée. La quantité appliquée doit être déterminée individuellement.

Lors de l'usage chronique des dérivés nitrés, leur efficacité peut diminuer, surtout si des concentrations élevées sont maintenues d'une façon continue comme c'est le cas lors de l'usage de préparations orales à libération prolongée ou de préparations transdermiques. Pour cette raison, on préconise de plus en plus un schéma posologique avec des périodes d'abstinence en dérivés nitrés, par exemple en ne donnant pas de dose le soir ou en retirant l'emplâtre pendant plusieurs heures par 24 heures.

Les céphalées sont fréquentes. L'usage simultané de dérivés nitrés et de sildénafil est contre-indiqué. En cas d'infarctus du ventricule droit, l'administration de dérivés nitrés doit se faire de façon très prudente, en raison du risque de détérioration hémodynamique.

ISOSORBIDE DINITRATE

 PENSORDIL 5 MG Comprimé Sublingual B/40 ELPEN PHARMACEUTICAL CO.INC TC Orale 1.615 DT [E]

ISOSORBIDE MONONITRATE

- MONICOR LP 40 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Orale 5.070 DT ^[E]
- MONICOR LP 60 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Orale 7.226 DT ^[E]
- MONICOR LP 20 MG Gélule à Libération Prolongée B/60 PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Orale 4.454 DT [E]

TRINITRINE

- DIAFUSOR 5 MG/24H Timbre Trans-Dermique B/30 DTD PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Locale 16.558 DT [E]
- DIAFUSOR 10 MG/24H Timbre Trans-Dermique B/30 DTD PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Locale 18.504 DT^[E]
- NATISPRAY 0.3 MG Aérosol FL/18ML de 300 doses TEOFARMA S.R.L TC Orale 8.637 DT [E]

1.2.2. - Molsidomine

La molsidomine peut être employée par voie orale dans le traitement chronique de l'angor. Les effets sont semblables à ceux des dérivés nitrés; des céphalées peuvent survenir. L'utilisation concomitante de molsidomine et de sildénafil est contre-indiquée.

MOLSIDOMINE

- ANGORAL 2 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 4.190 DT [E]
- ANGORAL 4 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 7.665 DT [E]
- CARDOMINE 2 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 3.900 DT [E]
- CARDOMINE 4 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 7.200 DT [E]
- CORVASAL 2 MG Comprimé Sécable B/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 5.360 DT [E]
- CORVASAL 4 MG Comprimé Sécable B/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNSIE TA Orale 10.435 DT EI
- DILACOR 2 MG Comprimé B/30 SAIPH TA Orale 4.084 DT [E]
- DILACOR 2 MG Comprimé Sécable B/90 SAIPH TA Orale 10.450 DT [E]
- DILACOR 4 MG Comprimé B/30 SAIPH TA Orale 7.950 DT [E]
- DILACOR 4 MG Comprimé B/90 SAIPH TA Orale 20.720 DT [E]
- MOLSICOR 2 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 3.850 DT [E]
- MOLSICOR 4 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 7.150 DT [E]
- MOLSIDOMINE WINTHROP 2 MG Comprimé Sécable B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.080 DT [F]
- MOLSIDOMINE WINTHROP 4 MG Comprimé Sécable B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 7.950 DT ^[E]

1.3. - ANTIARYTHMIQUES

Les antiarythmiques sont regroupés ici selon le classement de Vaughan Williams.

Les arythmies doivent être traitées lorsqu'elles provoquent des symptômes gênants, lorsque des problèmes hémodynamiques en découlent ou lorsque le pronostic est défavorable. Le traitement médicamenteux des arythmies chroniques post-infarctus n'influence probablement pas le risque de mort subite, et les antiarythmiques sont utilisés de façon de plus en plus restrictive.

Dans les crises aiguës, les antiarythmiques doivent parfois être administrés par voie intraveineuse. En principe, cela doit se faire sous surveillance électrocardiographique et hémodynamique; fait ici

exception le traitement d'urgence (par exemple avec le vérapamil ou l'adénosine) de la tachycardie paroxystique supraventriculaire déjà diagnostiquée antérieurement.

Tous les antiarythmiques peuvent avoir une action déprimante sur la contractilité du myocarde et sur la conduction auriculo-ventriculaire. En outre, la plupart des antiarythmiques provoquent d'autres effets indésirables subjectifs et objectifs qui se manifestent principalement lors de traitements chroniques. L'attention doit également être attirée sur le fait que la plupart des antiarythmiques peuvent avoir euxmêmes des effets arythmogènes (avec e.a. des torsades de pointes pouvant être fatales); pour les facteurs de risque des torsades de pointes, par ex. en cas d'association à certains médicaments, voir *Gastroprocinétiques*.

La posologie des antiarythmiques est notamment fonction de la gravité de l'arythmie et parfois de l'état de la fonction hépatique ou rénale. La surveillance de l'électrocardiogramme peut s'avérer nécessaire. Pour certains antiarythmiques, la détermination des taux plasmatiques peut être utile.

Dans certains cas de tachycardie supraventriculaire, par ex. en cas de fibrillation auriculaire, la digoxine et la digitoxine sont utilisées.

1.3.1. - Classe I

Les antiarythmiques de la classe I freinent l'entrée du sodium. Ce groupe est subdivisé en fonction de l'effet sur la durée du potentiel d'action; celle-ci peut être allongée (groupe IA), réduite (groupe IB) ou peu modifiée (groupe IC).

1.3.1.1. - Classe IA

1.3.1.1.1. - **Disopyramide**

Les effets indésirables du disopyramide sont: effets anticholinergiques (rétention urinaire, troubles visuels, accélération de la conduction auriculo-ventriculaire...), dépression myocardique et, rarement, hypoglycémie. Des troubles graves du rythme cardiaque et des hypoglycémies profondes ont été rapportés lors de la prise concomitante de certains macrolides.

DISOPYRAMIDE

- RYTHMODAN LP 250 MG Comprimé Sécable B/20 AVENTIS TA Orale 5.999 DT IEI
- RYTHMODAN 100 MG Gélule B/40 AVENTIS TA Orale 3.858 DT [E]

1.3.1.2. - Classe IB

Lors de l'usage d'antiarythmiques possédant une activité anesthésique locale, des effets indésirables tels tremblements, excitation et convulsions peuvent survenir. Une dépression cardiaque et de l'hypotension sont possibles comme avec tout antiarythmique.

La phénytoïne, parfois utilisée comme antiarythmique de second choix, est reprise dans le chapitre. *Antiépileptiques*.

1.3.1.3. - Classe IC

Lors de l'usage d'antiarythmiques possédant une activité anesthésique locale, des effets indésirables tels tremblements, excitation et convulsions peuvent survenir. Comme avec tout antiarythmique, une dépression cardiaque et de l'hypotension sont possibles.

Avec la flécaïnide, une influence défavorable sur la survie a été constatée en cas d'utilisation chez des patients présentant, après infarctus du myocarde, des arythmies ventriculaires peu ou non symptomatiques (étude CAST). Les antiarythmiques de la classe IC interfèrent avec les pacemakers. La résorption de la flécaïnide est réduite par la présence d'aliments.

FLECAINIDE

FLECAINE 100 MG Comprimé Sécable B/30 MEDA PHARMA TA Orale 29.695 DT IEI

1.3.2. - Classe II

Les antiarythmiques de la classe II inhibent les arythmies provoquées par les catécholamines. La plupart des β-bloquants appartiennent à cette classe. Le sotalol a aussi des propriétés de classe III. La liste des β-bloquants est reprise au chapitre 1.4.1. où leurs effets indésirables et leurs contre-indications sont également discutés.

1.3.3. - Classe III

Les antiarythmiques de la classe III tels l'amiodarone et le β -bloquant sotalol allongent la durée totale du potentiel d'action.

L'amiodarone est utilisée en cas de fibrillation auriculaire et dans d'autres arythmies. Les effets indésirables sont: troubles de la fonction thyroïdienne, dépôts cornéens, bradycardie, toxicité hépatique, altérations pulmonaires interstitielles, névrites, photosensibilité et pigmentation. L'amiodarone augmente les taux plasmatiques de digoxine et potentialise l'effet des anticoagulants oraux. Les effets indésirables dépendent de la dose.

AMIODARONE

- AMIOCARD 200 MG Comprimé Sécable B/20 ADWYA TA Orale 6.000 DT [E]
- AMIODARONE AGUETTANT 50 MG/ML Solution Injectable B/5/3 ML AGUETTANT TA Parentérale H ^[E]
- CORDARONE 150 MG Solution Injectable B/6/3 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale 4.200 DT [E]
- CORDARONE 200 MG Comprimé Sécable B/20 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 6.805 DT [E]
- SEDACORON 150 MG Solution Injectable B/5/3 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale 3.272 DT [E]

1.3.4. - Classe IV

Les antiarythmiques appartenant à la classe IV freinent l'entrée du calcium dans la cellule (antagonistes du calcium). Le vérapamil est utilisé par voie intraveineuse dans le traitement d'urgence de la tachycardie paroxystique supraventriculaire. Le vérapamil par voie i.v. est contre-indiqué chez des patients sous β-bloquants, ainsi que dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White et la tachycardie ventriculaire à cause du danger de collapsus cardio-vasculaire.

VERAPAMIL

• ISOPTINE LP 240 MG Comprimé Sécable B/30 ABBOTT TA Orale 12.749 DT [E]

1.4. - ANTIHYPERTENSEURS

Sont utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle:

- des diurétiques
- des β-bloquants
- des antagonistes du calcium
- des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
- des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
- des α-bloquants
- des antihypertenseurs à action centrale

Les associations fixes sont reprises à la fin de ce chapitre.

L'hypertension est sans conteste un facteur de risque de morbidité et de mortalité cardio-vasculaires. Avant d'entreprendre un traitement antihypertenseur, il faut cependant tenir compte de l'existence d'autres facteurs de risque et de la nécessité éventuelle d'intervenir à leur niveau (par ex. le tabagisme).

Avant d'instaurer un traitement, il est indispensable de s'assurer de la réalité de l'hypertension. A cette fin, des mesures de la tension artérielle répétées pendant plusieurs semaines dans une ambiance calme sont nécessaires. Une hypertension secondaire doit être exclue.

Il est admis qu'une thérapeutique médicamenteuse est indiquée à partir du moment où des personnes de moins de 60 ans ont de manière répétée une pression diastolique supérieure à 95 mmHg. La décision d'instaurer un traitement antihypertenseur en cas de chiffres tensionnels plus bas dépend de la présence d'autres facteurs de risque cardio-vasculaires et d'une atteinte organique déjà présente. Plusieurs études ont montré que des personnes hypertendues de plus de 60 ans peuvent également bénéficier d'une thérapeutique médicamenteuse, même s'il s'agit d'une hypertension systolique isolée. Il faut cependant tenir compte du fait qu'une baisse de tension chez des personnes âgées, surtout chez celles qui souffrent d'insuffisance cérébrale, rénale ou coronaire, peut réduire dangereusement la perfusion de ces organes vitaux. Le traitement antihypertenseur éventuel chez de tels patients sera donc entrepris très progressivement.

Plusieurs schémas thérapeutiques ont été proposés pour le traitement de l'hypertension. Il est souvent conseillé, avant d'entreprendre une thérapeutique médicamenteuse, de prescrire au patient un régime pauvre en sel et, si nécessaire, hypocalorique. Une influence favorable sur la morbidité et la mortalité a été clairement prouvée surtout pour les β-bloquants et les diurétiques. Un traitement médicamenteux sera donc le plus souvent instauré avec l'un de ceux-ci. D'autres antihypertenseurs peuvent être indiqués en cas de contre-indication à l'utilisation d'un β-bloquant et/ou d'un diurétique, ou en fonction d'une pathologie associée, par exemple un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en cas d'insuffisance cardiaque, d'infarctus ou de néphropathie diabétique. Pour de nombreux patients, une association de plusieurs antihypertenseurs s'avérera nécessaire pour obtenir un contrôle suffisant. Si une normalisation de la tension survient en cours de traitement, il peut être indiqué d'arrêter le traitement ou d'en diminuer les doses afin de voir si celui-ci est encore nécessaire.

Il est peu probable que les légers troubles lipidiques qui peuvent être provoqués par certains antihypertenseurs puissent présenter à long terme un risque accru pour le malade hypertendu.

L'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens peut diminuer l'efficacité de la plupart des antihypertenseurs.

En cas d'hypertension grave (pression diastolique ≥ 120 mmHg), il convient de contrôler régulièrement la tension artérielle. Une intervention médicale immédiate ne s'avère nécessaire qu'en cas d'atteinte rapidement progressive au niveau cérébral, cardiaque ou rénal. Lors d'une crise hypertensive sans atteinte organique, la nifédipine peut être utilisée par voie orale sous une forme à libération prolongée. Le labétalol, la clonidine ou un dérivé nitré peuvent aussi être utilisés par voie orale. En cas de crise hypertensive associée à une atteinte organique, les dérivés nitrés ou le labétalol peuvent être utilisés.

1.4.1. - Bêta-bloquants

Dans l'hypertension, les β -bloquants peuvent être utilisés seuls ou associés à un diurétique ou à d'autres antihypertenseurs. Le mécanisme d'action des β -bloquants comme antihypertenseurs n'est pas encore connu. A dose équivalente, tous les β -bloquants sont vraisemblablement aussi efficaces.

Les β -bloquants constituent souvent le traitement de base de l'*angine de poitrine*. L'effet antiangoreux que l'on peut obtenir est vraisemblablement le même avec n'importe lequel des β -bloquants. En cas d'arrêt du traitement aux β -bloquants chez un patient coronarien, il est nécessaire de diminuer progressivement la dose et de conseiller une réduction des activités physiques: des accidents tels angor sévère, infarctus du myocarde et fibrillation ventriculaire, peuvent survenir lors d'une interruption brutale.

Pour certains β -bloquants, un effet favorable a été prouvé dans la prévention secondaire des récidives et de la mort subite après *infarctus du myocarde*. Les β -bloquants semblent encore toujours sous-utilisés dans cette indication.

Les β -bloquants peuvent être utilisés dans *les troubles du rythme supraventriculaire* bien que cette indication ne soit pas proposée pour chacun d'eux. Pour certains de ces médicaments, il existe une forme intraveineuse destinée au traitement d'urgence de certaines tachycardies supraventriculaires: un tel traitement doit s'effectuer en milieu spécialisé. Le sotalol se différencie des autres β -bloquants par ses propriétés antiarythmiques de classe III. **Le sotalol est arythmogène**, il n'est utilisé que dans certaines arythmies.

Des β-bloquants, surtout le propranolol, sont utilisés comme traitement adjuvant dans la thyréotoxicose.

Le propranolol et d'autres β -bloquants sont également utilisés dans les *tremblements idiopathiques* et la *phobie sociale*.

Dans le traitement prophylactique de la *migraine*, parfois on fait appel à certains β -bloquants, notamment au propranolol.

Il est de plus en plus évident que des β-bloquants peuvent jouer un rôle dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique (voir Médicaments utilisés dans l'insuffisance cardiaque).

Les β -bloquants sont utilisés parfois dans le traitement préventif des hémorragies dues à des varices oesophagiennes.

Des effets indésirables tels insuffisance cardiaque, bradycardie sinusale (moins fréquents avec les dérivés possédant une activité intrinsèque sympathicomimétique tels l'acébutolol, le pindolol) et bloc auriculo-ventriculaire peuvent survenir avec toutes ces substances. Pour les patients ayant des

antécédents bronchospastiques, la probabilité de voir se déclencher une crise est moindre (mais pas nulle) lors de l'utilisation de β_1 -bloquants dits cardiosélectifs tels l'acébutolol, l'aténolol, le bétaxolol, le bisoprolol, le métoprolol et le céliprolol. Ces substances cardiosélectives entraînent probablement moins de problèmes en ce qui concerne les symptômes et la gravité des crises d'hypoglycémie survenant chez les patients sous traitement antidiabétique ainsi qu'en ce qui concerne les troubles vasculaires périphériques préexistants. Pour certains β -bloquants (acébutolol, aténolol, métoprolol, sotalol), une réduction de posologie se justifie en cas d'insuffisance rénale. Une élévation du VLDL-cholestérol et une diminution du HDL-cholestérol ont été décrites avec certains β -bloquants. Toutefois, le céliprolol ne modifie pas les taux sériques d'insuline et de glucose chez le diabétique ni les taux de cholestérol total ; il tend à augmenter le rapport HDL/cholestérol total et à diminuer le taux des triglycérides.

Les β-bloquants peuvent engendrer quelques effets centraux (troubles du sommeil, cauchemars, dépression,...). De l'impuissance peut également survenir. La fatigue est une plainte très fréquente.

Pour les spécialités décrites ci-dessous sont mentionnées les principales indications acceptées. On commence le plus souvent par une faible dose qui est progressivement augmentée, selon la nécessité. Il est évident que la prudence s'impose davantage chez les personnes âgées et les patients à risques lors de l'établissement de la dose de départ et de son augmentation. La posologie est généralement plus faible dans l'arythmie que dans l'hypertension et l'angor. La dose journalière peut être prescrite en une fois pour certains β-bloquants, surtout dans l'hypertension. Toutefois, il sera souvent nécessaire de recommander deux prises par jour si de plus fortes doses s'avèrent nécessaires.

ATENOLOL

- HYPOTEN 25 MG Comprimé Pelliculé B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 3.500 DT [E]
- HYPOTEN 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 5.310 DT [E]
- HYPOTEN 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 10.140 DT [E]
- HYPOTENSYL 25 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 6.535 DT [E]
- HYPOTENSYL 50 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 12.000 DT [E]
- TENORMINE 100 MG Comprimé Sécable B/28 ADWYA TA Orale 12.460 DT [E]

ACEBUTOLOL

- CEBUTOL 400 MG Comprimé Pelliculé B/32 SIPHAT TA Orale 7.100 DT [E]
- CEBUTRAL 400 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 8.900 DT [E]
- SECTRAL 400 MG Comprimé Pelliculé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 13.635 DT [E]
- SECTRAL 200 MG Comprimé Pelliculé B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.770 DT [E]

BETAXOLOL

- KERLONE 20 MG Comprimé Pellicule Sécable B/28 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 14.490 DT [E]
- KETAXOL 20 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 ADWYA TA Orale 10.700 DT [E]
- KEVAL 20 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 PHARMAGREB TA Orale 10.920 DT [E]

BISOPROLOL

- CARDENSIEL 5 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 MERCK LIPHA SANTE S.A.S TA Orale 17.345 DT [E]
- CARDENSIEL 2.5 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 MERCK LIPHA SANTE S.A.S TA Orale 17.345 DT ^[E]
- CINCOR 10 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 SAIPH TA Orale 12.870 DT [E]
- CINCOR 2.5 MG Comprimé Pellicule Sécable B/30 SAIPH TA Orale 5.920 DT [E]

LABETALOL

• TRANDATE 200 MG Comprimé Sécable B/30 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale 9.657 DT [E]

CELIPROLOL

• CELIPROL 200 MG Comprimé Enrobé B/30 ADWYA TA Orale 9.900 DT [E]

METOPROLOL

- LOPRESSOR LP 200 MG Comprimés à Libération Prolongée B/30 DAIITCHI SANKYO France SAS TA Orale 7.085 DT [E]
- VASOCARD LP 200 MG Comprimés Sécables B/30 PHARMAGHREB TA Orale 6.700 DT [E]

NEBIVOLOL

• NEBILET 5MG Comprimés Sécable B/30 BERLIN CHIMIE AG TA Orale 24.334 DT [E]

PROPRANOLOL

- AVLOCARDYL RETARD 160 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 10.700 DT [E]
- AVLOCARDYL 5 MG Solution Injectable B/5/5 ML ASTRA ZENECA TA Parentérale 1.990 DT IEI
- NORMOCARDIL 40 MG comprimé quadrisécable B/45 DAR ESSAYDALI TA Orale 2.415 DT [E]

CARVEDILOL

- CARDILOL 6,25 MG Comprimé FL/30 AL HIKMA TA Orale 10.850 DT [E]
- CARDILOL 12,5 MG Comprimé FL/30 AL HIKMA TA Orale 16.075 DT [E]
- CARDILOL 25 MG Comprimé FL/30 AL HIKMA TA Orale 22.381 DT [E]
- CARDILOL 3.125 MG Comprimé FL/30 AL HIKMA TA Orale 7.170 DT [E]
- CARVIDOL 6.25 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 7.900 DT [E]
- CARVIDOL 12,5 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 12.425 DT [E]
- CARVIDOL 25 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 17.600 DT [E]
- KARVEX 6,25 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 8.500 DT [E]
- KARVEX 12.5 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 13.000 DT [E]
- KARVEX 25 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 18.000 DT [E]

1.4.2. - Antagonistes du calcium

Les antagonistes du calcium freinent l'entrée du calcium dans les cellules, surtout au niveau du système cardio-vasculaire, mais ils exercent toutefois des effets sensiblement différents.

Les dihydropyridines ont surtout un effet vasodilatateur et moins d'effet sur le coeur; elles sont utilisées dans l'hypertension et l'angor. Il n'est pas établi que les différences de sélectivité vasculaire des dihydropyridines aient des répercussions cliniques en ce qui concerne l'efficacité et les effets indésirables. Toutefois, dans de nombreux modèles expérimentaux d'hypertension, l'action de la manidipine a été plus puissante et plus prolongée que celles de la nicardipine et de la nifédipine. Certaines dihydropyridines, par exemple la nifédipine, sont aussi employées dans le traitement du syndrome de Raynaud.

Le diltiazem est surtout utilisé dans l'angor.

Les antagonistes du calcium n'ont pas de place dans l'angor instable, dans la phase aiguë de l'infarctus du myocarde et dans la prévention secondaire après infarctus du myocarde; dans certains cas, un effet défavorable sur le pronostic a été décrit pour certains d'entre eux. La brusque chute de tension provoquée par des préparations de nifédipine à libération normale (non prolongée) peut entraîner une hypoperfusion des coronaires et une tachycardie réflexe, c'est pourquoi cette forme à libération normale a été supprimée.

Les effets indésirables des antagonistes du calcium sont entre autres, une diminution excessive de la contractilité et de la fréquence cardiaques et une vasodilatation périphérique avec céphalées, oedème de la cheville, hypotension et tachycardie réflexe (surtout avec les dihydropyridines). Une hyperplasie gingivale peut survenir. L'association d'un β-bloquant à un antagoniste du calcium, surtout le diltiazem, peut aggraver certains de ces effets indésirables.

Une augmentation des concentrations plasmatiques de la digoxine (mais pas de la digitoxine) a été décrite lors de la prise concomitante de certains antagonistes du calcium. Les antagonistes du calcium inhibent la biotransformation de médicaments tels la carbamazépine, la quinidine, la théophylline. La plupart des antagonistes du calcium subissent après prise orale, une extraction importante lors du premier passage hépatique: la prise simultanée d'inhibiteurs enzymatiques (comme la cimétidine ou le jus de pamplemousse) entraîne une augmentation de la biodisponibilité; la biodisponibilité sera moindre en cas de prise simultanée d'inducteurs enzymatiques (comme les barbituriques et certains antiépileptiques).

AMLODIPINE

- AMLODIPINE WINTHROP 5 MG Comprimé Sécable WINTHROP PHARMA TUNISIE B/30 TA Orale 12.000 DT [E]
- AMLODIPINE WINTHROP 10 MG Comprimé Sécable WINTHROP PHARMA TUNISIE B/30 TA Orale 18.200 DT [E]
- AMLODIS 5 MG Comprimé B/30 TERIAK TA Orale 15.000 DT [E]
- AMLODIS 5 MG Comprimé B/60 TERIAK TA Orale 20.900 DT [E]
- AMLODIS 5 MG Comprimé B/90 TERIAK TA Orale 28.800 DT [E]
- AMLODIS 10 MG Comprimé B/30 TERIAK TA Orale 27.750 DT [E]
- AMLODIS 10 MG Comprimé B/30 TERIAK TA Orale 27.750 DT [E]
- AMLOR 5 MG Comprimé B/30 PFIZER Pharmaceuticals Tunisie TA Orale 24.908 DT [E]
- AMLOR 5MG Comprimé B/60 PFIZER Pharmaceuticals Tunisie TA Orale 34.860 DT [E]
- AMLOR 5 MG Comprimé B/90 PFIZER Pharmaceuticals Tunisie TA Orale 52.290 DT [E]
- AMLOR 10 MG Gélule B/30 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 23.800 DT [E]
- CARDEPINE 10 MG Gélule B/32 ALLIANCE PHARMA TA Orale 18.000 DT [E]
- CARDEPINE 5 MG Gélule B/32 ALLIANCE PHARMA TA Orale 13.040 DT [E]
- LODEPINE 5 MG Gélule B/30 GALPHARMA TA Orale 13.500 DT [E]
- LODEPINE 5 MG Gélule B/60 GALPHARMA TA Orale 20.500 DT [E]
- LODEPINE 10 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 18.480 DT [E]
- LOWRAC 5 MG Gélule B/30 SAIPH TA Orale 18.900 DT [E]
- LOWRAC 5 MG Gélule B/90 SAIPH TA Orale 26.920 DT [E]
- LOWRAC 5 MG Gélule B/60 SAIPH TA Orale 24.565 DT [E]
- LOWRAC 10 MG Gélule B/30 SAIPH TA Orale 19.900 DT [E]
- MIBRAL 5 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 13.995 DT [E]
- MIBRAL 5 MG Comprimé Sécable B/60 PHARMAGHREB TA Orale 19.500 DT [E]
- MIBRAL 5 MG Comprimé Sécable B/90 PHARMAGHREB TA Orale 26.900 DT [E]
- MIBRAL 10 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 18.400 DT [E]
- TENSYNEL 5 MG Gélule B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 12.000 DT [E]
- TENSYNEL 5 MG Gélule B/90 IBN AL BAYTAR TA Orale 28.800 DT [E]
- TENSYNEL 10 MG Gélule B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 18.200 DT [E]
- TENSYNEL 10 MG Gélule B/90 IBN AL BAYTAR TA Orale 49.500 DT [E]

DILTIAZEM

- BI-TILDIEM 90 MG Comprimé à Libération Prolongée B/28 SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Orale 12.857 DT [E]
- BI-TILDIEM 120 MG Comprimé à Libération Prolongée B/28 SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Orale 16.563 DT [E]
- MONO-TILTIEM 200 MG Gélule à Libération Prolongée B/28 SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Orale 21.203 DT [E]
- MONO-TILDIEM 300 MG Gélule à Libération Prolongée B/28 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 22.700 DT [E]
- TILDIEM 60 MG Comprimé B/30 ADWYA TA Orale 6.540 DT [E]

ISRADIPINE

- ICAZ 2.5 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 DAIICHI SANKYO FRANCE S.A.S TA Orale 14.871 DT [E]
- ICAZ 5 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 DAIICHI SANKYO FRANCE S.A.S TA Orale 28.056 DT [E]

LERCANIDIPINE

• ZANIDIP 10 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 BOUCHARA-RECORDATI TA Orale 20.082 DT [E]

NICARDIPINE

- LOXEN 20 MG Comprimé Sécable B/30 NOVARTIS PHARMA S.A.S TA Orale 5.816 DT [E]
- LOXEN LP 50 MG Gélule à Libération Prolongée B/60 NOVARTIS PHARMA S.A.S TA Orale 15.946 DT [E]
- NICADIPINE AGUETTANT 10 MG/10ML Solution Injectable B/10/10ML AGUETTANT TA Parentérale H [E]

NIFEDIPINE

• ADALATE RETARD 20 MG Comprimé à Libération Prolongée B/20 SIPHAT TA Orale 7.090 DT [E]

NITRENDIPINE

LUSOPRESS 20 MG Comprimé Pelliculé B/28 LUSO FARMACO IT TA Orale 11.951 DT [E]

MANIDIPINE

• IPERTEN 20 MG Comprimé Sécable B/28 CHIESI FARMACEUTICI S.p.A TA Orale 17.476 DT [E]

1.4.3. – Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA)

Les IECA inhibent l'enzyme qui transforme l'angiotensine I en angiotensine II active.

Dans l'hypertension, les IECA sont surtout indiqués lorsque les β -bloquants ou les diurétiques sont contre-indiqués, ou en cas de pathologies associées telles l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde et la néphropathie diabétique.

Dans *l'insuffisance cardiaque*, les IECA constituent la base du traitement en raison de leur effet favorable sur la morbidité et la mortalité.

En cas d'infarctus aigu du myocarde, sauf contre-indication, un traitement d'environ 6 semaines est entrepris avec un IECA à partir de la 24^{ème}heure qui suit l'infarctus dans le but de prévenir un remodelage défavorable du myocarde. Après 6 semaines à 3 mois, le patient est réévalué et si un dysfonctionnement du ventricule gauche persiste, le traitement par IECA est poursuivi.

Enfin, un effet favorable des IECA a également été observé en prévention et sur la progression de la *néphropathie*, par exemple chez les diabétiques.

Après l'administration de la première dose d'un IECA, une réaction hypotensive est particulièrement à craindre en cas de déplétion sodée préexistante consécutive à un régime ou à la prise de diurétiques. Les autres effets indésirables sont: toux (ne survenant parfois qu'après plusieurs semaines de traitement), et plus rarement rash, syndrome néphrotique, agranulocytose, dysgueusie, oedème angioneurotique, urticaire et diminution de l'hémoglobinémie, celle-ci surtout en cas d'insuffisance rénale chronique. Des hépatites cholestatiques ont été décrites. Lors de l'administration à des patients présentant une sténose bilatérale des artères rénales ou une sténose de l'artère rénale sur rein unique, une insuffisance rénale aiguë peut survenir. L'association avec du potassium ou des diurétiques d'épargne potassique est une contre-indication relative à cause du danger d'hyperkaliémie; l'hyperkaliémie est surtout un problème en cas d'insuffisance rénale. Les IECA augmenteraient le risque d'hypoglycémie chez des patients sous antidiabétiques. Ils peuvent augmenter la lithiémie.

La grossesse constitue une contre-indication à l'utilisation des IECA en raison du risque de malformations congénitales.

La posologie initiale est plus faible dans l'hypertension réno-vasculaire que dans l'hypertension essentielle. La dose prescrite au départ est généralement aussi diminuée lorsque le malade est sous diurétiques ou suit un régime pauvre en sel, afin d'éviter les syncopes que cette première dose peut provoquer. Surtout dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, il faut être très attentif au danger d'hypotension lors de l'adaptation de la posologie. Pour la plupart des IECA, la dose doit être réduite en cas d'insuffisance rénale.

CAPTOPRIL

- ACTOPRIL 25 MG Comprimé Sécable B/60 WEST PHARMA TA Orale 12.500 DT [E]
- ACTOPRIL 50 MG Comprimé Sécable B/30 WEST PHARMA TA Orale 11.520 DT [E]
- ACTOPRIL 50 MG Comprimé Sécable B/90 WEST PHARMA TA Orale 20.200 DT [E]
- CAPOCARD 25 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 7.000 DT [E]
- CAPOCARD 50 MG Comprimé B/30 SAIPH TA Orale 12.420 DT [E]
- CAPRIL 25 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 8.695 DT [E]
- CAPRIL 25 MG Comprimé Sécable B/60 IBN AL BAYTAR TA Orale 11.650 DT [E]
- CAPRIL 50 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 16.150 DT [E]
- CAPTO-PRIL ALLIANCE 25 MG Comprimé Sécable B/30 ALLIANCE PHARMA TA Orale 5.290 DT [E]
- CAPTO-PRIL ALLIANCE 25 MG Comprimé Sécable B/90 ALLIANCE PHARMA TA Orale 14.230 DT [E]
- CAPTO-PRIL ALLIANCE 50 MG Comprimé Sécable B/30 ALLIANCE PHARMA TA Orale 9.260 DT [E]
- CAPTO-PRIL ALLIANCE 50 MG Comprimé Sécable B/90 ALLIANCE PHARMA TA Orale 25.170 DT [E]
- CONVERTAL 25 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 6.500 DT [E]
- CONVERTAL 50 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 12.000 DT [E]
- HYPOTENSYL 25 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 6.535 DT [E]
- HYPOTENSYL 50 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 12.000 DT [E]
- LOPRIL 25 MG Comprimé Sécable B/30 BMS-U P S A-TUN-SAID TA Orale 10.745 DT [E]
- LOPRIL 50 MG Comprimé Sécable B/30 BMS-U P S A-TUN-SAID TA Orale 19.255 DT [E]
- TENSOPRIL 25 MG Comprimé B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 6.860 DT [E]
- TENSOPRIL 50 MG Comprimé B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 12.650 DT [E]

ENALAPRIL

- ANGIOTEC 5 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 5.585 DT [E]
- ANGIOTEC 20 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 15.125 DT [E]
- ENAPRIL 5 MG Comprimé Sécable B/28 ADWYA TA Orale 4.470 DT [E]
- ENAPRIL 20 MG Comprimé Sécable B/28 ADWYA TA Orale 12.000 DT [E]

PERINDOPRIL

• COVERSYL 4 MG Comprimé Sécable B/30 SERVIER TA Orale 25.109 DT [E]

QUINAPRIL

- ACUITEL 5 MG Comprimé Enrobé Sécable B/28 PFIZER S.A TA Orale 8.597 DT [E]
- ACUITEL 20 MG Comprimé Enrobé Sécable B/28 PFIZER S.A TA Orale 24.118 DT [E]

RAMIPRIL

- PREVENSYL 2.5 MG Gelule B/ 30 WEST PHARMA TA Orale 18.600 DT [E]
- PREVENSYL 5 MG Gelule B/ 30 WEST PHARMA TA Orale 22.800 DT [E]
- PREVENSYL 10 MG Gelule B/ 30 WEST PHARMA TA Orale 28.370 DT [E]
- RAMIPRIL WINTHROP 2.5 MG Comprimé sécable B/28 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 17.250 DT [E]
- RAMIPRIL WINTHROP 5 MG Comprimé sécable B/28 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 20,900 DT [E]
- RAMIPRIL WINTHROP 10 MG Comprimé sécable B/28 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 26.000 DT [E]
- RAPRIL 5 MG Comprimé Sécable B/30 TERIAK TA Orale 22.500 DT [E]
- RAPRIL 10 MG Comprimé Sécable B/30 TERIAK TA Orale 28.000 DT [E]
- TRIATEC 2.5 MG Comprimé Sécable B/28 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 28.345 DT [E]
- TRIATEC 5 MG Comprimé Sécable B/28 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 35.675 DT [E]
- TRIATEC 10 MG Comprimé Sécable B/ 28 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 40.290 DT [E]

IMIDAPRIL

- TANATRIL 5 MG Comprimé Sécable B/28 HIKMA PHARMACEUTICALS TA Orale 17.763 DT [E]
- TANATRIL 10 MG Comprimé Sécable B/28 HIKMA PHARMACEUTICALS TA Orale 31.130 DT IEI

1.4.4. - Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

Ces médicaments (sartans) bloquent l'effet de l'angiotensine II au niveau des récepteurs AT_1 de l'angiotensine. Leurs effets hémodynamiques sont comparables à ceux des IECA, mais leurs effets sur le pronostic à long terme (par ex., dans l'insuffisance cardiaque ou après infarctus du myocarde) ne sont pas connus. Les effets indésirables des sartans sont comparables à ceux des IECA (par ex. hyperkaliémie, oedème angioneurotique...), mais la toux pose moins de problèmes. Les précautions en ce qui concerne la sténose des artères rénales, l'effet de première dose, la déplétion sodée, **la grossesse** etc. mentionnées pour les IECA, sont également d'application ici. Les sartans peuvent être utilisés à la place d'un IECA, lorsque ce dernier n'est pas supporté en raison de la toux.

CANDESARTAN CILEXETIL

- ATACAND 4 MG Comprimé Sécable B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 24.730 DT IEI
- ATACAND 8 MG Comprimé Sécable B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 36.130 DT [E]
- ATACAND 16 MG Comprimé Sécable B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 42.230 DT [E]

- BLOPRESS 8 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 25.250 DT [E]
- BLOPRESS 16 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 36.590 DT [E]

IRBESARTAN

- APROVEL 150 MG Comprimé B/28 SANOFI PHARMA B.M.S SNC TA Orale 33.883 DT [E]
- APROVEL 300 MG Comprimé B/28 SANOFI PHARMA B.M.S SNC TA Orale 45.738 DT [E]
- APROZAR 150 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 23.900 DT [E]
- APROZAR 300 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 34.000 DT [E]
- ARAVEN 150 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 26.220 DT [E]
- ARAVEN 300 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 37.220 DT [E]

LOSARTAN

- LOSAR 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 24.400 DT [E]
- LOSAR 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 46.000 DT [E]
- LOSAR 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/56 MEDIS TA Orale 48.000 DT [E]
- LOSAR FORT 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 MEDIS TA Orale 25.280 DT [E]
- LOSARTAN WINTHROP 100 MG Comprimé Pelliculé F/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 25.720 DT ^[E]
- LOSARTAN WINTHROP 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable F/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 23.720 DT [E]
- MEDZAR 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 DAR-ESSAYDALI TA Orale 23.620 DT [E]
- MEDZAR FORT 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 DAR-ESSAYDALI TA Orale 25.180 DT [E]
- ZARTAN 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 25.500 DT [E]
- ZARTAN FORT 100 MG Comprimé Pellicule Sécable B/28 ADWYA TA Orale 29.500 DT El

VALSARTAN

- DIOSTAR 80 MG Comprimé Pelliculé B/30 PHARMA INTERNATIONAL COMPANY TA Orale 21.470 DT [E]
- DIOSTAR 160 MG Comprimé Pelliculé B/30 PHARMA INTERNATIONAL COMPANY TA Orale 34.595 DT [E]
- TAREG 80 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 34.090 DT [E]
- TAREG 160 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 52.410 DT [E]
- VALSOTENS 80 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 ACTAVIS TA Orale 23.400 DT EI
- VALSOTENS 160 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 ACTAVIS TA Orale 38.440 DT [E]

OLMESARTAN MEDOXOMIL

- OLMETEC 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO PHARMA TA Orale 22.596 DT [E]
- OLMETEC 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO PHARMA TA Orale 33.967 DT [E]
- OLMETEC 40 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO PHARMA TA Orale 41.488 DT [E]

TELMISARTAN

- MICARDIS 40 MG Comprimé B/28 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 32.890 DT [E]
- MICARDIS 80 MG Comprimé B/28 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 39.470 DT [E]

1.4.5. - Alpha-bloquants

La *prazosine* est un α1-bloquants sélectif. Elle peut être responsable d'hypotension prononcée, parfois avec syncope, surtout au début du traitement.

Certains α-bloquants sont aussi utilisés dans le traitement symptomatique de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il va de soi qu'une hypotension peut se manifester ainsi qu'un effet antihypertenseur exagéré en cas d'association à d'autres antihypertenseurs; la prudence s'impose surtout chez les personnes âgées.

PRAZOSINE

- ALPRESS LP 2.5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 PFIZER S.A TA Orale 11.913 DT [E]
- ALPRESS LP 5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 PFIZER S.A TA Orale 20.201 DT [E]

1.4.6. - Antihypertenseurs à action centrale

Les effets indésirables de la *clonidine* sont: sédation, sécheresse de la bouche, bradycardie. A l'arrêt brusque du traitement, une hypertension rebond peut survenir. L'injection intraveineuse rapide peut entraîner de l'hypertension.

La guanfacine provoque en principe les mêmes effets indésirables avec un risque d'hypertension rebond moindre.

La méthyldopa est encore utilisée dans l'hypertension gravidique. Elle provoque cependant d'importants effets indésirables tels dépression, sédation, troubles hépatiques et rarement anémie hémolytique avec test de Coombs positif. La méthyldopa interfère avec la détermination fluorimétrique des catécholamines urinaires.

La moxonidine s'est montrée comme un antihypertenseur d'action centrale de structure et de propriétés voisines de celles de la clonidine.

Le rilmenidine est une oxazoline à propriétés antihypertensives, agit à la fois sur les structures vasomotrices bulbaires et en périphérie. Les effets indésirables sont rares, bénins et transitoires aux doses thérapeutiques, leur incidence est significativement inférieure à celle observée sous clonidine ou alphaméthyldopa.

CLONIDINE

- CATAPRESSAN 0.150 MG Solution Injectable B/10/1ML BOEHRINGER ING. TC Parentérale H [E]
- CATAPRESSAN 0.150 MG Comprimé Sécable B/30 BOEHRINGER ING. TC Orale 6.781 DT [E]

METHYLDOPA

- DOPANORE 250 MG Comprimé Enrobé B/30 SAIPH TA Orale 3.436 DT [E]
- METHYLDOPA TERIAK 250 MG Comprimé Pelliculé B/30 TERIAK TA Orale 3.110 DT [E]

MOXONIDINE

- PHYSIOTENS 0.2 MG Comprimé Pelliculé B/30 ABBOTT PRODUCTS S.A.S TA Orale 19.027 DT [E]
- PHYSIOTENS 0.4 MG Comprimé Pelliculé B/30 ABBOTT PRODUCTS S.A.S TA Orale 34.845 DT [E]

1.4.7. - Associations

Les associations fixes ne sont indiquées dans le traitement de l'hypertension que lorsque le patient réagit de façon insuffisante soit à l'un, soit à l'autre de ces agents pris isolément. Elles ne permettent pas l'adaptation individuelle de la posologie de chacun des constituants mais elles assurent peut-être une meilleure observance du traitement.

Avec de telles associations, les effets indésirables de chacune des substances peuvent se manifester et de plus, des interactions défavorables peuvent survenir, entre autres entre un β -bloquant et un antagoniste du calcium, ou entre un IECA et un diurétique thiazidique.

ATENOLOL+NIFEDIPINE

• TENORDATE 20 MG Gélule B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 20.910 DT [E]

ATENOLOL+CHLORTALIDONE

• TENORETIC 50 MG /12.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 9.915 DT [E]

DELAPRIL+INDAPAMIDE

• DELAPRIDE 30 MG /2.5 MG Comprimé Sécable FL/28 PROMEDICA s.r.l TA Orale 14.508 DT [E]

CAPTOPRIL+HYDROCHLORTHIAZIDE

- CAPTOZID Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 18.500 DT [E]
- ECAZIDE 50 MG/25 MG Comprimé Sécable B/28 BMS-UPSA-TUN SAID TA Orale 28.185 DT [E]

ENALAPRIL+HYDROCHLORTHIAZIDE

- ANGIOZIDE 20 MG/12.5 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 15.400 DT [E]
- HYPRIL 20 MG/12.5 MG Comprimé Sécable B/28 PHARMAGHREB TA Orale 15.285 DT [E]

QUINAPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE

• ACUILIX 20 MG Comprimé Sécable B/28 PFIZER S.A TA Orale 24.578 DT E

RAMIPRIL+HYDROCHLOROTHIZIDE

- TRITAZIDE 5MG/25MG Comprimé Sécable B/28 SANOFI PHARMA SA BELGIQUE TA Orale 34.086 DT [E]
- TRITAZIDE 10MG/12.5MG Comprimé Sécable B/28 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 42.000 DT [E]
- TRITAZIDE 10MG/25MG Comprimé Sécable B/28 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 42.000 DT [E]

IRBESARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE

- COAPROVEL 150 MG/12.5 MG Comprimé B/28 SANOFI PHARMA B.M.S SNC TA Orale 37.689 DT [E]
- COAPROVEL 300 MG/12.5 MG Comprimé B/28 SANOFI PHARMA B.M.S SNC TA Orale 50.899 DT [E]
- COAPROVEL 300 MG/25 MG Comprimé B/28 SANOFI PHARMA B.M.S SNC TA Orale 56.849DT [E]
- COARAVEN 150 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 29.320 DT [E]
- COARAVEN 300 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 39.320 DT [E]
- COARAVEN 300 MG/25 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 44.320 DT [E]
- COAPROZAR 150 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 26.800 DT [E]
- COAPROZAR 300 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 36.100 DT [E]

LOSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE

- CO-LOSAR 50 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 24.820 DT [E]
- CO-LOSAR 50 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 47.500 DT [E]

- CO-LOSAR FORT 100 MG/25 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/56 MEDIS TA Orale 49.500 DT [E]
- CO-LOSAR FORT 100 MG/25 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 MEDIS TA Orale 25.900 DT [E]
- CO-LOSARTAN WINTHROP 100 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé F/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 26.000 DT [E]
- CO-LOSARTAN WINTHROP 50 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable F/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 24.000 DT [E]
- CO-MEDZAR 50 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 DAR ESSAYDALI TA Orale 23.165 DT [E]
- CO-MEDZAR FORT 100MG/25MG Comprimé pelliculé Secable B/28 DAR ESSAYDALI TA Orale 25.900 DT [E]
- CO-ZARTAN 50 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 ADWYA TA Orale 26.600 DT [E]
- CO-ZARTAN FORT 100 MG/25 MG Comprimé pelliculé B/30 ADWYA TA Orale 31.000 DT [E]

VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE

- COTAREG 80 MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 35.050 DT El
- COTAREG 160 MG/25 MG Comprimé Pelliculé B/28 TERIAK TA Orale 53.830 DT [E]

CANSARTAN CILEXETIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE

- BLOPRESS 8 PLUS 8MG/12.5 MG Comprimé B/28 APM TA Orale 28.172 DT [E]
- BLOPRESS 16 PLUS 16MG/12.5 MG Comprimé B/28 APM TA Orale 33.384 DT [E]
- HYTACAND 8 MG/12.5 MG Comprimé B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 39.340 DT [E]
- HYTACAND 16 MG/12.5 MG Comprimé B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 45.460 DT [E]

OLMESARTAN MEDOXOMIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

- CO-OLMETEC 20MG/12.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO PHARMA TA Orale 39.518 DT [E]
- CO-OLMETEC 20MG/255 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO PHARMA TA Orale 40.732 DT [E]

TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE

• MICARDIS PLUS 80MG/12.5 MG Comprimé B/28 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 39.430 DT ^[E]

PERINDOPRIL+INDAPAMIDE

• BIPRETERAX 4 MG/1.25 MG Comprimé B/30 SERVIER TA Orale 36.736 DT [E]

AMLODIPINE+OLMESARTAN MEDOXOMIL

- SEVIKAR 20MG/5MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO FRANCE TA Orale 56.840 DT [E]
- SEVIKAR 40MG/5MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO FRANCE TA Orale 56.840 DT [E]
- SEVIKAR 40MG/10MG Comprimé Pelliculé B/30 DAIICHI SANKYO FRANCE TA Orale 56.840 DT [E]

AMLODIPINE+ATORVASTATINE

- CADUET 10MG/10MG Comprimé Pelliculé B/30 PFIZER TA Orale 39.940 DT [E]
- CADUET 5MG/10MG Comprimé Pelliculé B/30 PFIZER TA Orale 39.940 DT [E]

AMLODIPINE+VALSARTAN

- EXFORGE 5MG/80MG Comprimé B/28 NOVARTIS TA Orale 60.505 DT [E]
- EXFORGE 5MG/160MG Comprimé Pelliculé B/28 NOVARTIS TA Orale 68.582 DT [E]
- EXFORGE 10MG/160MG Comprimé Pelliculé B/28 NOVARTIS TA Orale 68.582 DT [E]

1.5. - DIURETIQUES

Ce chapitre traite successivement:

- des diurétiques augmentant la perte de potassium (thiazides et apparentés, diurétiques de l'anse)
- des diurétiques d'épargne potassique
- des associations d'un diurétique épargnant le potassium à un diurétique augmentant la perte de potassium.
- des diurétiques osmotiques.

Les préparations orales de potassium qui sont parfois administrées avec des thiazides ou des diurétiques de l'anse, sont reprises en fin de chapitre de même que les médicaments de l'hyperkaliémie.

Les diurétiques sont fréquemment utilisés, seuls ou associés à d'autres médicaments, dans le traitement de l'oedème (par exemple lié à une insuffisance cardiaque) et de l'hypertension.

Une seule prise quotidienne est généralement suffisante; elle ne devrait pas avoir lieu juste avant le coucher afin d'éviter une polyurie nocturne gênante. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent antagoniser l'effet diurétique et antihypertenseur des thiazides et des diurétiques de l'anse.

Les diurétiques osmotiques tels les mannitols et le glycérol sont parfois utilisés dans l'angiographie, les intoxications, le glaucome et l'hypertension intracrânienne.

1.5.1. - Diurétiques avec perte de potassium

1.5.1.1. - Thiazides et apparentés

Sous le nom de thiazides sont regroupés un certain nombre de diurétiques à noyau benzothiadiazine substitué par une fonction sulfonamide. Certaines molécules, bien que de structure différente, sont habituellement reprises dans ce groupe en raison de la similitude de leurs effets.

Les thiazides et les substances apparentées provoquent une élimination accrue de sodium et d'eau, qui est fonction de la dose. L'effet diurétique maximal est pratiquement identique pour tous les médicaments de ce groupe; ceux-ci diffèrent toutefois entre eux par la dose nécessaire pour obtenir un effet diurétique déterminé et par la durée de cet effet. Les thiazides perdent leur efficacité en cas d'insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 30 ML/min.).

Les thiazides réduisent l'excrétion urinaire du calcium d'où leur utilité dans le traitement préventif de certaines lithiases oxalo-calciques.

Les effets indésirables sont identiques pour toutes les molécules de ce groupe. Une sensation de faiblesse, des paresthésies, une photosensibilisation et des troubles gastro-intestinaux légers peuvent survenir de même qu'une déplétion potassique. Un régime riche en potassium, l'administration de sels de potassium ou l'association d'un diurétique d'épargne potassique peut se justifier si l'apport alimentaire en potassium est insuffisant ou si un digitalique est administré simultanément. Une perte potassique ayant une signification clinique importante est toutefois rarement observée, surtout lors de l'utilisation de ces diurétiques à la posologie recommandée dans l'hypertension. D'aucuns choisissent cependant d'ajouter systématiquement un supplément potassique au diurétique thiazidique, ou d'entamer le traitement avec une association diurétique d'épargne potassique et diurétique thiazidique.

Les thiazides peuvent provoquer des troubles du métabolisme glucidique (attention en cas de diabète) et une augmentation de l'uricémie (parfois avec crise de goutte). Des cas de purpura thrombopénique ont été décrits. Une insuffisance rénale peut s'aggraver en raison de la diminution du volume plasmatique. Une hypertriglycéridémie avec augmentation du VLDL-cholestérol et diminution variable du HDL-cholestérol a été décrite, mais il n'est pas établi que ces altérations persistent à long terme. Les thiazides peuvent augmenter les concentrations plasmatiques de lithium.

CHLOROTHIAZIDE

• CHLOROTHIAZIDE 500 MG Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT TC Orale 1.880 DT [E]

INDAPAMIDE

- ADEX 2.500 MG Comprimé B/30 MEDIS TC Orale 5.300 DT [E]
- ADEX LP 1.5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 MEDIS TC Orale 5.300 DT [E]
- DIUREX 2.5 MG Comprimé Pélliculé B/30 DAR ESSAYDALI TC Orale 4.980 DT [E]
- FLUDEX LP 1.5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 SAIPH TC Orale 8.270 DT [E]

1.5.1.2. - Diurétiques de l'anse

Les diurétiques de l'anse se différencient des thiazides par un effet natriurétique plus marqué et plus brutal. Il en résulte une perte plus importante d'électrolytes et d'eau qui peut s'avérer dangereuse, surtout pour les patients souffrant déjà de troubles de l'équilibre de l'eau et des électrolytes (par exemple en cas de cirrhose du foie).

Contrairement aux thiazides, les diurétiques de l'anse conservent encore leur action même lors d'une déficience marquée de la fonction rénale. Ils peuvent dès lors être employés pour favoriser la diurèse chez des patients dont la fonction rénale est altérée. Contrairement aux thiazides, les diurétiques de l'anse ont un effet calciurétique, d'où leur utilité dans le traitement de l'hypercalcémie aiguë.

Comme les thiazides, les diurétiques de l'anse peuvent provoquer une hypokaliémie, une hyperuricémie et des troubles du métabolisme glucidique. A forte dose, surtout après administration intraveineuse, ils peuvent être ototoxiques. Ils peuvent potentialiser la néphrotoxicité de certaines céphalosporines et des aminosides, et augmenter les concentrations plasmatiques de lithium.

Etant donné leur effet rapide, des substances telles le furosémide sont aussi administrées par voie intraveineuse pour accélérer la diurèse lors d'oedème pulmonaire aigu ou de certaines intoxications.

FUROSEMIDE

- ANSEMID 40 MG Comprimé. Séc B/40 WEST PHARMA TC Orale 2.700 DT [E]
- FUROLIX 20 MG Solution Injectable B/2/2ML MEDIS TC Parentérale 1.020 DT [E]
- FUROSEMIDE 40 MG Comprimé B/20 SIPHAT TC Orale 1.590 DT [E]
- FUROXEM 20 MG/2ML Solution Injectable B/5/2ML UNIMED TC Parentérale 1.800 DT [E]
- LASILIX 40 MG Comprimé Sécable B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 2.920 DT [E]
- LASILIX RETARD 60 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 AVENTIS TC Orale 4.182 DT [E]
- LASILIX SPECIAL 250 MG Solution Injectable B/5/25 ML AVENTIS TC Parentérale H [E]
- LASILIX SPECIAL 500 MG Comprimé Sécable B/50 AVENTIS TC Orale H [E]

1.5.2. - Diurétiques d'épargne potassique

Ces substances, dont certaines interviennent par antagonisme de l'aldostérone, n'ont qu'un faible pouvoir diurétique. Les diurétiques d'épargne potassique sont utilisés la plupart du temps en association avec un diurétique thiazidique ou un diurétique de l'anse pour contrecarrer la perte en potassium due à ces derniers. Dans des cas particuliers (par exemple lors d'hyperaldostéronisme), les antagonistes de l'aldostérone peuvent être utilisés seuls et à dose plus élevée. Une étude récente a montré un effet favorable de la spironolactone à faible dose sur la survie de patients atteints d'une insuffisance cardiaque grave et d'une dysfonction ventriculaire gauche.

Les diurétiques d'épargne potassique peuvent provoquer une hyperkaliémie. Ils sont dès lors contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale (attention chez le patient âgé). L'administration concomitante de suppléments potassiques sera évitée pour la même raison. La prudence s'impose en cas d'association à des antiinflammatoires non stéroïdiens, des IECA ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, toujours en raison du risque d'hyperkaliémie.

La spironolactone et les dérivés de l'acide canrénoïque peuvent entraîner de l'impuissance, une gynécomastie, une aménorrhée et une modification du timbre de la voix.

SPIRONOLACTONE

- ALDACTONE 75 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TC Orale 15.896 DT [E]
- NORACTONE 100 MG Comprimé Pelliculé B/10 SAIPH TC Orale 5.000 DT [E]

1.5.3. - Associations de diurétiques

De telles associations sont utilisées pour éviter l'hypokaliémie. Le danger d'une telle hypokaliémie sous l'effet des thiazides ou des diurétiques de l'anse est vraisemblablement surestimé. Dans certains cas (patients digitalisés, patients soumis à un régime pauvre en potassium), où l'on souhaite quand même associer un diurétique d'épargne potassique à un thiazide ou à un diurétique de l'anse, ces associations s'avèrent d'un emploi plus facile pour le patient.

Ces préparations rassemblent les effets indésirables de leurs différents composants. En raison du risque d'hyperkaliémie, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées lors d'insuffisance rénale; en outre, aucun supplément potassique ne peut être pris simultanément. Le risque d'hyperkaliémie est augmenté en cas de prise concomitante d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ou d'un antiinflammatoire non stéroïdien.

SPIRONOLACTONE+FUROSEMIDE

• ALDALIX Gélule B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TC Orale 10.046 DT [E]

AMILORIDE+HYDROCHLOROTHIAZIDE

• AMURETIC Comprimé B/20 DAR ALDAWA TA Orale 2.754 DT [E]

METHYCLOTHIAZIDE+TRIAMTERENE

• ISOBAR 150MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TC Orale 4.770 DT [E]

SPIRONOLACTONE+ALTIZIDE

 ALDACTAZINE 25 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TC Orale 10.662 DT ^[E]

1.5.4. - Préparations de potassium à usage oral

Ces préparations peuvent être indiquées pour prévenir la déplétion potassique chez des patients traités par des diurétiques qui augmentent la perte de potassium, par exemple chez des patients recevant des digitaliques ou souffrant de cirrhose hépatique. L'association de suppléments potassiques à des diurétiques d'épargne potassique (utilisés seuls ou avec des thiazides) est contre-indiquée. L'administration de potassium en cas d'insuffisance rénale et chez des patients traités par un IECA, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ou un AINS peut conduire à l'hyperkaliémie avec toutes les conséquences qui en découlent. Les sels de potassium entraînent fréquemment des troubles gastro-intestinaux; les comprimés peuvent provoquer dans de rares cas des ulcérations intestinales.

La posologie des préparations de potassium varie en fonction de la situation clinique (prophylaxie ou traitement, déficit grave ou modéré).

Dans l'hypokaliémie avec alcalose, des préparations à base de chlorure de potassium sont indiquées.

Les sels de potassium en comprimés doivent être toujours pris debout et avec un grand verre d'eau car risque de perforation et d'ulcération digestive.

POTASSIUM CHLORURE

- CHLORURE DE POTASSIUM 500 MG Comprimé B/400 SIPHAT Orale H [9]
- CHLORURE DE POTASSIUM 10% Solution Injectable B/100/10ML UNIMED Parentérale H [C]
- KALEORID LP 600 MG Comprimé Enrobé B/30 LEO Orale 2.309 DT [C]

1.5.5 - Médicaments de l'hyperkaliémie

Le polystyrène de sodium est une résine échangeuse de cations abaissant la kaliémie d'environ 1 à 2 mmol/l mais seulement en 3 à 4h. Il est indiqué dans le cas d'hyperkaliémie non menaçante. Le traitement nécessite une surveillance régulière de la kaliémie. La prise simultannée de digitaliques expose au risque de troubles du rythme en cas d'hypokaliémie.

POLYSTYRENE SULFONATE DE SODIUM

• KAYEXALATE 454 GR Poudre Pour Solution Orale B/454 GR SANOFI-AVENTIS FRANCE Orale H [E]

1.6. - MEDICAMENTS DE L'HYPOTENSION

1.6.1. - Médicaments de l'hypotension aiguë

En cas d'hypotension aiguë comme le choc, le traitement causal s'impose. En outre, des sympathicomimétiques sont souvent administrés en perfusion intraveineuse; l'injection intramusculaire ou sous-cutanée ne peut ici se justifier.

DOBUTAMINE

 DOBUTAMINE MYLAN 250 MG/20ML Solution Injectable B/10/20ML (PERFUSION) MYLAN S.A.S TA Parentérale H [V]

DOPAMINE

 DOPAMINE AGUETTANT 10MG/1ML Solution Injectable B/50/5 ML AGUETTANT TA Parentérale H [V]

NORADRENALINE

- NORADRENALINE TARTRATE AGUETTANT 2 mg/ml 8MG/4ML Solution Injectable B/10/4ML AGUETTANT TA Parentérale H [V]
- NORADRENALINE SAIPH 2mg/ml 8MG/4ML Solution Injectable B/10/4ML SAIPH TA Parentérale H IVI

GELATINE FLUIDE MODIFIEE

• GELOFUSINE Solution Injectable Fl/500 ML B.BRAUN MEDICAL Parentérale H [V]

1.6.2. - Médicaments de l'hypotension chronique

L'heptaminol est un analeptique cardio-vasculaire sympathomimétique d'action modérée, éliminé par voie urinaire sans métabolisation, proposé dans les hypotensions orthostatiques

Le mésilate de dihydroergotamine est utilisé sans beaucoup d'arguments dans l'hypotension orthostatique; ce médicament est repris dans le chapitre antimigraineux.

L'étilefrine est un stimulant cardiaque β_1 . Elle augmente le rendement cardiaque et l'irrigation du myocarde, élève la pression artérielle et veineuse, accroît la masse sanguine. Elle est également douée d'un effet stimulant alpha. Son action hypertensive est 10 fois plus durable que celle de l'adrénaline.

DIHYDROERGOTAMINE

• IKARAN LP 5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 PIERRE FABRE PRODUCTION TC Orale 14.780 DT [I]

ETILEFRINE

• EFFORTIL 0.75% Gouttes Buvables FL/30ML BOEHRINGER ING. Orale 3.875 DT [I]

HEPTAMINOL

- HEPT-A-MYL Gouttes Buvables FL/20ML ADWYA Orale 2.510 DT [1]
- HEPT-A-MYL 187.8 MG Comprimé B/20 ADWYA Orale 1.865 DT [I]
- T 12/8 30.5% Gouttes Buvables FL/20 ML OPALIA PHARMA Orale 2.415 DT [I]

1.6.3. - Epinephrine

L'épinéphrine (adrénaline) peut être utilisée pour le traitement en urgence du choc anaphylactique ou d'une réaction allergique grave.

ADRENALINE

- ADRENALINE 1 MG/ML Solution Injectable B/100/1ML RENAUDIN TA Parentérale H [V]
- ADRENALINE 0.1% 1 MG/ML Solution Injectable B/10/1ML SOPHARMA SA TA Parentérale H [V]

1.7. - MEDICAMENTS DES TROUBLES VASCULAIRES

Si les affections vasculaires artérielles périphériques (claudication, lésions trophiques) constituent une entité clinique suffisamment bien définie, il n'en va pas de même en ce qu'il est souvent convenu d'appeler "l'insuffisance vasculaire cérébrale". En effet, les perturbations de diverses fonctions cérébrales qui se manifestent surtout au cours du vieillissement, doivent être attribuées davantage à des processus involutifs (comme dans la maladie d'Alzheimer) qu'à des troubles de la circulation; ils peuvent être dus à une association des deux.

De nombreuses substances reprises dans ce chapitre ont été sélectionnées sur base de leurs propriétés vasodilatatrices. Etant donné l'incertitude quant à l'intérêt de la vasodilatation elle-même dans les troubles circulatoires, d'autres mécanismes d'action ont été évoqués. Certaines de ces substances sont toutefois dépourvues d'effet vasodilatateur. Ni la structure chimique, ni les propriétés pharmacologiques, ni un éventuel mécanisme d'action commun ne peuvent actuellement servir de base à une classification.

Le médecin qui décide de prescrire ces médicaments doit être conscient de l'apport global très limité d'une telle thérapeutique médicamenteuse. Il doit tenir compte lors de son choix des effets indésirables mais aussi du coût. Il est aussi important de ne pas poursuivre le traitement si aucun effet bénéfique ne s'est manifesté après une période raisonnable (de l'ordre de 2 à 3 mois).

Dans bon nombre de ces troubles vasculaires, un traitement par un antiagrégant tel l'acide acétylsalicylique a un rôle important.

DIHYDROERGOCRYPTINE+CAFEINE

- VASOBRAL 4 MG Comprimé Sécable B/30 CHIESI S.A TC Orale 19.370 DT [I]
- VASOBRAL Gouttes Buvables FL/50 ML CHIESI S.A TC Orale 6.120 DT [1]

DIHYDROERGOTOXINE

• ERGOKOD 0.1% Gouttes Buvables FL/50 ML SIMED TC Orale 6.110 DT [I]

GINKGO BILOBA

- GINKGO 7-4% Soluté Buvable FL/30 ML OPALIA PHARMA Orale 5.535 DT [I]
- GINKGO 7 Gélule B/30 OPALIA PHARMA Orale 6.100 DT [1]
- TANAKAN 4% Gouttes Buvables FL/30 ML TERIAK TC Orale 7.630 DT [1]
- TANAKAN 40 MG Comprimé Enrobé B/30 TERIAK TC Orale 7.985 DT [I]
- TANAKAN 40 MG Comprimé Enrobé B/90 TERIAK TC Orale 21.985 DT [1]

NAFTIDROFURYL.

- CLARANTIN 100 MG Gélule B/20 MEDOCHIMIE TC Orale 5.225 DT [I]
- PRAXILENE 100 MG Gélule B/20 MERCK LIPHA SANTE S.A.S TC Orale 5.225 DT [I]
- PRAXILENE 200 MG Comprimé Pelliculé B/20 MERCK LIPHA SANTE S.A.S TC Orale 5.520 DT [I]

PENTOXYFYLLINE

- PENTOXIPHAT LP 400 MG Comprimé Enrobé B/24 SIPHAT TC Orale 5.300 DT [I]
- TORENTAL 400 MG Comprimé à Libération Prolongée B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 8.460 DT [I]

PIRACETAM

- NOOTROPYL 800MG Comprimé Pelliculé Sécable B/45 IBN AL BAYTER TC Orale 13.170 DT [I]
- PIRACET 400 MG Comprimé Pelliculé B/60 ADWYA TC Orale 6.710 DT [1]
- PIRACET 800 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 ADWYA TC Orale 12.465 DT [I]
- PIRACET 20% Solution Buvable FL/125 ML ADWYA TC Orale 6.900 DT [I]

PIRIBEDIL

• TRIVASTAL LP 50 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 SERVIER TC Orale 9.535 DT [1]

SULODEXIDE

- VESSEL DUE F 250 ULS Capsule Molle B/50 ALFA WASSERMANN S.p.A TA Orale 20.083 DT [I]
- VESSEL DUE F 600 UL Solution Injectable B/10/2 ML ALFA WASSERMANN S.p.A TA Parentérale 12.435 DT [I]

TRIMETAZIDINE

- TAZIDINOL 20 MG Comprimé Pelliculé B/60 IBN ALBAYTAR Orale 10.520 DT I^{CI}
- VASOTRIM 20 MG Comprimé Pelliculé B/60 DAR ESSAYDALI Orale 10.810 DT [C]
- VASTAREL 20 MG/ML Gouttes Buvables FL/60ML SERVIER Orale 19.682 DT [C]
- VASTAREL 35 MG Comprimé à Liberation Modifiée B/60 SAIPH Orale 25.855 DT [C]
- VASTAZINE 20 MG Comprimé Pelliculé B/60 IBN ALBAYTAR Orale 10.520 DT [C]

1.8. - SUBSTANCES VEINOTROPES ET CAPILLAROTROPES

Les préparations envisagées ici contiennent souvent des citroflavonoïdes et d'autres substances dont l'effet attendu est une augmentation du tonus veineux et/ou une influence sur la microcirculation. Ces effets ont surtout été observés chez l'animal.

Pour certaines préparations, des études contrôlées suggèrent qu'elles apportent un soulagement temporaire des symptômes subjectifs et de l'oedème. Lors de leur prescription, il faut s'interroger quant à l'efficacité d'un tel traitement et tenir compte de son coût.

DIOSMINE

- DIOGAM 300 MG Comprimé Pelliculé B/30 PHARMAGHREB Orale 7.680 DT [C]
- DIOGAM 600 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PHARMAGHREB Orale 11.465 DT ICI

DIOSMINE+HESPERIDINE

• DAFLON 500 MG Comprimé Enrobé B/30 SAIPH Orale 14.510 DT [C]

GINKGO BILOBA+TROXERUTINE+HEPTAMINOL

• GINKOR FORT Gélule B/30 BEAUFOUR IPSEN Pharma Orale 13.082 DT [C]

VITAMINE C+EXT DE RUSCUS ACULEATUS+HESPERIDINE METHYL CHALCO

- CYCLO 3 FORT Ampoules Buvables C/30/5ML PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 8.705 DT [C]
- CYCLO 3 FORT Gélule B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 8.705 DT [C]

EXTRAIT DE RUSCUS ACULEATUS+EXTRAIT FLUIDE DE MELILOT

• CYCLO 3 Crème Dermique T/40 GR SIMED Locale 2.610 DT [C]

HEPARINE SODIQUE

 MENAVEN Gel Dermique T/60 GR MENARINI IND.FARMACEUTICHE RIUNITE SRL TA Locale 5.012 DT ^[C]

1.9. - MEDICAMENTS ANTITHROMBOTIQUES

1.9.1. - Antiagrégants

L'acide acétylsalicylique ou son sel de lysine est, pour ses propriétés antiagrégantes, actuellement utilisé principalement dans la prévention de complications thrombo-emboliques chez des patients déjà atteints d'athérosclérose symptomatique (prévention secondaire). Il s'agit des groupes de patients suivants:

- les patients avec un angor stable ou instable;
- les patients ayant déjà fait un infarctus du myocarde;
- les patients ayant déjà fait un A.I.T. ou un accident vasculaire cérébral ischémique;
- les patients avec une artériopathie périphérique;
- les patients avec une valvulopathie;
- les patients ayant subi une angioplastie ou une chirurgie de revascularisation.

L'efficacité de l'acide acétylsalicylique dans la prévention primaire reste contestée si ce n'est pour des patients présentant un risque manifestement accru (p.ex. diabète, hypertension, fibrillation auriculaire). L'acide acétylsalicylique est également utilisé dans la phase aiguë de l'infarctus du myocarde et de l'angor instable. L'unanimité n'est pas faite quant à la dose à utiliser. Dans la prévention secondaire, la posologie usuelle est de 75 à 300 mg p.j.

La ticlopidine, une thiénopyridine, est utilisée lors de pontages coronariens ou du placement de prothèses internes, en cas d'angioplastie périphérique et dans certains types d'hémodialyse. Des effets indésirables hématologiques graves, surtout une agranulocytose, peuvent survenir. Un contrôle hématologique régulier (toutes les deux semaines au début du traitement) est nécessaire.

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE

• KADERGIC 160 MG PDRE/SOL ORALE B/20 SACHETS SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 1.630 DT [E]

TICLOPIDINE

PREVOC 250 MG Comprimé Pelliculé B/20 ADVANCED PHARMACEUTICAL IND. TA Orale 11.625 DT [E]

CLOPIDOGREL

- CLOPIX 75 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 76.750 DT [E]
- CLOPIX 75 MG Comprimé Pelliculé B/60 SAIPH TA Orale 147.920 DT [E]

- CLOPIX 75 MG Comprimé Pelliculé B/90 SAIPH TA Orale 192.020 DT [E]
- PIDOGREL 75 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TA Orale 71.000 DT [E]
- PIDOGREL 75 MG Comprimé Pelliculé B/60 MEDIS TA Orale 127.800 DT [E]
- PLAGREL 75 MG Comprimé Pelliculé B/28 DAR ESSAYDALI TA Orale 59.045 DT IEI
- PLAVIX 75 MG Comprimé Pelliculé B/28 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 89.979 DT [E]

1.9.2. - Anticoagulants

L'intérêt des héparines et des dérivés de la coumarine dans les thrombo-embolies veineuses est bien établi; en présence ou en cas de risque de thrombo-embolie artérielle, il reste bien des incertitudes à côté de quelques indications bien étayées. Il va de soi que ces médicaments ont des indications en cas de fibrillation auriculaire et de mise en place d'une prothèse de hanche. Les avantages éventuels d'un traitement anticoagulant doivent être mis en balance avec le risque d'hémorragie.

1.9.2.1. - Héparines

1.9.2.1.1. - Héparines non fractionnées

Ces héparines sont administrées par voie intraveineuse ou sous-cutanée; en cas de traitement intraveineux prolongé, le degré d'anticoagulation doit être contrôlé au moyen de l'APTT ("Activated Partial Thromboplastin Time").

Lors du *traitement* d'une embolie pulmonaire ou d'une thrombose veineuse profonde, on injecte en bolus une dose initiale de 5.000 ou 10.000 unités suivie d'une perfusion en continu de 30.000 unités par 24 heures ou d'injections intraveineuses intermittentes, par exemple de 5.000 unités toutes les 4 heures (avec augmentation du risque d'hémorragie lors des pics d'incoagulabilité). Une troisième possibilité est l'injection sous-cutanée (par exemple de 10.000 unités toutes les 8 heures; on utilisera à cette fin des préparations contenant 25.000 UI/ML). L'hémorragie constitue l'effet indésirable le plus important; la protamine neutralise l'effet de l'héparine à raison de 10 mg en intraveineux pour 1.000 unités d'héparine (à renouveler le cas échéant).

Pour la prévention des thrombo-embolies veineuses, on injecte une dose de 5.000 unités en sous-cutané toutes les 12 ou toutes les 8 heures. A cette posologie, le risque d'hémorragie est faible.

L'héparine peut provoquer une thrombopénie sévère, de l'hyperkaliémie et des réactions allergiques. L'utilisation prolongée de doses élevées peut entraîner de l'ostéoporose.

HEPARINE SODIQUE

HEPARINE Medis 25 000 UI Solution Injectable B/10FL/5ML MEDIS TA Parentérale H [E]

1.9.2.1.2. - Héparines à bas poids moléculaire

Ces héparines ont une longue demi-vie et une biodisponibilité élevée. Elles sont habituellement administrées par voie sous-cutanée et ne nécessitent pas le plus souvent de contrôle de la coagulation.

Dans le *traitement* de la thrombose veineuse profonde et de l'embolie pulmonaire, la dose est de 100 UI anti-Xa par kg de poids corporel toutes les 12 heures est utilisée.

Pour la *prévention* des thrombo-embolies veineuses, on utilise en cas de risque modéré 2.000 à 3.500 UI anti-Xa une fois par jour. Des doses plus élevées sont utilisées dans les cas à haut risque (p.ex. en chirurgie orthopédique).

Les effets indésirables sont ceux des héparines non fractionnées; le risque de thrombopénie est cependant plus faible. En cas d'insuffisance rénale grave, la dose doit être adaptée.

La concentration des héparines de bas poids moléculaire dans les diverses spécialités est exprimée dans des unités différentes ou en milligrammes, comme cela figure dans les notices respectives. Le cas échéant, le facteur de conversion en UI AXa est mentionné.

DALTEPARINE SODIQUE

- FRAGMIN 2500 UI Solution Injectable B/2 Seringues/0.2ML PFIZER TA Parentérale 8.542 DT [E]
- FRAGMIN 5000 UI Solution Injectable B/2 Seringues/0.2ML PFIZER TA Parentérale 13.613 DT [E]
- FRAGMIN 7500 UI Solution Injectable B/10 Seringues/0.75ML PFIZER TA Parentérale H [E]
- FRAGMIN 10000 UI Solution Injectable B/10 Seringues/1ML PFIZER TA Parentérale H [E]

ENOXAPARINE

- ENOXA 2000UI anti-Xa/0.2ML 20 MG Solution Injectable B/2SER/0.2ML MEDIS TA Parentérale 7.370 DT [E]
- ENOXA 4000UI anti-Xa/0.4ML 40 MG Solution Injectable B/2SER/0.4ML MEDIS TA Parentérale 11.640 DT IEI
- ENOXA 6000UI anti-Xa/0.6ML 60 MG Solution Injectable B/2SER/0.6ML MEDIS TA Parentérale 13.880 DT [E]
- ENOXA 8000UI anti-Xa/0.8ML 80 MG Solution Injectable B/2SER/0.8ML MEDISTA Parentérale 16.380 DT [E]
- LOVENOX 2000UI anti-Xa/0.2ML Sol. Inj. B/6SER/0.2ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale H [E]
- LOVENOX 2000UI anti-Xa/0.2ML Sol. Inj. B/2SER/0.2ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale 11.650 DT [E]
- LOVENOX 4000 UI anti-Xa/04ML Sol. Inj. B/6SER/0.4ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale H IEI
- LOVENOX 4000UI anti-Xa/0.4ML Sol. Inj. B/2SER/0.4ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale 18.476 DT [E]
- LOVENOX 6000UI anti-Xa/0.6ML Sol. Inj. B/10SER/0.6ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale H [E]
- LOVENOX 6000UI anti-Xa/0.6ML Sol. Inj. B/2SER/0.6ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale 22.025 DT [E]
- LOVENOX 8000UI anti-Xa/0.8ML Sol. Inj. B/2SER/0.8ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale 26.124 DT [E]
- LOVENOX 8000UI anti-Xa/0.8ML Sol. Inj. B/10SER/0.8ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale H [E]
- LOVENOX 10000 UI anti-Xa/1ML Sol. Inj. B/2SER/1ML SANOFI AVENTIS TA Parentérale H [E]

NADROPARINE CALCIQUE

- FRAXIPARINE 1900 UI AXa Solution Injectable B/10SER/0.2ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXIPARINE 2850 UI AXa Solution Injectable B/2SER/0.3ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale 11.650 DT [E]
- FRAXIPARINE 2850 UI AXa Solution Injectable B/10 SER/0.3ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXIPARINE 3800 UI AXa Solution Injectable B/10 SER/0.4ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXIPARINE 5700 UI AXa Solution Injectable B/2SER/0.6ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale 22.025 DT [E]
- FRAXIPARINE 5700 UI AXa Solution Injectable B/6SER/0.6ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXIPARINE 5700 UI AXa Solution Injectable B/10SER/0.6ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXIPARINE 7600 UI AXa Solution Injectable B/2SER/0.8ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale 26.124 DT [E]
- FRAXIPARINE 7600 UI AXa Solution Injectable B/10SER/0.8ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H^[E]

- FRAXODI 19000 UI Axa/ML 11400 UI Axa/0.6ML Solution Injectable B/2/0.6ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale 44.081 DT [E]
- FRAXODI 19000 UI Axa/ML 11400 UI Axa/0.6ML Solution Injectable B/10/0.6ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H [E]
- FRAXODI 19000 UI Axa/ML 15 200 UI Axa/0.8ML Solution Injectable B/2/0.8ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale 52.219 DT [E]
- FRAXODI 19000 UI Axa/ML 15 200 UI Axa/0.8ML Solution Injectable B/10/0.8ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE, TA Parentérale H [E]

TINZAPARINE

- INNOHEP 10 000/ML 2500UI antiXa/0.25ML Solution Injectable B/2 seringues/0.25ML LEO TA Parentérale 9.154 DT [E]
- INNOHEP 10 000/ML 3500UI antiXa/0.35ML Solution Injectable B/2 seringues/0.35ML LEO TA Parentérale 12.524 DT [E]
- INNOHEP 10 000/ML 4500UI antiXa/0.45ML Solution Injectable B/2 seringues/0.45ML LEO TA Parentérale 16.193 DT [E]
- INNOHEP 20 000UI AXa/ML 10 000 UI AXa Solution Injectable B/2/0.5ML LEO TA Parentérale 42.411 DT [E]
- INNOHEP 20 000UI AXa/ML 14000 UI AXa Solution Injectable B/2/0.7ML LEO TA Parentérale 50.129 DT [E]
- INNOHEP 20 000UI AXa/ML 18000 UI AXa Solution Injectable B/2/0.9ML LEO TA Parentérale 63.633 DT [E]

1.9.2.2. - Antagonistes de la vitamine K

Les anticoagulants coumariniques sont des antagonistes compétitifs de la vitamine K. Ils inhibent au niveau de la cellule hépatique la synthèse des facteurs de coagulation II (prothrombine), VII, IX et X, ainsi que celle des inhibiteurs de la coagulation (protéine C et protéine S). L'allongement du temps de prothrombine permet d'évaluer l'effet des coumariniques. Les résultats sont actuellement exprimés en "International Normalized Ratio" (INR).

La posologie nécessaire pour atteindre le taux d'anticoagulation souhaité (INR de 2 à 3 ou 4 selon l'indication) est très variable d'un malade à l'autre. La posologie mentionnée en regard des spécialités ne constitue qu'une règle générale et doit être soigneusement adaptée aux valeurs de l'INR. Il est habituel de débuter un traitement anticoagulant par une dose de charge afin d'obtenir plus rapidement le taux d'anticoagulation désiré.

En cas d'hémorragie, les mesures suivantes s'imposent, en tenant compte de la gravité: réduction de la posologie, arrêt des coumariniques, vitamine K_1 en intraveineux et, en cas d'urgence, perfusion de PPSB (un concentré des facteurs II, VII, IX et X).

De nombreux médicaments peuvent influencer l'effet des anticoagulants coumariniques par des mécanismes pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques (principalement par action sur le métabolisme). Lors de telles associations, il sera souvent nécessaire de mesurer plus fréquemment le temps de prothrombine.

Chez la femme enceinte, les dérivés coumariniques doivent être évités en raison du danger de tératogénèse (premier trimestre) et du risque accru d'hémorragie qu'ils présentent pour le nouveau-né (administration à la fin de la grossesse); l'héparine est à préférer.

ACENOCOUMAROL

• SINTROM 4 MG Comprimé Sécable B/20 NOVARTIS PHARMA S.A.S TA Orale 1.520 DT [E]

1.9.3. - Thrombolytiques

Les thrombolytiques peuvent dissoudre des thrombi récents. Ils sont utilisés en cas d'infarctus aigu du myocarde, d'embolie pulmonaire avec répercussions hémodynamiques graves, de thrombose veineuse proximale profonde et étendue ainsi que dans l'occlusion artérielle périphérique aiguë (dans ce dernier cas, directement au niveau du caillot par la voie d'un cathéter). L'administration de thrombolytiques a été proposée en cas de thombose cérébro-vasculaire aiguë mais il n'y a pas d'unanimité à ce sujet. L'administration de thrombolytiques implique toujours un risque d'hémorragie.

ALTEPLASE

- ACTILYSE 10 MG Poudre P.Prep.Injectable B/1 FL+FL/10ML BOEHRINGER ING. TA Parentérale H [V]
- ACTILYSE 50 MG Poudre P.Prep.Injectable B/1 FL+FL/50ML BOEHRINGER ING. TA Parentérale H [V]

TENECTEPLASE

• METALYSE 10 000 U Poudre P.Prep.Injectable B/1FL+FL/20ML BOEHRINGER ING. TA Parentérale H [V]

1.10. - ANTIHEMORRAGIQUES

Il s'agit d'une série de produits appartenant à différentes classes:

- protamine et vitamine K
- hémostatiques non spécifiques.

La desmopressine, un analogue de l'hormone antidiurétique, peut être utilisée comme antihémorragique en cas de dysfonctionnement plaquettaire, dans les formes mineures d'hémophilie A (hémophilie classique) ou dans la maladie de von Willebrand, et ce souvent en association avec un antifibrinolytique. Elle est en outre utilisée chez certains patients cirrhotiques, urémiques ou après chirurgie cardio-pulmonaire. Cette substance est décrite au chapitre Hormones hypophysaires et hypothalamiques.

1.10.1. - Facteurs de coagulation

Les facteurs de coagulation sont des médicaments à usage strictement hospitalier. L'approvisionnement du pays se fait par consultation internationale des fabricants détenteurs d'Autorisation de Mise sur le Marché tunisien. Les facteurs actuellement disponibles sont les suivants :

- Facteur VIII PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE A 250 UI INJECTABLE BIOTEST PHARMA TA 205.063 DT [V]
- Facteur VIII PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE A 500 UI INJECTABLE BIOTEST PHARMA TA 406.870 DT [V]
- Facteur IX PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE B 250 UI INJECTABLE TA
- Facteur IX PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE B 500 UI INJECTABLE TA [Y]
- PPSB INJECTABLE KASKADIL 500 UI TA 621.699 DT [V]
- FIBRINOGENE HUMAIN INJECTABLE CSL BEHRING TA 617.662 DT [V]

1.10.2. - Vitamine K

La vitamine K s'utilise lorsque l'hémorragie ou la tendance hémorragique est attribuée à un manque de facteurs du complexe prothrombine (II, VII, IX, X), résultant d'une activité vitaminique K insuffisante, par exemple en cas de traitement par des anticoagulants oraux. Une hypovitaminose K due à une absorption insuffisante est rare; cependant l'administration prolongée d'antibiotiques à large spectre peut amener une diminution de la production de vitamine K par la flore intestinale. Dans des situations pathologiques déterminées comme l'obstruction des voies biliaires, la résorption de la vitamine K peut

être perturbée. Les nouveau-nés ne disposent parfois que d'une réserve insuffisante en vitamine K. Une administration prophylactique de vitamine K_1 (phytoménadione), par voie orale ou intramusculaire, à la naissance est dès lors indiquée pour prévenir des hémorragies. Chez les nouveau-nés nourris au sein et chez qui la vitamine K_1 a été administrée par voie orale à la naissance, une administration ultérieure est recommandée. L'administration de vitamine K au nouveau-né et particulièrement au prématuré est susceptible de donner lieu à une hyperbilirubinémie et à un ictère nucléaire.

Les affections hépatocellulaires avec hypoprothrombinémie due à une synthèse déficiente ne réagissent généralement pas à l'administration de vitamine K.

En cas d'effet exagéré des anticoagulants coumariniques, la vitamine K est utilisée en injection intraveineuse lente ou per os; la dose dépend de l'effet que l'on souhaite obtenir (0,5 à 5 mg).

PHYTOMENADIONE

PHYTOMENADIONE 10 MG Solution Injectable B/6/1ML MEMPHIS Parentérale 4.625 DT [E]

1.10.3. - Hémostatiques non spécifiques

Les hémostatiques non spécifiques sont administrés, sans beaucoup d'arguments, dans des hémorragies auxquelles aucune origine précise ne peut être attribuée. En présence d'une hémorragie, il faut d'abord chercher à en découvrir l'origine. L'administration chronique d'hémostatiques non spécifiques ne se justifie pas.

ETAMSYLATE

- DICYNONE 500 MG Comprimé B/20 SANOFI-AVENTIS FRANCE Orale 5.720 DT [C]
- DICYNONE 250 MG Comprimé B/20 SANOFI-AVENTIS FRANCE Orale 4.390 DT [C]
- DICYNONE 250 MG Solution Injectable B/6/2ML SANOFI- AVENTIS FRANCE Parentérale 3.060 DT [C]

1.11. - HYPOLIPIDEMIANTS

Ce chapitre reprend successivement:

- les fibrates
- les inhibiteurs de la HMG-COA-réductase (statines)
- les résines échangeuses d'ions.

Le traitement de l'hyperlipidémie doit s'inscrire dans le cadre général de la prévention cardio-vasculaire, en tenant compte du risque évalué en fonction de différents facteurs. Les mesures hygiéno-diététiques telles l'abstention de tabac et d'alcool, l'exercice physique en suffisance et un régime alimentaire équilibré sont essentielles dans un premier temps, et gardent aussi leur importance en cas de traitement avec des hypolipidémiants.

Des études publiées ces dernières années ont permis de préciser la place des statines dans la prévention primaire et secondaire des affections cardio-vasculaires. Dans ces études, un effet favorable fut observé avec certaines statines sur la morbidité et la mortalité coronariennes, sur la nécessité de procéder à une revascularisation ainsi que sur la mortalité totale, sans effets indésirables graves sur d'autres systèmes. Il est clair que les statines jouent un rôle important dans la prévention cardio-vasculaire; ces études montrent aussi un effet indiscutable sur la morbidité et la mortalité chez des patients dont le profil lipidique n'est que faiblement perturbé. Il est évident que l'effet attendu est plus important chez les patients à haut risque, c'est-à-dire en prévention secondaire. Un effet clair sur la mortalité totale n'a jamais été prouvé avec les autres classes d'hypolipidémiants.

1.11.1. - Fibrates

Les fibrates sont des agonistes des récepteurs nucléaires PPAR-a; ils modulent l'expression génique de différentes enzymes impliquées dans le métabolisme lipidique. Les fibrates font baisser les triglycérides et dans une moindre mesure le cholestérol total et le LDL-cholestérol. Ils augmentent le HDL-cholestérol.

Les fibrates peuvent potentialiser l'effet des anticoagulants coumariniques et des antidiabétiques oraux. Les fibrates peuvent dans de rares cas, surtout lorsqu'ils sont utilisés avec une statine et en cas d'insuffisance rénale, provoquer des exanthèmes et des douleurs musculaires avec augmentation du taux sérique en créatine-kinase, ce qui nécessite parfois l'arrêt du traitement. Une augmentation des transaminases peut également survenir. Le risque de lithiase biliaire cholestérolique augmente.

La posologie des fibrates doit être réduite en cas d'insuffisance rénale et de syndrome néphrotique. Les fibrates ne peuvent pas être utilisés chez l'enfant et la femme enceinte.

CIPROFIBRATE

• LIPANOR 100 MG Gélule B/30 SANOFI- AVENTIS FRANCE TC Orale 6.822 DT [E]

FENOFIBRATE

- ANTILIP 200 MG Gélule B/30 SAIPH TC Orale 13.915 DT [E]
- HYPOLIP 200 MG Gélule B/30 GALPHARMA TC Orale 9.820 DT [E]
- LIPANTHYL 160 MG Comprimé Pelliculé B/30 FOURNIER SA TC Orale 18.145 DT [E]
- LIPANTHYL 300 MG Gélule B/30 ADWYA TC Orale 9.540 DT [E]

1.11.2. - Statines

Les statines sont des inhibiteurs de l'hydroxy-3-méthyl-3-glutaryl coenzyme A- réductase (HMG-CoA-réductase) qui réduisent le LDL-cholestérol de 25 à 60% en augmentant le nombre de récepteurs hépatiques au LDL, mais elles affectent peu le HDL-cholestérol et les triglycérides. Il est possible que les statines agissent aussi en stabilisant les plaques d'athérosclérose. L'effet hypocholestérolémiant est dépendant de la dose.

Les statines doivent être associées dans certains cas à d'autres hypolipidémiants.

Les statines sont utilisés en réduction des évènements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients hypertendus traités, avec plusieurs facteurs de risque avec ou sans hyperlipidémie associée.

Des myalgies, une augmentation des transaminases et de la créatine-kinase peuvent rarement survenir avec risque de rhabdomyolyse. Ce risque est accru en cas d'usage simultané de statines et de cyclosporine, de fibrates ou d'acide nicotinique; de même certains macrolides, dérivés azoliques et inhibiteurs de la protéase peuvent, par inhibition de la métabolisation au niveau du CYP 3A4, augmenter ce risque pour l'atorvastatine et la simvastatine. Il n'est pas exclu que certaines statines renforcent l'effet des anticoagulants oraux. Le jus de pamplemousse peut augmenter la biodisponibilité de l'atorvastatine et de la simvastatine. Des troubles centraux (troubles du sommeil et de la concentration), une polyneuropathie, des troubles de l'érection, un rash et une hépatite ont été rapportés.

Les statines sont contre-indiquées durant la grossesse en raison d'une interférence possible avec la synthèse des stéroïdes chez le foetus.

ATORVASTATINE

- ATOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/28 MEDIS TA Orale 25.120 DT [E]
- ATOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/56 MEDIS TA Orale 31.640 DT [E]
- ATOR 40 MG Comprimé Pelliculé B/56 MEDIS TA Orale 60.200 DT [E]
- ATOR 40 MG Comprimé Pelliculé B/28 MEDIS TA Orale 50.320 DT [E]
- ATORVEX 10 MG Comprimé Pelliculé Fl/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 20.710 DT [E]
- ATORVEX 10 MG Comprimé Pelliculé FI/90 IBN AL BAYTAR TA Orale 53.100 DT [E]
- ATORVEX 20 MG Comprimé Pelliculé Fl/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 34.020 DT [E]
- ATORVEX 20 MG Comprimé Pelliculé Fl/90 IBN AL BAYTAR TA Orale 69.300 DT [E]
- ATORVEX 40 MG Comprimé Pelliculé Fl/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 44.375 DT [E]
- ATORVEX 40 MG Comprimé Pelliculé Fl/90 IBN AL BAYTAR TA Orale 99.900 DT [E]
- TAHOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 37.220 DT [E]
- TAHOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/56 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 58.270 DT [E]
- TAHOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/91 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 94.506 DT [E]
- TAHOR 20 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER S.A TA Orale 44.615 DT [E]
- TAHOR 40 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER S.A TA Orale 54.600 DT [E]
- TAHOR 80 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER S.A TA Orale 98.085 DT [E]
- TORVA 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 28.920 DT [E]
- TORVA 10 MG Comprimé Pelliculé B/60 SAIPH TA Orale 39.920 DT [E]
- TORVA 10 MG Comprimé Pelliculé B/90 SAIPH TA Orale 51.020 DT [E]
- TORVA 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 39.920 DT [E]
- TORVA 20 MG Comprimé Pelliculé B/60 SAIPH TA Orale 49.720 DT [E]
 TORVA 20 MG Comprimé Pelliculé B/90 SAIPH TA Orale 67.420 DT [E]
- TORVA 40 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 49.720 DT [E]
- 10kVA 40 MG Comprime Penicule B/30 SAIPH TA Orale 49.720 DT 124
- TORVA 40 MG Comprimé Pelliculé B/60 SAIPH TA Orale 75.920 DT [E]
- TORVA 40 MG Comprimé Pelliculé B/90 SAIPH TA Orale 97.920 DT [E]
- STATINOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/56 DAR ESSAYDALI TA Orale 31.190 DT [E]

FLUVASTATINE

- LESCOL 40 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Orale 31.977 DT [E]
- LESCOL 20 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Orale 24.149 DT [E]
- LESCOL 80 MG Comprimé LP B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Orale 59.180 DT [E]

PRAVASTATINE

- PRAVASTATIN 20 MG Comprimé B/30 SOPHARMA TA Orale 38.290 DT [E]
- PRAVASTATINE WINTHROP 20 MG Comprimé Sécable B/28 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 36.550 DT [E]

SIMVASTATINE

- LIPICARD 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 DAR ESSAYDALI TA Orale 23.018 DT [E]
- LIPICARD 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 DAR ESSAYDALI TA Orale 29.820 DT [E]
- REDULIP 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 29.975 DT [E]
- REDULIP 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 31.950 DT [E]
- SIMVASTATINE WINTHROP 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 17.200 DT ^[E]
- SIMVAX 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 17.200 DT [E]
- SIMVAX 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 23.500 DT [E]

- VASCOR 10 MG Comprimé Enrobé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 14.750 DT [E]
- VASCOR 20 MG Comprimé Enrobé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 29.500 DT [E]
- VASCOR 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/90 ADWYA TA Orale 45.600 DT [E]
- VASCOR 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 36.000 DT EI
- VASCOR 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/90 ADWYA TA Orale 61.600 DT [E]
- ZOVATIN 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 TERIAK TA Orale 16.980 DT [E]
- ZOVATIN 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 TERIAK TA Orale 33.750 DT [E]
- ZOVATIN 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/90 TERIAK TA Orale 45.600 DT [E]
- ZOVATIN 40 MG Comprimé Pelliculé B/30 TERIAK TA Orale 23.300 DT [E]
- ZOVATIN 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 TERIAK TA Orale 45.000 DT [E]
- ZOVATIN 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/90 TERIAK TA Orale 61.600 DT [E]

ROSUVASTATINE

- CRESTOR 5 MG Comprimé Pelliculé B/28 ASTRA ZENECA FRANCE TA Orale 30.020 DT [E]
- CRESTOR 10 MG Comprimé Pelliculé B/28 ASTRA ZENECA FRANCE TA Orale 43.929 DT [E]
- CRESTOR 20 MG Comprimé Pelliculé B/28 ASTRA ZENECA FRANCE TA Orale 65.231 DT [E]

2. - SYSTEME GASTRO-INTESTINAL

2.1. - MEDICAMENTS DE LA PATHOLOGIE GASTRIQUE ET DUODENALE

Ce chapitre reprend:

- les inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique
- les médicaments renforçant la défense de la muqueuse gastroduodénale
- les antiacides
- les spécialités contenant du diméticone ou de la carboxyméthylcellulose.

Il y a peu de temps encore, les inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique étaient à la base du traitement des ulcères gastro-duodénaux. A l'heure actuelle, le traitement antiinfectieux a toutefois pris une place importante. Si l'Helicobacter pylori (H. pylori) est mis en évidence dans le cas d'un ulcère gastro-duodénal, il faut s'efforcer de l'éliminer afin de prévenir les récidives. Plusieurs antibactériens sont actifs contre H. pylori : l'amoxicilline, la clarithromycine, les nitro-imidazolés tels le métronidazole et les tétracyclines. L'association d'antibactériens à un antihistaminique H₂ ou à un inhibiteur de la pompe à protons pendant 7 à 14 jours, permet d'éradiquer H. pylori dans 60 à 90% des cas. L'association de deux antibactériens au moins à un antisecrétoire augmente les chances d'éradication et diminue le risque de résistance. Des résistances sont plus fréquemment observées avec le métronidazole et la clarithromycine qu'avec l'amoxicilline ou les tétracyclines. L'utilité d'une éradication dans d'autres affections que l'ulcère gastroduodénal et le lymphome gastique, par exemple la dyspepsie non-ulcéreuse, n'est pas établie.

Lors du choix du schéma thérapeutique, il faut tenir compte des contre-indications éventuelles et des effets indésirables. Le succès du traitement dépend aussi de l'observance. Le schéma suivant, une association de trois médicaments, peut être recommandé :

- oméprazole 20 MG (avant le repas), ou pantoprazole 40 MG (avant le repas), ou lanzoprazole 30 MG (avant le repas)
- amoxicilline 1 G (après le repas)
- clarithromycine 500 MG (après le repas), ou métronidazole 500 MG,

et ce, à raison de 2 fois par jour pendant 7 jours ; dans l'ulcère gastrique, le traitement avec un inhibiteur de la sécrétion acide gastrique est souvent poursuivi encore pendant une quinzaine de jours.

En cas d'échec du traitement, un schéma thérapeutique de plus longue durée et avec des doses plus élevées d'inhibiteur de la pompe à protons et d'antibactériens pourrait être indiqué.

2.1.1. - Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique

La modification du pH gastrique peut influencer la résorption d'autres médicaments.

2.1.1.1. - Antihistaminiques H2

L'ulcère duodénal est l'indication principale des antihistaminiques H₂. Un traitement à dose réduite afin d'éviter une rechute n'a aucun sens après éradication effective d'H. pylori.

Dans l'ulcère gastrique, les antihistaminiques H₂ ne peuvent être prescrits qu'après exploration de la lésion ulcéreuse et vérification de la non-malignité de l'ulcère. L'effet favorable sur la douleur pourrait retarder le diagnostic dans les cas malins.

Les antihistaminiques H₂ peuvent améliorer les symptômes cliniques dans les cas d'oesophagite par reflux gastro-oesophagien, mais leur efficacité est limitée, surtout en cas d'oesophagite grave. Souvent, des doses plus élevées sont nécessaires et la durée du traitement est plus longue que dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. Les antihistaminiques H₂ peuvent prévenir les ulcères de stress survenant parfois après certaines interventions chirurgicales et dans certaines maladies graves.

Bien que les antihistaminiques H₂ puissent améliorer les symptômes du syndrome de Zollinger-Ellison, ils sont avantageusement remplacés dans cette indication par les inhibiteurs de la pompe à protons.

Les antihistaminiques H₂ sont utilisés dans les dyspepsies banales, les gastrites et le pyrosis sans oesophagite. Ce traitement peut toutefois retarder le diagnostic d'ulcère ou de cancer gastrique. Ces médicaments sont contre-indiqués dans la gastrite atrophique où ils ne peuvent que renforcer l'hypochlorhydrie.

Les effets indésirables des antihistaminiques H₂ (troubles gastro-intestinaux, céphalées, fatigue, éruptions cutanées, douleurs musculaires) ne nécessitent habituellement pas l'arrêt du traitement. Des cas de confusion mentale ont été rapportés, surtout lors d'administration parentérale de doses élevées et chez des sujets âgés ou atteints d'insuffisance rénale. De la bradycardie et de l'hypotension sont possibles lors d'injection intraveineuse. Quelques cas de néphrite interstitielle et d'hépatite ont également été décrits.

Surtout lors de traitements prolongés par la cimétidine, atteinte hématologiques (leucopénie, thrombopénie), une gynécomastie, associée ou non à une hyperprolactinémie, est possible; des cas d'impuissance ont été décrits avec la cimétidine, plus rarement avec les autres antihistaminiques H₂.

La cimétidine retarde le métabolisme hépatique de divers médicaments, notamment des anticoagulants coumariniques, de certaines benzodiazépines, de certains β -bloquants, de la phénytoïne et de la théophylline. Les autres antihistaminiques H_2 ne semblent pas entraı̂ner d'interférence cliniquement significative avec la biotransformation d'autres médicaments.

En cas d'insuffisance rénale, les doses des antihistaminiques H₂ doivent être réduites.

CIMETIDINE

- MEXINE 200 MG Solution Injectable B/10/2 ML MEDIS TC Parentérale 5.500 DT [E]
- UNITAG 200MG/2ML Solution Injectable B/10/2 ML UNIMED TC Parentérale 5.500DT [E]

FAMOTIDINE

- FAMODAR 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 SIPHAT TC Orale 5.000 DT [E]
- FAMODAR 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 SIPHAT TC Orale 15.000 DT [E]
- FAMODAR ABR 10 MG Comprimé Pelliculé B/10 SIPHAT TC Orale 2.290 DT [E]
- FAMODINE 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 IBN AL BAYTAR TC Orale 14.910 DT [E]
- FAMODINE 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TC Orale 17.337 DT [E]
- FAMODINE 40 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 IBN AL BAYTAR TC Orale 6.300 DT [E]
- GASTROSIDIN 40 MG Comprimé Pelliculé B/10 TERIAK TC Orale 5.500 DT [E]
- GASTROSIDIN 40 MG Comprimé Pelliculé B/30 TERIAK TC Orale 15.135 DT [E]
- GASTROZEN 40 MG Comprimé Pelliculé B/10 TERIAK TC Orale 5.500 DT [E]

- ULDINE 20 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TC Orale 13.200 DT [E
- ULDINE 40 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TC Orale 16.800 DT [E]
- ULDINE 40 MG Comprimé Pelliculé B/10 SAIPH TC Orale 4.720 DT [E]

RANITIDINE

- AZANTAC 75 MG Comprimé Effervescent B/14 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TC Orale 4.470 DT [E]
- AZANTAC 150 MG Comprimé Effervescent B/2TUBES/15 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TC Orale 22.427 DT [E]
- AZANTAC 300 MG Comprimé Effervescent TUBE/14 GLAXO SMITH KLINE France TC Orale 20.169 DT [E]
- RANIDINE 75MG/5ML Sirop F/150ML SIMED TC Orale 5.020 DT [E]

2.1.1.2. - Inhibiteurs de la pompe à protons

Les inhibiteurs de la pompe à protons au niveau de la cellule pariétale de l'estomac réduisent la sécrétion acide gastrique. Ils sont très efficaces dans le traitement de l'œsophagite de reflux et des ulcères gastro-duodénaux. Dans l'oesophagite de reflux, un traitement d'entretien diminue le risque de récidive. Dans le syndrome de Zollinger-Ellison, les inhibiteurs de la pompe à protons sont, à doses élevées, plus efficaces que les antihistaminiques H₂.

Des nausées, diarrhées, céphalées et éruptions cutanées peuvent survenir. L'oméprazole peut ralentir le métabolisme de médicaments tels la phénytoïne, la warfarine et certaines benzodiazépines (diazépam, triazolam, lorazépam...). Le risque de telles interactions paraît faible avec le lansoprazole et le pantoprazole. Avant l'instauration d'un traitement, il est impératif d'exclure l'existence d'un processus néoplasique.

LANSOPRAZOLE

- IPPZOR 15MG Gélule FL/7 TERIAK TC Orale 4.650 DT [E]
- IPPZOR 15MG Gélule FL/15 TERIAK TC Orale 9.900 DT [E]
- IPPZOR 15MG Gélule FL/28 TERIAK TC Orale 16.800 DT [E]
- IPPZOR 30MG Gélule FL/28 TERIAK TC Orale 30.860 DT [E]
- IPPZOR 30MG Gélule FL/14 TERIAK TC Orale 16.800 DT [E]
- INIPRAZOL 15 MG Gélule FL/8 WEST PHARMA TC Orale 5.100 DT [E]
- INIPRAZOL 30 MG Gélule FL/14 WEST PHARMA TC Orale 16.920 DT [E]
- LANSOPRAL 15 MG Gélule FL/7 DAR-ESSAYDALI. TC Orale 5.100 DT [E]
- LANSOPRAL 15 MG Gélule FL/15 DAR ESSAYDALI TC Orale 10.940 DT [E]
- LANSOPRAL 15 MG Gélule FL/30 DAR-ESSAYDALI. TC Orale 18.750 DT [E]
- LANSOPRAL 30 MG Gélule FL/14 DAR ESSAYDALI TC Orale 20.915 DT [E]
- LANSOPRAL 30 MG Gélule FL/28 DAR-ESSAYDALI. TC Orale 35.840 DT [E]
- LANZOR 15 MG Gélule FL/7 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 8.795 DT [E]
- LANZOR 15 MG Gélule FL/15 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 19.085 DT [E]
- LANZOR 30 MG Gélule FL/14 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 35.620 DT [E]
- PRAZOR 15MG Gélule B/16 SIPHAT TC Orale 9.375 DT [E]
- PRAZOR 30MG Gélule B/16 SIPHAT TC Orale 17.920 DT [E]

OMEPRAZOLE

- BELIFAX 10 MG Gélule FL/14 PHARMAGHREB TC Orale 11.995 DT [E]
- BELIFAX 20 MG Gélule FL/7 PHARMAGHREB TC Orale 8.400 DT [E]
- BELIFAX 20 MG Gélule FL/14 PHARMAGHREB TC Orale 22.900 DT [E
- BELIFAX 20 MG Gélule FL/28 PHARMAGHREB TC Orale 29.700 DT [E
- GASTRAL 10 MG Gélule FL/14 GALPHARMA TC Orale 11.850 DT [E]
- GASTRAL 10 MG Gélule FL/7 GALPHARMA TC Orale 5.920 DT 🖪

- GASTRAL 20 MG Gélule FL/8 GALPHARMA TC Orale 10.800 DT [E]
- GASTRAL 20 MG Gélule FL/14 GALPHARMA TC Orale 21.920 DT [E]
- GASTRAL 20 MG Gélule FL/30 GALPHARMA TC Orale 34.000 DT [E]
- IPPROTON 10 MG Gélule B/8 MEDIS TC Orale 5.760 DT [E]
- IPPROTON 10 MG Gélule B/16 MEDIS TC Orale 10.240 DT [E]
- IPPROTON 10 MG Gélule B/28 MEDIS TC Orale 16.800 DT [E]
- IPPROTON 20 MG Gélule B/8 MEDIS TC Orale 10.950 DT [E]
- IPPROTON 20 MG Gélule B/16 MEDIS TC Orale 19.800 DT [E]
- IPPROTON 20 MG Gélule B/28 MEDIS TC Orale 34.950 DT [E]
- IPPROTON PERFUSION 40 MG Poudre P.Prep.Injectable B/1flacon TC Parentérale 13.900 DT [E]
- MEPRAZOL 10 MG Gélule FL/14 DAR ESSAYDALI TC Orale 8.720 DT 🖭
- MEPRAZOL 20 MG Gélule FL/7 DAR ESSAYDALI TC Orale 8.420 DT [E]
- MEPRAZOL 20 MG Gélule FL/14 DAR ESSAYDALI TC Orale 16.452 DT [E]
- MEPRAZOL 20 MG Gélule FL/28 DAR ESSAYDALI TC Orale 29.815 DT [E]
- MOPRAL 20 MG Gélule FL/14 ADWYA TC Orale 39.390 DT [E]
- OMEPRAZOLE WINTHROP 20 MG Gélule Fl/14 WINTHROP TC Orale 17.000 DT [E]
- OMEPRAZOLE WINTHROP 20 MG Gélule Fl/28 WINTHROP TC Orale 29.500 DT [E]
- OMEZOL 10 MG Gélule Boîte/14 SAIPH TC Orale 14.920 DT [E]
- OMEZOL 20 MG Gélule Boîte/7 SAIPH TC Orale 11.220 DT [E]
- OMEZOL 20 MG Gélule Boîte/14 SAIPH TC Orale 22.980 DT [E]
- OMEZOL 20 MG Gélule Boîte/28 SAIPH TC Orale 34.875 DT [E]
- OPRAZOLE 10 MG Comprimé Pelliculé FL/14 IBN AL BAYTAR TC Orale 8.400 DT [E]
- OPRAZOLE 20 MG Comprimé Pelliculé B/7 IBN AL BAYTAR TC Orale 8.420 DT [E]
- OPRAZOLE 20 MG Comprimé Pelliculé FL/14 IBN AL BAYTAR TC Orale 12.600 DT [E]
- OPRAZOLE 20 MG Comprimé Pelliculé B/28 IBN AL BAYTAR TC Orale 24.070 DT [E]

PANTOPRAZOLE

- RAZON 20 MG Comprimé Gastrorésistant B/10 SAIPH TC Orale 6.670 DT [E]
- RAZON 20 MG Comprimé Gastrorésistant B/20 SAIPH TC Orale 12.820 DT [E]
- RAZON 20 MG Comprimé Gastrorésistant B/30 SAIPH TC Orale 18.920 DT [E]
- RAZON 40 MG Comprimé Gastrorésistant B/7 SAIPH TC Orale 9.920 DT [E]
- RAZON 40MG Comprimé Gastrorésistant B/14 SAIPH TC Orale 18.420 DT [E]
- RAZON 40MG Comprimé Gastrorésistant B/28 SAIPH TC Orale 29.820 DT [E]

ESOMEPRAZOLE

- ESORAL 20MG Gélule Gastrorésistant B/8 MEDIS TC Orale 9.900 DT [E]
- ESORAL 20MG Gélule B/16 MEDIS TC Orale 19.760 DT [E]
- ESORAL 20MG Gélule B/28 MEDIS TC Orale 29.395 DT [E]
- ESORAL 40MG Gélule Gastrorésistant B/8 MEDIS TC Orale 14.700 DT [E]
- ESORAL 40MG Gélule B/16 MEDIS TC Orale 28.880 DT [E]
- ESORAL 40MG Gélule B/28 MEDIS TC Orale 48.015 DT [E]
- INEXIUM 40MG Comprimé Gastrorésistant B/14 ASTRA ZENECA TC Orale 31.390 DT EI
- INEXIUM 20MG Comprimé Gastrorésistant B/14 ASTRA ZENECA TC Orale 20.925 DT [E]
- INEXIUM 20MG Comprimé Gastrorésistant B/7 ASTRA ZENECA TC Orale 10.740 DT [E]
- IPPSIUM 20MG Gélule Gastrorésistant Fl/7 OPALIA PHARMA TC Orale 7.500 DT [E]
- IPPSIUM 20MG Gélule Gastrorésistant Fl/14 OPALIA PHARMA TC Orale 16.550 DT [E]
- IPPSIUM 20MG Gélule Gastrorésistant Fl/28 OPALIA PHARMA TC Orale 29.100 DT [E]
- IPPSIUM 40MG Gélule Gastrorésistant Fl/14 OPALIA PHARMA TC Orale 25.200 DT [E]
- IPPSIUM 40MG Gélule Gastrorésistant Fl/28 OPALIA PHARMA TC Orale 47.900 DT [E]
- MESOPRAL 20MG Gélule Gastro-résist Fl/16 TERIAK TC Orale 16.000 DT [E]
- MESOPRAL 40MG Gélule Gastro-résist Fl/16 TERIAK TC Orale 24.500 DT [E]

2.1.2. - Médicaments renforçant les défenses de la muqueuse gastroduodénale

Le sucralfate, une combinaison de disaccharide sulfaté et d'hydroxyde d'aluminium, forme en milieu acide un complexe avec les protéines au niveau de la surface ulcéreuse ; la muqueuse est ainsi protégée de l'action de l'acide chlorhydrique, de la pepsine et des acides biliaires, ce qui peut être utile dans le traitement des lésions gastro-duodénales dues à un reflux biliaire. Il peut provoquer de la constipation et en raison de son pouvoir adsorbant, empêcher la résorption de certains médicaments notamment des tétracyclines et de la phénytoïne.

Le sucralfate soulage moins vite la douleur mais permet d'obtenir en 4 à 6 semaines un pourcentage de guérisons d'ulcères gastro-duodénaux comparable à celui obtenu avec les antihistaminiques H₂. Un traitement d'entretien avec ce médicament ne se justifie pas. Etant donné la perte d'une grande partie de son activité lorsque le milieu n'est pas acide, il est déconseillé de l'administrer en même temps que des antacides ou des inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique.

SUCRALFATE

• ULCAR 1GR Suspension Buvable B/30 Sachet SANOFI AVENTIS FRANCE Orale 10.905 DT [1]

ATTAPULGITE DE MORMOIRON ACTIVEE

- ACTAPULGITE NOURRISONS 1GR Poudre Pour Suspension Orale B/20 sachets TERIAK Orale 2.895 DT [I]
- ACTAPULGITE ENFANTS ET ADULTES 3 GR Poudre Pour Suspension Orale B/16 sachets TERIAK Orale 3.710 DT [I]

DIOSMECTINE

• SMECTA 3 GR Poudre Pour Suspension Orale B/30S/3.6G BEAUFOUR IPSEN Pharma Orale 6.270 DT [I]

MONTMORILLONITE BEIDELLITIQUE

BEDELIX 3 GR Poudre Pour Suspension Orale B/30 sachets TERIAK Orale 6.540 DT [I]

2.1.3. - Antacides

Aux doses habituellement utilisées, les antacides apportent un soulagement de la douleur en cas d'ulcères oesophagiens, gastriques ou duodénaux, mais ils n'influencent probablement pas la vitesse de cicatrisation.

Les antacides peuvent influencer la résorption d'autres médicaments soit par modification du pH gastrique, soit par formation de complexes non résorbables avec divers médicaments, notamment les tétracyclines.

Le carbonate de calcium peut être responsable d'alcalose et d'excrétion urinaire augmentée de calcium. Les sels calciques formés dans l'intestin peuvent entraîner de la constipation.

L'hydroxyde de magnésium a des propriétés laxatives. L'insuffisance rénale peut entraîner une rétention de magnésium qui se manifeste par des troubles neuromusculaires ou cardio-vasculaires. Le carbonate et le trisilicate de magnésium n'ont pas d'avantage sur l'hydroxyde de magnésium.

L'algeldrate (ou hydroxyde d'aluminium) peut entraîner dans l'intestin la formation de phosphates d'aluminium insolubles avec risque d'hypophosphatémie et d'ostéomalacie. Malgré sa faible résorption,

une accumulation de l'aluminium est toutefois possible en cas d'insuffisance rénale. L'aluminium peut causer de la constipation.

L'intérêt de beaucoup de ces associations de plusieurs antacides n'est pas évident.

ALUMINIUM HYDROXYDE+ DIMETICONE

• DI-ANTACID Comprimé B/30 SIPHAT Orale 2.800 DT [I]

ALUMINIUM HYDROXYDE+MAGNESIUM HYDROXYDE

• MOXAL Comprimé à Croquer B/30 JULPHAR Orale 1.879 DT [1]

ALUMINIUM OXYDE

• ROCGEL Gel Oral B/24S/10ML D & A PHARMA Orale 6.706 DT [I]

ALUMINIUM OXYDE+ACIDE ALGINIQUE

• TOPAAL Comprimé à Croquer B/42 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 4.320 DT [1]

ALUMINIUM PHOSPHATE

• PHOSPHALUGEL Gel Oral B/26 SACHETS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE Orale 4.555 DT [1]

DIMETICONE+HYDROXYDE D'AL ET DE MG

• DI-ANTACID Suspension Buvable FL/180 ML SIPHAT Orale 2.355 DT [I]

HYDROXYDE D'AL ET DE MG

- ANTACID Suspension Buvable FL/180 ML SIPHAT Orale 2.170 DT [I]
- GASTRAMYL Suspension Buvable FL/200 ML PHARMADERM Orale 2.385 DT [1]

CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE

• CALMACIDE Comprimé à sucer B/24 TERIAK Orale 2.755 DT [1]

DIMETICONE+GAIAZYLENE

• PEPSANE Gel Orale B/30 ROSA-PHYTOPHARM Orale 6.806 DT [I]

ALGINATES

- APYROSIS Suspension Buvable FL/250 ML OPALIA PHARMA Orale 4.200 DT [I]
- APYROSIS Nour. Suspension Buvable FL/150 ML OPALIA PHARMA Orale 3.165 DT [I]
- APYROSIS Suspension Buvable B/24 Sachets-dose/10ML OPALIA PHARMA Orale 4.300 DT [I]
- GAVISCON Suspension Buvable B/24SACHETS RECKITT Orale 4.380 DT [I]

CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE+SIMETHICONE

• DEFLATINE Comprimé à Sucer B/16 TERIAK Orale 2.800 DT [I]

2.1.4. - Divers

Le diméticone peut être utilisé lorsqu'un excès de gaz intestinaux est responsable de malaises divers.

La boldine est indiquée dans le traitement d'appoint des troubles dyspeptiques, à forte dose peut être à l'origine de diarrhée.

BOLDINE

 OXYBOLDINE 0.5MG Comprimé Effervescent B/2 tubes/12 COOPERATION PHAR%ACEUTIQUE FRANCAISE Orale 4.256 DT [C]

2.2. - SPASMOLYTIQUES

Ce chapitre reprend:

- les anticholinergiques
- les spasmolytiques musculotropes

Les spasmolytiques proposés pour le traitement de troubles mictionnels sont repris dans le chapitre Médicaments du système uro-génital.

2.2.1. - Anticholinergiques

Outre l'atropine (dl-hyoscyamine), il existe plusieurs dérivés semi-synthétiques ou synthétiques. Les anticholinergiques peuvent être utilisés pour leur action spasmolytique. Ils sont aussi utilisés en association avec des analgésiques pour soulager entre autres les douleurs des coliques biliaires.

Les effets indésirables des anticholinergiques sont fréquents et surviennent déjà aux doses thérapeutiques. Il s'agit surtout de sécheresse de la bouche, palpitations, constipation et troubles de l'accommodation. En raison du risque de rétention urinaire et d'augmentation de la pression intra-oculaire, ils sont contre-indiqués dans l'adénome prostatique et le glaucome à angle fermé. Ils ne peuvent pas être prescrits en cas de reflux gastro-œsophagien, de sténose du pylore ou d'atonie intestinale.

CHLORDIAZEPOXIDE+CLIDINIUM

• LIBRAX Comprimé Dragéifié B/30 STERIPHARMA MAROC TA Orale 2.970 DT [1]

PRIFINIUM

• RIABAL ENFANT Solution Buvable FL/50 ML TERIAK TC Orale 4.570 DT [I]

N-BUTYLHYOSCINE BROMURE

- BUSCOPAN 20 MG Solution Injectable B/4/1ML SIPHAT TA Parentérale 1.696 DT [1]
- BUSCOPAN 10 MG Suppositoire B/5 SIPHAT TA Rectale 0.790 DT [1]
- BUSCOPAN 10 MG Comprimé Enrobé B/40 SIPHAT TA Orale 3.282 DT [I]

2.2.2. - Spasmolytiques musculotropes

Les spasmolytiques dits musculotropes agissent directement sur la fibre musculaire lisse. Ces substances n'ont pas de place dans les affections œsophagiennes ou gastriques. Elles sont utilisées dans les douleurs liées à la lithiase urinaire et biliaire, dans l'hypermotricité colique associée aux diarrhées ainsi que dans le syndrome de l'intestin irritable.

MEBEVERINE

• DUSPATALIN 200 MG Gélule B/16 SIPHAT TC Orale 5.990 DT [I]

PINAVERIUM

• DICETEL 100 MG Comprimé Pelliculé B/20 TERIAK TC Orale 10.900 DT [I]

ALVERINE CITRATE+SIMETICONE

• METEOSPASMYL 60 MG Capsule B/20 MAYOLY SPINDLER Orale 4.160 DT [I]

TRIMEBUTINE

- COLOSPASMYL 100 MG Comprimé Pelliculé B/30 ADWYA TC Orale 3.980 DT [I]
- COLOSPASMYL 200 MG Comprimé Sécable B/15 ADWYA TC Orale 3.600 DT [I]
- COLOSPASMYL 74.4 MG Granules Pour Suspension buv B/30 sachets ADWYA TC Orale 5.200 DT [1]
- DEBRICOL 4.8 MG/ML Granules Pour Suspension buv. FL/100ML GALPHARMA TC Orale 1.400 DT [I]
- DEBRICOL 4.8 MG/ML Granules Pour Suspension buv. FL/250ML GALPHARMA TC Orale 2.800 DT [1]
- DEBRICOL 100 MG Comprimé B/30 GALPHARMA TC Orale 3.920 DT [1]
- DEBRICOL 200 MG Comprimé Sécable B/20 GALPHARMA TC Orale 4.800 DT [1]
- DEBRICOL 74.4 MG Granules Pour Suspension buv. B/30 Sachets GALPHARMA TC Orale 4.920 DT [1]
- DEBRIDAT 100 MG Comprimé Pelliculé B/30 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TC Orale 5.130 DT [1]
- DEBRIDAT 200 MG Comprimé Pelliculé B/15 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TC Orale 5.130 DT [I]
- DEBRIDAT 74.4 MG Granules Pour Suspension buv. B/30 SACHETS PFIZER S.A TC Orale 7.250 DT [I]
- DEBRIDAT 4.8 MG/ML Granules Pour Suspension buv. FL/250ML+godet doseur PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TC Orale 3.195 DT [I]
- DEBRIDAT 4.8 MG/ML Granules Pour Suspension buv. FL/125ML+pip.doseuse PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TC Orale 1.900 DT [I]
- TRIMEGAM 100 MG Comprimé B/30 PHARMAGHREB TC Orale 4.190 DT [1]
- TRIMEDINE 100 MG Gellule B/30 OPALIA PHARMA TC Orale 4.180 DT [1]

OTYLONIUM

• SPASMOMEN 40 MG Comprimé Dragéifié B/10 MENARINI TC Orale 9.435 DT [I]

PHLOROGLUCINOL

• SPASMOCALM 80 MG Comprimé Orodispersible B/20 COOPER Orale 7.260 DT [1]

PHLOROGLUCINOL + SIMETHICONE

• METEOXANE Gélule B/60 IPRAD Orale 6.677 DT^[I]

PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGLUCINOL

• SPASMED Solution Injectable B/6/4 ML UNIMED Parentérale 3.525 DT [1]

2.3. - FERMENTS DIGESTIFS

Extrait de pancréas apportant les enzymes pancréatiques nécessaires à la digestion (lipases, protéases, amylases) : les spécialités en gélules contenant des micro-granules ou des micro-comprimés à enrobage gastro-résistant sont particulièrement intéressantes, les enzymes pancréatiques étant ainsi protégées d'une dégradation indésirable par l'acidité gastrique.

PANCREATINE

CREON 12 000 U 150 MG Gélule B/60 ABBOTT PRODUCTS S.A.S Orale 19.051 DT [E]

2.4. - MEDICAMENTS POUR LE FOIE ET LA VESICULE : CHOLAGOGUES, CHOLERETIQUES ET HEPATOTROPES

Ces médicaments sont proposés pour un large éventail de symptômes attribués à la sphère hépatobiliaire mais il n'existe pas d'études cliniques permettant d'étayer ces assertions. De plus, certaines de ces substances sont contre-indiquées dans l'insuffisance hépatique.

SORBITOL+CHOLINE

• SORBITOCHOLINE Ampoules Buvables C/20/10 ML SIPHAT Orale 6.210 DT [C]

2.5. - ANTIEMETIQUES

Ce chapitre reprend :

- les gastroprokinétiques
- les antagonistes 5HT₃
- les antihistaminiques H₁

Certains antihistaminiques H₁ et neuroleptiques sont également utilisés comme antiémétiques.

Le traitement symptomatique des nausées et des vomissements n'est justifié qu'après l'établissement du diagnostic et pour autant qu'il ne puisse retarder des mesures appropriées. Les vomissements aigüs survenant après excès alimentaires ou éthyliques requièrent rarement un traitement particulier.

Les nausées et vomissements du début de grossesse régressent souvent spontanément ou par des mesures diététiques banales. Ce n'est que dans une minorité de cas qu'un traitement antiémétique s'avérera nécessaire. Ces symptômes surviennent à un moment critique de l'organogenèse ; la prudence s'impose particulièrement.

La prise de médicaments peut être la cause de nausées et de vomissements. Souvent, la suppression du médicament responsable s'imposera. Certains cytostatiques et la radiothérapie peuvent provoquer des vomissements qui requièrent l'administration d'antiémétiques.

2.5.1. - Gastroprokinétiques

Le *métoclopramide* est une substance apparentée aux neuroleptiques. Il augmente le tonus du sphincter œsophagien inférieur et le péristaltisme coordonné de l'antre (accélérant ainsi la vidange gastrique). Son action peut être entravée par les médicaments ayant des propriétés anticholinergiques. Ce médicament peut être utilisé dans des nausées et vomissements d'origines diverses. Le métoclopramide peut être également utile dans le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

Les effets indésirables de ces substances sont habituellement bénins et liés à ces propriétés pharmacologiques. Des crampes abdominales ou de la diarrhée sont rares. Le métoclopramide peut parfois provoquer de la somnolence et, surtout chez les jeunes, des symptômes extrapyramidaux tels

crises oculogyres, dyskinésies ou dystonies. Les gastroprokinétiques peuvent provoquer une hyperprolactinémie qui est rarement responsable de galactorrhée ou d'impuissance. L'association avec un neuroleptique est contre-indiquée.

Les gastroprokinétiques peuvent, en raison de l'accélération de la vidange gastrique, modifier la résorption de certains médicaments. Ils sont sans action sur la sécrétion gastrique.

METOCLOPRAMIDE

- DOPERAN 10 MG/2MG Solution Injectable B/4/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.350 DT [I]
- PRADIS FORT 0.4% Gouttes Buvables FL/30 ML OPALIA PHARMA TA Orale 1.655 DT [I]
- PRADIS 5 MG/5ML Solution Buvable FL/200 ML OPALIA PHARMA TA Orale 1.880 DT [I]
- PRADIS 10 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TA Rectale 1.600 DT [I]
- PRAMIDYL 10 10MG/2ML Solution Injectable B/4/2 ML DORCAS TA Parentérale 1.400 DT [I]
- PRAMIDYL per os 0.1% Solution Buvable Fl/200ML DORCAS TA Orale 1.780 DT [I]
- PRIMPERAN 0.1% Solution Buvable FL/200 ML ADWYA TA Orale 2.495 DT [I]
- PRIMPERAN 10 MG Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT TA Parentérale 1.570 DT [I]
- PRIMPERAN 10 MG Comprimé Sécable B/40 ADWYA TA Orale 2.970 DT [1]

DOMPERIDONE

- BIPERIDYS 20MG Comprimé Pelliculé Sécable B/15 PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION TUNISIE TC Orale 4.950 DT [I]
- BIPERIDYS 20MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION TUNISIE TC Orale 7.450 DT [I]
- DOMPER 10 MG Comprimé B/40 OPALIA PHARMA TC Orale 5.500 DT [I]
- DOMPER 1MG/ML Suspension Buvable FL/200ML OPALIA PHARMA TC Orale 5.500 DT [I]
- MOTILIUM 10 MG Comprimé B/40 PHARMAGHREB TC Orale 7.435 DT [I]
- MOTILIUM 1MG/ML Suspension Buvable FL/200ML+pipette PHARMAGHREB TC Orale 7.170 DT [I]
- PERIDYS 1MG/ML Suspension Buvable FL/200ML+pipette PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION TUNISIE TC Orale 5.650 DT [I]

2.5.2. - Antagonistes 5HT₃

Les antagonistes des récepteurs 5HT₃ sont efficaces contre les nausées et vomissements postopératoires ou induits par la chimiothérapie. Des céphalées légères, de la constipation et une augmentation transitoire des transaminases peuvent survenir.

ONDANSETRON

- ONDANSETRON 8 MG Comprimé Pelliculé B/10 MEDIS TA Parentérale H IVI
- ONDANSETRON MEDIS 4 MG/2 ML Solution Injectable B/5/2 ML MEDIS TA Parentérale H IVI
- ONDANSETRON MEDIS 8 MG/4 ML Solution Injectable B/5/4ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- ONDANSETRON UNIMED 8 MG/4 ML Solution Injectable B/10/4ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- ONDANSETRON UNIMED 4 MG/2 ML Solution Injectable B/10/2ML MEDIS TA Parentérale H [V]

2.5.3. – Antihistaminiques H₁

Certains antihistaminiques, en paticulier avec un effet anticholinergique marqué, sont efficaces dans le mal du transport et dans certains troubles labyrinthiques.

DIPHENHYDRAMINE

• NAUTAMINE 90 MG Comprimé Sécable B/20 TERIAK Orale 2.895 DT [I]

2.6. - LAXATIFS

Dans ce chapitre, les classes suivantes sont commentées:

- les laxatifs de lest
- la paraffine liquide
- les laxatifs osmotiques
- les laxatifs à usage rectal.

Dans le traitement de la constipation, il suffit souvent d'appliquer des mesures diététiques adéquates, d'avoir une activité physique, de ne pas ignorer le besoin de défécation et de prendre du temps à la toilette. L'emploi chronique de laxatifs peut être responsable de troubles graves.

2.6.1. - Laxatifs de lest

L'augmentation du volume du bol fécal stimule l'activité motrice du côlon; cette augmentation peut être obtenue soit par une alimentation plus riche en fibres de céréales, soit par la prise de polysaccharides non digestibles.

Les effets indésirables sont en général bénins. Des douleurs abdominales et des phénomènes de flatulence sont parfois signalés au début du traitement. Les cas d'obstruction intestinale décrits ne sont en général survenus que lors d'une consommation insuffisante de liquide, et surtout chez des sujets âgés ou atteints de lésions sténosantes.

GOMME DE STERCULIA

• NORMACOL Granules B/30/10 GR NORGINE PHARMA Orale 10.330 DT [C]

MEPROBAMATE+GOMME DE STERCULIA+KAOLIN

• KAOLOGEAIS Granules B/250 GR EREMPHARMA FRANCE TC Orale 8.840 DT [9]

GOMME DE STERCULIA+KAOLIN+MAGNESIUM SULFATE

2.6.2. - Paraffine liquide

L'usage de paraffine liquide doit être évité chez les sujets âgés, les patients affaiblis ou avec des troubles de la déglutition étant donné qu'elle peut entraîner des pneumonies graisseuses. A long terme, elle peut diminuer la résorption des vitamines liposolubles.

HUILE DE PARAFFINE

• LAXAFINE NATURE Solution Buvable FL/250 ML PHARMAGHREB Orale 2.435 DT [C]

2.6.3. - Laxatifs osmotiques

2.6.3.1. - Lactulose et sorbitol

Le *lactulose*, un disaccharide synthétique, atteint tel quel le côlon en raison de l'absence dans le grêle de la disaccharidase correspondante. Les bactéries du côlon le scindent en monosaccharides non résorbables tels le galactose, le fructose et le *sorbitol* qui agissent principalement comme agents osmotiques. De la flatulence et des crampes abdominales peuvent se manifester. le lactulose est également utilisé dans

l'encéphalopathie hépatique ; en acidifiant le contenu intestinal, il diminue la résorption de l'ammoniaque. Dans cette indication, il est administré à des doses beaucoup plus élevées.

LACTULOSE

- DUPHALAC 10 GR Solution Buyable B/20/15ML TERIAK Orale 9.488 DT [G]
- DUPHALAC 66.5% Solution Buvable FL/200 ML TERIAK Orale 6.805 DT [C]
- LACTULOSE Solution Buvable FL/200 ML OPALIA PHARMA Orale 4.725 DT [C]
- LACTULOSE Solution Buvable B/20 Sachets-dose/15ML OPALIA PHARMA Orale 6.800 DT [C]

SORBITOL

• SORBITOL 5 GR Poudre Pour Suspension Orale B/20 SACH SIPHAT Orale 2.210 DT [C]

2.6.3.2. - Autres

Ils agissent par leur pouvoir osmotique. Les effets indésirables sont la déshydratation et la résorption de sodium. Les propriétés laxatives du macrogol sont liées à un accroissement du volume des liquides intestinaux. Le macrogol est à éviter chez les patients souffrant d'obstruction intestinale, de perforation ou d'un mégacôlon toxique. Toutefois, le polyethylène glycol est indiqué dans le traitement de l'impaction fécale chez l'adulte.

MAGNESIUM HYDROXYDE

 MAGNESIE S.PELLEGRINO AROME ANIS Poudre Orale Effervescente FL/125 GR ACTIPHARM SA Orale 6.515 DT [C]

POLYETHYLENE GLYCOL

- FORLAX 4G Poudre Pour Solution Orale B/20 IPSEN PHARMA Orale 5.000 DT [C]
- FORTRANS 64 GR Poudre Pour Suspension Orale B/4 S/74GR BEAUFOUR IPSEN PHARMA Orale 13.170 DT [E]
- ILAX 10G Poudre pour Solution Orale B/20 Sachets TERIAK Orale 6.200 DT [E]
- ILAX 4G Poudre pour Solution Orale B/20 Sachets TERIAK Orale 3.750 DT [E]
- KLEAN PREP Poudre Pour Solution Orale B/2+2 SACHETS NORGINE PHARMA Orale 6.338 DT [E]
- KLEAN PREP Poudre Pour Solution Orale B/4+4 SACHETS NORGINE PHARMA Orale 11.035 DT [E]
- OSMOLAX Poudre pour Solution Orale B/20 ADWYA Orale 6.775 DT [C]
- OSMOLAX pédiatrique 4GR Poudre pour Solution Orale B/20 ADWYA Orale 6.775 DT ICI

DIHYDROGENOPHOSPHATE DE SODIUM

• FLEET PHOSPHO-SODA Solution Buvable B/2FL/45 ML E.C.DE WITT & COMPANY LIMITED Orale 12.880 DT [E]

2.6.4. - Laxatifs à usage rectal

Les lavements sont réservés à des indications bien précises : fécalome, préparation du côlon à un examen endoscopique ou radiographique, avant un accouchement ou une intervention chirurgicale, constipation des malades immobilisés. Ils peuvent être irritants pour la muqueuse rectale. Chez l'enfant, l'usage d'un lavement à base de phosphate peut provoquer une hypocalcémie si celui-ci n'est pas évacué directement.

DOCUSATE SODIQUE

• LAXAGEL 120 MG Gel Rectal B/6 TUBES/10 GR PHARMAGHREB Rectale 4.385 DT [C]

GLYCERINE

- GLYSS NOURRISSONS Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA Rectale 1.470 DT ICI
- GLYSS ENFANTS Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA Rectale 1.400 DT [C]
- GLYSS ADULTES Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA Rectale 1.875 DT [C]

GOMME DE STERCULIA

- NORMACOL LAVEMENT ENFANT Solution Rectale T/60 ML NORGINE PHARMA Rectale 2.188 DT [C]
- NORMACOL Solution Rectale FL/130 ML NORGINE PHARMA Rectale 2.734 DT [C]

2.7. - ANTIDIARRHEIQUES

Les antidiarrhéiques ont été regroupés en trois classes :

- les adsorbants et astringents
- les médicaments qui influencent la flore intestinale
- les freinateurs du transit intestinal.

Ces médicaments peuvent être utilisés pour le traitement symptomatique de la diarrhée grave ou de longue durée. Dans la colite ulcéreuse, les antidiarrhéiques ne doivent être utilisés qu'avec prudence en raison du risque de mégacôlon toxique.

Les diarrhées d'origine infectieuse sont fréquentes. Dans la plupart des cas, il s'agit de gastro-entérites virales dont l'évolution chez les personnes immunocompétentes est spontanément favorable. L'objectif du traitement est de prévenir et traiter la déshydratation ; un traitement antiinfectieux est rarement nécessaire.

Des sachets de poudre pour préparation d'une solution de réhydratation orale sont disponibles en pharmacie. Ils contiennent un mélange d'hydrates de carbone, de sodium, de potassium, et d'hydrogénocarbonate ou de citrate, qui doit être ajouté à une quantité déterminée d'eau. Cette solution est conçue pour traiter la déshydratation. En cas de déshydratation modérée (perte de 5% du poids en eau), 75 ML/kg peuvent être administrés par petites quantités régulières sur une période de 4 à 6 heures. Après correction de la déshydratation, l'alimentation normale peut être reprise; tant que la diarrhée persiste, 10 ML/kg peuvent être administrés par épisode de défécation liquide. Pour la prévention de la déshydratation chez les nourrissons de moins d'un an, 10 ML/kg de solution de réhydratation orale peuvent être administrés par épisode de défécation liquide. Chez les enfants de plus d'un an, il est inutile d'utiliser cette solution en l'absence de déshydratation. Cet avis est basé sur les recommandations pour le traitement de la gastroentérite aiguë de l'Organisation Mondiale de la Santé.

2.7.1. - Adsorbants et astringents

Les principaux adsorbants sont le trisilicate de magnésium, l'hydroxyde d'aluminium, le charbon médicinal, le kaolin et la pectine. Le trisilicate de magnésium et l'hydroxyde d'aluminium sont décrits au chapitre *Antacides*.

Le charbon médicinal sec peut adsorber les gaz. On l'utilise aussi dans certaines intoxications médicamenteuses.

Les pectines (constituées principalement d'acide polygalacturonique), souvent associées au kaolin, un silicate d'aluminium naturel, sont utilisées en cas de diarrhée, mais leur efficacité n'est pas bien établie.

Le tannin, sous forme de tannate d'albumine ou de diacétyltannin, a des propriétés astringentes mais peut être toxique pour le foie.

CHARBON

- CARBACTIVE 120 MG G\u00e9lule B/30 COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Orale 5.827 DT \u00ddrug
- CARBOPHOS 400 MG Comprimé à crôquer B/2T X 20 TRADIPHAR Orale 6.413 DT [E]
- EUCARBON Comprimé B/30 F.TRENKA CH-PHARM Orale 6.710 DT [E]

CHARBON+SIMETHICONE

- CARBOSYLANE Gélule B/48 (24 doses) GRIMBERG Orale 5.024 DT [E]
- CARBOSYLANE Gélule B/96 (48 doses) GRIMBERG Orale 7.979 DT [E]
- CARBOSYLANE enf 70MG/22.5MG Gélule B/48 (24 doses) GRIMBERG Orale 5.635 DT [E]

2.7.2. - Probiotiques

L'efficacité de ces préparations est discutable. Pour les préparations à base de Saccharomyces boulardii, il existe des preuves quant à leur intérêt dans des infections par Clostridium difficile et dans la diarrhée induite par les antibiotiques, mais quelques cas d'infection systémique à Saccharomyces boulardii ont été décrits chez des patients immunodéprimés.

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS

• LACTEOL Poudre Pour Suspension Orale B/10 SACH AXCAN PHARMA Orale 5.060 DT [I]

SACCHAROMYCES BOULARDII

- ULTRA-LEVURE 56.500 MG Gélule FL/20 BIOCODEX Orale 2.425 DT [I]
- ULTRA-LEVURE 200 MG Gélule FL/10 BIOCODEX Orale 5.415 DT [1]
- ULTRA-LEVURE 100 MG Poudre Pour Solution Orale FL/20 BIOCODEX Orale 5.415 DT [1]

2.7.3. - Freinateurs du transit intestinal

Le *lopéramide*, dérivé des opiacés, augmente le tonus de l'intestin grêle et du côlon, et diminue le péristaltisme intestinal. Il peut être dangereux en cas de diarrhée d'origine bacillaire, surtout chez les jeunes enfants qui sont, en outre, plus sensibles à l'effet déprimant central. C'est pour cette raison que la forme pédiatrique de lopéramide n'est plus commercialisée. En cas de surdosage, il y a lieu de recourir à la naloxone, antagoniste des opiacés.

Le lopéramide est contre-indiqué dans la colite grave.

LOPERAMIDE

- DIARETYL 2 MG Gélule B/20 IBN AL BAYTAR TC Orale 3.465 DT [1]
- DIARETYL 2 MG Gélule B/10 IBN AL BAYTAR TC Orale 2.100 DT [1]
- IMODIUM 2 MG Gélule B/20 PHARMAGHREB TC Orale 4.675 DT [1]

2.7.4. - Antisecretoires intestinaux

Le racécadotril est un antidiarrhéique et un antisécrétoire intestinal indiqué dans le traitement symptomatique des diarrhées aiguës de l'enfant et du nourrisson, en complément à la réhydratation orale.

RACECADOTRIL

- TIORFAN NOURRISSON 10MG Poudre Pour Solution Orale B/16sachets BIOPROJET PHARMA TA Orale 15.015 DT [I]
- TIORFAN ENFANT 30 MG Poudre Pour Solution Orale B/30sachets BIOPROJET PHARMA TA Orale 15.015 DT [I]
- TIORFAN 100 MG Gélule B/20 BIOPROJET PHARMA TA Orale 15.345 DT [I]

2.8. - MEDICAMENTS DES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN

Outre les corticostéroïdes utilisés e.a. par voie rectale dans la colite ulcéreuse (voir *Hormones cortico-surrénales et hormone corticotrope*) et l'azathioprine, deux antiinflammatoires sont utilisés dans des affections inflammatoires de l'intestin: la sulfasalazine et la mésalazine.

La sulfasalazine est un composé azoïque de l'acide aminosalicylique et de la sulfapyridine. Elle est employée depuis de nombreuses années dans la colite ulcéreuse où un traitement d'entretien permet de réduire l'incidence des récidives. Dans la maladie de Crohn, elle est plus efficace dans les localisations coliques que dans les formes limitées à l'intestin grêle. Les effets indésirables bénins sont des éruptions cutanées et des nausées. Des cas de toxicité hématologique (thrombopénie, agranulocytose) et de toxicité hépatique ont été rapportés. Un contrôle régulier de la formule sanguine est indiqué, spécialement lors de traitements prolongés. Chez l'homme, des cas réversibles de réduction de la fertilité ont été décrits.

La mésalazine, ou acide aminosalicylique, est le métabolite actif de la sulfasalazine. Elle est utilisée dans le traitement de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, et pour la prévention de récidives. Le risque d'effets indésirables est moindre qu'avec la sulfasalazine. Une néphrite interstitielle chronique irréversible peut survenir lors de traitements prolongés.

L'infliximab et l'adalimumab sont des anticorps monoclonaux sélectifs dirigés contre le facteur alpha de necrose tumorale ou TNF – alpha (cytokine impliquée dans la survenue de réactions proinflammatoire). Ils sont utilisés dans la maladie de Crohn après échec des corticoïdes et de l'azathioprine.

MESALAZINE

- CINKASA 500 MG Suppositoire B/15 OPALIA PHARMA Rectale 11.620 DT [E]
- FIVASA 400 MG Comprimé Gastrorésistant B/100 NORGINE PHARMA Orale 68.658 DT [E]
- FIVASA 500 MG Suppositoire B/30 NORGINE PHARMA Rectale 39.309 DT [E]
- FIVASA 800 MG Comprimé Gastrorésistant B/90 NORGINE PHARMA Orale 127.294 DT [E]
- MESATEC 500 MG Comprimé Gastrorésistant B/60 ADWYA Orale 36.590 DT [E]
- MESATEC 500 MG Comprimé Gastrorésistant B/120 ADWYA Orale 65.850 DT [E]
- PENTASA 1 GR Granules B/2X60 Sachets FERRING S.A.S Orale 180.716 DT [E]
- PENTASA 1 GR Suspension Rectale B/5/100 ML FERRING S.A.S Rectale 37.412 DT IEI
- PENTASA 1 GR Suppositoire B/3/5 FERRING S.A.S Rectale 54.089 DT [E]
- PENTASA 500 MG Comprimé B/100 FERRING S.A.S Orale 83.687 DT [E]

SULFASALAZINE

 SALAZOPYRINE 500 MG Comprimé Gastro-résistant FL/100 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale 9.757 DT [E]

INFLIXIMAB

• REMICADE 100 MG Poudre P.Prep.Injectable B/1 FL JANSSEN-BIOLOGICS B.V TA Parentérale H [E]

ADALIMUMAB

 HUMIRA 40 MG Solution Injectable B/2 Ser/0.8ML ABBOTT LABORATORIES Ltd RU TA Parentérale H [E]

2.9. - ANTISEPTIQUES INTESTINAUX

Beaucoup de gastro-entérites sont dues à des virus dont certains, comme les rotavirus, sont parfois responsables d'épidémies, surtout chez les jeunes enfants. Il n'y a pas d'antiviraux adaptés et seules des mesures diététiques, associées parfois à un traitement symptomatique, peuvent être justifiées.

Dans certaines contrées, les entérobactéries peuvent parfois causer des épidémies, surtout pendant la période estivale. Un traitement antibactérien ne se justifie qu'en fonction du résultat d'un examen bactériologique des selles et n'est le plus souvent nécessaire qu'en présence de symptômes généraux, en cas de dysenterie. L'administration d'antibiotiques dans certaines entérites aiguës, par salmonella par exemple, peut accroître le nombre de porteurs chroniques de ces germes et permettre ainsi une plus grande dissémination des infections.

Dans certaines études, une diminution de la durée de la diarrhée des voyageurs a été constatée lorsqu'elle était traitée par certains antibactériens notamment la doxycycline ou une fluoroquinolone. Des antibactériens se justifient dans la diarrhée du voyageur en présence d'un tableau clinique de dysenterie (diarrhée hémorragique) ou de symptômes généraux. Un traitement anti-infectieux sera aussi instauré dès les premiers symptômes d'une diarrhée des voyageurs chez des patients ayant une pathologie sous-jacente (affection intestinale inflammatoire chronique, troubles cardiaques et rénaux) ou lors d'un séjour bref comportant des activités importantes.

Pour le traitement des diarrhées parasitaires, le plus souvent dues à des amibes ou à des giardia, un dérivé de l'imidazole est le traitement de choix de la phase aiguë.

Les antibactériens et les antiparasitaires aussi utilisés dans d'autres pathologies infectieuses sont repris dans le chapitre. *Médicaments antiinfectieux*.

RIFAXIMINA

- NORMIX 200 MG Comprimé Enrobé B/12 ALFA WASSERMANN S.P.A TA Orale 13.365 DT [I]
- NORMIX 2 % Suspension Buvable FL/60 ML ALFA WASSERMANN S.P.A TA Orale 7.675 DT [I]

SULFAGUANIDINE

SULFAGUANIDINE 500 MG Comprimé B/20 SIPHAT TA Orale 0.990 DT [I]

NIFUROXAZIDE

• DIARRYL 4% Suspension Buvable FL/90 ML SIMED TC Orale 3.120 DT [I]

- ERCEFURYL 200 MG Gélule B/28 ADWYA TC Orale 4.380 DT [I]
- ERCEFURYL 4% Suspension Buvable FL/90 ML ADWYA TC Orale 4.115 DT [I]
- NIFROXID 200 MG Gélule B/20 GALPHARMA TC Orale 2.450 DT [I]
- NIFROXID 4% Suspension Buvable FL/90 ML GALPHARMA TC Orale 3.200 DT [1]

TILBROQUINOL+TILIQUINOL

• INTETRIX Gélule B/20 TERIAK TA Orale 3.695 DT [1]

2.10. - MEDICAMENTS CONTRE LES HEMORROÏDES

La thérapeutique médicamenteuse n'occupe qu'une place limitée dans le traitement des hémorroïdes. Il ne faut donc pas perdre de vue l'intérêt de mesures telles la prévention de la constipation, la sclérose ou la ligature élastique des hémorroïdes, la coagulation infrarouge voire l'intervention chirurgicale.

Un certain nombre de médicaments utilisés par voie générale ont été mentionnés et commentés dans le chapitre *Substances veinotropes et capillarotropes*. Les préparations à usage local sont reprises ci-dessous. Leur intérêt thérapeutique n'est pas établi.

Ces préparations ne sont pas exemptes d'effets indésirables. Des réactions d'hypersensibilité sont possibles et, si elles contiennent des corticostéroïdes, elles peuvent provoquer une atrophie muco-cutanée en cas d'utilisation prolongée. C'est pourquoi les spécialités ont été réparties en deux classes selon qu'elles contiennent ou non des corticostéroïdes.

CARRAGHENATES+ZINC SULFATE

• TITANOREINE 0.300 GR Suppositoire B/12 MC NEIL Rectale 3.715 DT [I]

LIPINUS ALBUS+VATERIA INDICA+MENTHA POIVREE

- NEO-HEALAR Suppositoire B/10 APM Rectale 6.220 DT [I]
- NEO-HEALAR Pommade Rectale T/30 GR APM Locale 5.810 DT [I]

TRIMEBUTINE+RUSCOGENINES

- RUSCOLOG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TC Rectale 3.125 DT [I]
- RUSCOLOG Crème Rectale T/20 GR OPALIA PHARMA TC Rectale 3.970 DT [1]

CARRAGHAHEEN+LIDOCAINE

• TITANOREINE LIDOCAINE Crème Rectale T/20 GR MC NEIL Rectale 3.365 DT [I]

3. - SYSTEME URO-GENITAL

Ce chapitre reprend:

- les médicaments de l'instabilité vésicale et des spasmes vésicaux
- les médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate
- les médicaments utilisés dans l'impuissance

Les médicaments utilisés dans les infections urinaires sont repris dans le chapitre Médicaments antibactériens; ceux utilisés dans les affections néoplasiques du système urinaire sont repris au chapitre Médicaments du système hormonal et au chapitre Antitumoraux. Certains médicaments repris dans le chapitre Spasmolytiques sont aussi parfois utilisés dans des affections urinaires.

3.1. - MEDICAMENTS AGISSANT SUR LA VESSIE

Ces médicaments ont entre autres des propriétés anticholinergiques et sont utilisés en cas d'instabilité vésicale (oxybutynine).

OXYBUTYNINE

• DITROPAN 5 MG Comprimé Sécable B/60 SANOFI-AVENTIS FRANCE TC Orale 11.065 DT [1]

TOLTERODINE

- DETRUSITOL RETARD 2MG Gélule LP B/14 PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION TC Orale 20.170 DT [I]
- DETRUSITOL RETARD 4MG Gélule LP B/14 PFIZER INTERNATIONAL CORPORATION TC Orale 23.090 DT [I]

3.2. - MEDICAMENTS DE L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE

Dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, on utilise parfois des α_1 -bloquants, le finastéride, le dutastéride (inhibiteurs de la 5- α -réductase) ou des préparations à base de plantes. Le traitement médicamenteux est surtout proposé aux patients qui ne peuvent ou ne veulent pas être opérés, ainsi qu'aux patients présentant de nombreuses plaintes subjectives sans indication chirurgicale.

3.2.1. - Alpha1-bloquants

Les α₁-bloquants sont utilisés depuis longtemps dans l'hypertension. Ils agissent aussi sur la symptomatologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate grâce à leur effet relaxant sur les cellules musculaires lisses. L'alfuzosine et la tamsulosine ne sont enregistrées que pour la présente indication. La térazosine est aussi enregistrée pour le traitement de l'hypertension.

Les α_1 -bloquants n'influencent pas le volume prostatique. Parmi les effets indésirables observés, l'hypotension orthostatique pose parfois problème, surtout chez les personnes âgées et en association à d'autres antihypertenseurs.

ALFUZOSINE

 ALFUZOSIN-CIMEX 10 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 ACINO PHARMA TA Orale 35.650 DT [I]

- ALFUZOSIN-CIMEX 10 MG Comprimé à Libération Prolongée B/90 ACINO PHARMA TA Orale 97.225 DT ^[I]
- XATRAL LP 10 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 50.185 DT [I]
- XATRAL 2.5 MG Comprimé B/30 SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Orale 13.110 DT [I]

DOXAZOSINE

- CARDOX 1 MG Comprimé FL/30 IBN ALBAYTAR TA Orale 7.510 DT [I]
- CARDOX 4 MG Comprimé FL/30 IBN ALBAYTAR TA Orale 26.250 DT [I]
- CARDULAR PP URO 4 MG Comprimé Sécable B/28 PFIZER GMBH TA Orale 39.637 DT [I]
- CARDULAR URO 2 MG Comprimé Sécable B/20 PFIZER GMBH TA Orale 16.035 DT [I]

TAMSULOSINE

- MECIR LP 0.4 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 33.705 DT [I]
- PROSTAM L.P. 0.4 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 ADWYA TA Orale 28.500 DT [I]

3.2.2. - Inhibiteur de la 5-alfa-reductase

Le finastéride et *dutastéride* inhibent la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone au niveau de la prostate, ce qui entraîne une diminution du volume prostatique. La réduction du volume prostatique s'accompagne de l'amélioration des symptômes et de la réduction du risque de rétention aiguë d'urine et de la chirurgie en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate.

Les effets indésirables sont surtout des troubles sexuels. Le finastéride et le dutasteride sont tératogènes. Il est dès lors recommandé d'utiliser un condom en cas de rapports avec une femme enceinte ou désireuse d'une grossesse. Ces femmes doivent également éviter de manipuler des médicaments à base d'inhibiteurs de la 5-alfa-reductase.

FINASTERIDE

• CHIBRO-PROSCAR 5 MG Comprimé Pelliculé B/28 MSD CHIBRET TA Orale 45.080 DT [I]

DUTASTERIDE

• AVODART 0.5 MG Capsule Molle B/30 GlaxoSmithKline France TA Orale 55.991 DT [I]

3.2.3. - Médicaments à base de plantes

Ces médicaments contiennent entre autres des extraits de Serenoa repens. Il existe peu d'informations issues d'études valables quant à leur efficacité. Des troubles gastro-intestinaux peuvent survenir.

EXT DE PIYGEUM AFRICANUM

• TADENAN 50 MG Capsule Molle B/30 FOURNIER S.A Orale 23.880 DT [1]

SERENOA REPENS

• PERMIXON 160 MG Capsule Molle B/60 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 35.495 DT [I]

3.3. - MEDICAMENTS DE L'IMPUISSANCE

Le sildénafil est un traitement oral des troubles de l'érection. Dans des conditions naturelles, c'est-à-dire avec une stimulation sexuelle, il restaure la fonction érectile déficiente en accroissant le flux sanguin vers le pénis.

Le mécanisme physiologique responsable de l'érection du pénis implique la libération de monoxyde d'azote (NO) dans le corps caverneux lors de la stimulation sexuelle. L'oxyde d'azote active alors l'enzyme guanylate cyclase, ce qui entraîne une augmentation des concentrations de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) induisant un relâchement des muscles lisses du corps caverneux et favorisant l'afflux sanguin.

Avant de prescrire le sildénafil, les médecins doivent évaluer soigneusement le risque potentiel, chez les patients susceptibles de présenter certaines maladies sous-jacentes, d'être affectés par ces effets vasodilatateurs, en particulier lors de l'activité sexuelle. Les patients dont la sensibilité aux vasodilatateurs est accrue sont ceux qui présentent un obstacle à l'éjection au niveau du ventricule gauche (par exemple sténose de l'aorte, cardiomyopathie obstructive hypertrophique) ou encore le syndrome rare d'atrophie systémique multiple, lequel se manifeste par une insuffisance grave du contrôle autonome de la pression artérielle.

SILDENAFIL

- VIATEC 100MG Comprimé Pelliculé B/4 ADWYA TA Orale 19.900 DT [C]
- VIATEC 100MG Comprimé Pelliculé B/8 ADWYA TA Orale 34.900 DT [C]
- VIATEC 25MG Comprimé Pelliculé B/4 ADWYA TA Orale 11.900 DT [C]
- VIATEC 25MG Comprimé Pelliculé B/8 ADWYA TA Orale 21.900 DT [C]
- VIATEC 50MG Comprimé Pelliculé B/4 ADWYA TA Orale 14.900 DT [C]
- VIATEC 50MG Comprimé Pelliculé B/8 ADWYA TA Orale 27.400 DT [C]
- ZOLTAN 50MG Comprimé Pelliculé Sécable B/4 SAIPH TA Orale 14.020 DT [C]
- ZOLTAN 50MG Comprimé Pelliculé Sécable B/8 SAIPH TA Orale 25.820 DT [C]
- ZOLTAN 100MG Comprimé Pelliculé B/4 SAIPH TA Orale 18.770 DT [C]

YOHIMBINE CHLORHYDRATE

La yohimbine est utilisée sans argument depuis longtemps comme aphrodisiaque.

• YOHIMBINE 2 MG Comprimé B/50 AVENTIS FRANCE Orale 2.100 DT [I]

4. - SYSTEME RESPIRATOIRE

4.1. - MEDICAMENTS DE L'ASTHME ET DE LA BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)

Pour ces affections, on peut utiliser:

- les sympathicomimétiques
- les anticholinergiques
- la théophylline et ses dérivés
- les corticostéroïdes
- les inhibiteurs de la libération de médiateurs

Ces médicaments peuvent être divisés en deux catégories: ceux qui exercent une action relaxante directe sur les muscles lisses des voies respiratoires et ceux qui ont une action antiinflammatoire. Cette subdivision n'a toutefois pas un caractère absolu car toutes ces substances ont plusieurs sites d'action potentiels. Les amines sympathicomimétiques et les anticholinergiques ont surtout une action relaxante directe sur les muscles lisses des voies respiratoires. Ceci est probablement aussi un élément important du mécanisme d'action de la théophylline. Les corticostéroïdes agissent surtout par leur effet antiinflammatoire et le cromoglicate sodique par une inhibition de la libération de médiateurs.

Dans l'asthme, les β_2 -mimétiques à courte durée d'action sont administrés par inhalation en cas de nécessité; leur usage journalier selon un schéma fixe n'est plus conseillé. Les anticholinergiques peuvent exercer un certain effet bronchodilatateur additif et constituer une alternative en cas de contre-indication aux β_2 -mimétiques. Un traitement d'entretien faisant appel à des corticostéroïdes à inhaler est indiqué chez la plupart des patients. L'association d'un β_2 -mimétique à longue durée d'action (ou éventuellement de théophylline) peut s'avérer nécessaire. L'administration orale de corticostéroïdes peut s'imposer en cas d'asthme grave et persistant. Lors d'un accès aigu, les corticostéroïdes peuvent être administrés par voie parentérale.

En cas de *bronchopneumopathie chronique obstructive* (BPCO), le traitement fait appel en premier lieu aux β_2 -mimétiques à courte durée d'action et/ou aux anticholinergiques; dans les formes légères, ils ne sont utilisés qu'en cas de nécessité, tandis qu'ils sont utilisés suivant un schéma fixe en présence d'une dyspnée constante. Si le résultat s'avère insuffisant, un β_2 -mimétique à longue durée d'action peut être prescrit. Les effets des corticostéroïdes à inhaler sur la fonction pulmonaire sont plus faibles que dans l'asthme. Il est dès lors recommandé chez les patients atteints d'une BPCO stable, modérée à sévère, d'évaluer la réponse à une corticothérapie en essayant un corticostéroïde à inhaler pendant quelques mois. Ce n'est que si la réponse est positive que le traitement sera poursuivi. Le rôle de la théophylline dans la BPCO est controversé. En cas d'exacerbation, il convient d'instaurer un traitement par des β_2 -mimétiques ou des anticholinergiques, ou d'en augmenter les doses; des corticostéroïdes, par voie systémique, peuvent être indiqués. Des antibiotiques ne seront prescrits que lorsque l'on suppose que l'exacerbation est due à une infection bactérienne. L'arrêt du tabagisme est la seule mesure pour laquelle un effet sur le pronostic de la BPCO a été démontré.

De nombreux médicaments utilisés dans l'asthme et la BPCO sont administrés par inhalation. Différentes formes pharmaceutiques sont disponibles à cette fin :

- les aérosols doseurs, avec ou sans chambre d'expansion
- les poudres à inhaler
- les solutions pour nébuliseur (appareil générateur d'aérosol).

L'ajout d'une chambre d'expansion à un aérosol doseur augmente la répartition au niveau pulmonaire et diminue le dépôt au niveau de l'oropharynx. Une telle association, ainsi que la poudre à inhaler, ont l'avantage de séparer le moment de l'inhalation de celui de la pulvérisation. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, l'usage d'un aérosol avec une chambre d'expansion est préférable pour tout médicament. Pour l'administration de corticostéroïdes en inhalation, l'usage d'un aérosol doseur avec une chambre d'expansion est aussi indiqué pour les enfants plus âgés et les adultes; la poudre à inhaler offre une alternative. La poudre à inhaler n'est pas conseillée chez les enfants de moins de 5 ans. En cas d'exacerbation ou quand la chambre d'expansion ne peut pas être utilisée correctement, un nébuliseur peut s'avérer nécessaire.

La plupart des aérosols doseurs sont encore à base de chlorofluoroalcanes (CFC) qui vont être progressivement remplacés par d'autres gaz propulseurs.

4.1.1. - Sympathicomimétiques

L'utilisation des sympathicomimétiques en cas de bronchospasme repose surtout sur leur effet bronchodilatateur mais aussi l' effet protecteur contre divers stimuli grâce à une stimulation des récepteurs β_2 des muscles lisses des voies respiratoires. L'administration de corticostéroïdes doit être envisagée, certainement dans l'asthme et peut-être aussi dans la BPCO, chaque fois qu'un usage accru ou régulier (par ex. journalier) de β_2 -mimétiques à courte durée d'action n'apporte pas une amélioration clinique manifeste.

Les β_2 -mimétiques sont souvent utilisés en aérosol. Les effets indésirables de ces produits sont: nervosité, insomnie, céphalées, tremblements et, à fortes doses, une stimulation cardiaque et une hypokaliémie. L'efficacité et les effets indésirables des différents β_2 -mimétiques sont vraisemblablement comparables, pour autant que leur posologie soit adaptée.

Contrairement aux β_2 -mimétiques à courte durée d'action, les β_2 -mimétiques à action prolongée sont destinés à un traitement d'entretien. Dans le traitement de l'asthme, les β_2 -mimétiques à action prolongée doivent toujours être utilisés en association avec des corticostéroïdes à inhaler. Ils ne sont pas indiqués pour le traitement de la crise asthmatique.

La dose doit être adaptée individuellement en fonction du schéma thérapeutique global et de la forme pharmaceutique (poudre à inhaler, aérosol doseur avec ou sans chambre d'expansion, solution pour nébuliseur). La posologie pour l'enfant n'est pas mentionnée étant donné la nécessité d'une adaptation individuelle.

Bêta2-mimétiques à courte durée d'action

SALBUTAMOL

- AEROL 100 μG Aérosol FL/200 DOSES BERG LIFE SCIENCES TA Inhalation 4.380 DT [E]
- ALBUTOL 2 MG/5ML Sirop FL/150 ML SIMED TA Orale 3.240 DT [E]
- ALBUTOL 2 MG Comprimé B/30 SAIPH TA Orale 1.365 DT [E]

TERBUTALINE

- BRICANYL 0.500 MG Solution Injectable B/8/1ML ASTRA ZENECA TA Parentérale 4.950 DT [E]
- BRICANYL 5 MG/2ML Solution Pour Inhalation B/10/5/2ML ASTRA ZENECA TA Locale H I^{EJ}
- BRICANYL TURBUHALER 0.5 MG Poudre pour inhalation buccale FL/ 200 DOSES ASTRA ZENECA TA Locale 17.353 DT [E]
- BRICANYL LP 5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 4.788 DT [E]

- TALIN 0.03% 1.5 MG/5ML Sirop FL/300ML SIMED TA Orale 5.410 DT [E]
- TALIN LP 5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 SAIPH TA Orale 3.370 DT [E]

Bêta 2-mimétiques à longue durée d'action

SALMETEROL

SEREVENT Diskus 50 μG Poudre pour inhalation buccale FL/60 DOSES GlaxoSmithKline France TA Inhalation 33.293 DT ^[E]

FORMOTEROL

- ATIMOS 12 MCG Solution Pour Inhalation FL/100 doses CHIESI FARMACEUTICI S.p.A TA Inhalation 31.910 DT [E]
- FORADIL 12 MCG Gélule B/30 + Inhalateur NOVARTIS Pharma S.A.S TA Inhalation 23,609 DT [E]
- FORADIL 12 MCG Gélule B/60 + inhalateur NOVARTIS Pharma SCHWEIZ AG TA Inhalation 44.972 DT [E]
- RAFOREX 12 MCG Suspension Pour Inhalation FL/100 doses BERG LIFE SCIENCES Inhalation 21.055 DT [E]

4.1.2. - Anticholinergiques

Les anticholinergiques sont utilisés dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive. En cas d'asthme, ils peuvent exercer un certain effet additif; et constituent une alternative thérapeutique en cas de contre-indication aux β_2 -mimétiques.

La forme aérosol permet de réduire les effets indésirables gênants qui se manifestent lors de l'usage des anticholinergiques par voie générale (sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation et de la miction).

BROMURE D'IPRATROPIUM

- IPRATROPIUM AGUETTANT Ad 0.500 MG/2ML Solution Pour Inhalation B/10/2 ML AGUETTANT TA Locale 15.508 DT ^[E]
- IPRATROPIUM AGUETTANT Enf 0.250 MG/1ML Solution Pour Inhalation B/10/1 ML AGUETTANT TA Locale 11.144 DT [E]

BROMURE DE TIOTROPIUM

 SPIRIVA 18 μG Poudre Pour Inhalation Buccale B/30 Gélules + Inhalateur BOEHRINGER ING. INT GmbH TA Locale 90.285 DT [E]

4.1.4. - Théophylline et dérivés

La théophylline peut être utilisée dans le traitement d'entretien de l'asthme lorsque les corticostéroïdes en inhalation ne suffisent pas. Le rôle de la théophylline dans la BPCO est controversé. Les formes à libération prolongée ont la préférence.

Tant pour la voie intraveineuse que per os, la posologie doit être adaptée à chaque cas; la meilleure méthode est de commencer par la dose recommandée qui est adaptée en fonction de l'action obtenue et des effets indésirables éventuels. Chez les insuffisants cardiaques, hépatiques et rénaux, les doses doivent être réduites. L'administration d'antibiotiques du groupe des macrolides, de fluvoxamine et de cimétidine peut ralentir la biotransformation de la théophylline. L'élimination de la théophylline est

accélérée en cas de tabagisme et de traitement par le millepertuis. Chez l'enfant, la posologie doit être adaptée en fonction du poids et de l'âge.

Pour le traitement par voie orale de l'adulte et de l'enfant au-delà d'un an, on commencera par une dose de 16 mg/kg/jour, avec un maximum de 400 mg. Si cette posologie est bien tolérée, on augmentera la dose de 25% tous les trois jours en se basant sur la théophyllinémie (7,5 à 15 µg/ML). La dose journalière maximale est:

- pour l'enfant de 1 à 9 ans: de 24 MG/KG
- pour l'enfant de 9 à 12 ans: de 20 MG/KG
- pour l'adolescent de 12 à 16 ans: de 18 MG/KG
- pour l'adulte: de 13 MG/KG avec un maximum de 900 MG.

Si les taux plasmatiques ne peuvent pas être mesurés, la plus grande prudence s'impose lors de l'administration de doses élevées.

Pour les préparations à libération prolongée, l'administration se fait habituellement deux fois par jour; en cas d'élimination plus rapide de la théophylline, par exemple chez les enfants, il peut être nécessaire d'administrer la dose journalière en trois prises.

En cas d'administration par voie rectale, les concentrations plasmatiques obtenues sont très variables et une rectite peut survenir lors d'usage prolongé. L'injection intramusculaire est douloureuse et la résorption est inconstante.

La théophylline et ses dérivés peuvent engendrer des troubles gastro-intestinaux tels nausées et vomissements. Des effets indésirables plus graves sont une hypokaliémie, des troubles du rythme cardiaque, des convulsions et parfois un arrêt respiratoire et cardiaque. La prudence s'impose certainement chez les enfants et lors de l'injection intraveineuse. Les effets indésirables surviennent surtout lorsque les concentrations plasmatiques dépassent 20 µg/ML.

THEOPHYLLINE

- BRONCHOFYLINE LP 200 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 DAR ESSAYDALI Orale 1.655 DT [E]
- BRONCHOFYLINE LP 300 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 DAR ESSAYDALI Orale 2.250 DT [E]
- DILATRANE 10 MG Sirop FL/200 ML LABOMED Orale 4.173 DT [E]
- THEOPHYLLINE 350 MG Suppositoire B/10 SIPHAT Rectale 1.810 DT [E]

4.1.5. - Corticostéroïdes à inhaler

L'administration par inhalation de corticostéroïdes permet d'obtenir un effet favorable tout en donnant lieu à beaucoup moins d'effets indésirables que par l'administration orale et constitue la base du traitement à long terme de l'asthme. Les corticostéroïdes à inhaler peuvent aussi être utilisés dans la BPCO, mais leur effet dans cette indication est moins bien démontré. Les corticostéroïdes à inhaler ne conviennent pas au traitement de la crise aiguë. En cas d'asthme grave persistant et de crise aiguë, l'administration de corticostéroïdes par voie générale peut s'avérer nécessaire.

Même avec les corticostéroïdes à inhaler, une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal ne peut être exclue, surtout lors d'un usage prolongé de doses élevées ou de préparations puissantes chez les enfants; l'arrêt de la croissance est un problème. Les corticostéroïdes à inhaler peuvent favoriser les infections à candida de la bouche et du pharynx, souvent asymptomatiques, et provoquer de l'enrouement.

La posologie doit être établie individuellement en fonction de la gravité de l'asthme et du schéma thérapeutique global; la dose varie également selon la forme pharmaceutique et le mode d'administration (poudre à inhaler, aérosol doseur avec ou sans chambre d'expansion, solution pour nébuliseur).

La posologie de départ est généralement faible; celle-ci peut être augmentée si nécessaire. Les doses suivantes sont celles pour adulte:

- béclométasone dipropionate: 200 μG à 1 MG p.j. en 2 prises
- budésonide: 200 à 800 μG p.j. en 2 prises
- fluticasone propionate: 100 à 500 μG p.j. en 2 prises.

Ces doses suffisent généralement en début de traitement. Si l'état ne s'améliore pas, le schéma thérapeutique doit être réévalué. Les doses pédiatriques ne sont pas mentionnées étant donné la nécessité d'une adaptation individuelle.

BECLOMETASONE

- BECLOJET 250 μG Solution Pour Inhalation FL/200 DOSES CHIESI S.A TA inhalation 21.801 DT [E]
- BECLO-ASMA 250 µG Solution Pour Inhalation FL/200 ALDO-UNION TA inhalation 10.230 DT [E]
- CLENIL 50 µG Aérosol FL/200 DOSES CHIESI FARMACEUTICI S.P.A TA Locale 2.836 DT [E]
- CLENIL 250 μG Aérosol FL/200 DOSES CHIESI FARMACEUTICI S.P.A TA Locale 21.074 DT [E]
- CORTIS 50 μ G Aérosol FL/200 DOSES BERG LIFE SCIENCES TA Locale 2.888 DT $^{[E]}$
- CORTIS 250 μG Aérosol FL/200 DOSES BERG LIFE SCIENCES TA Locale 16.060 DT $^{[E]}$
- MIFLASONE 200 μG Gélule B/60 gélules+inhalateur NOVARTIS PHARMA S.A.S TA inhalation 11.346 DT [E]
- MIFLASONE 400 μG Gélule B/60 gélules+inhalateur NOVARTIS PHARMA S.A.S TA inhalation 20.994 DT [E]

BUDESONIDE

- PULMICORT 0.5 MG/2ML Solution Pour Inhalation B/20 DOSES/2ML ASTRA ZENECA TA Locale H [E]
- MIFLONIDE 200 μG Pdre/Inhalation Buccale B/60 Géllules+Inhalateur NOVARTIS SUISSE TA Locale 15.508 DT [E]
- MIFLONIDE 400 μG Pdre/Inhalation Buccale B/60 Géllules+Inhalateur NOVARTIS SUISSE TA Locale 25.745 DT [E]

FLUTICASONE

- FLIXOTIDE 50 μG Aérosol FL/120 DOSES GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA inhalation 14,615 DT [E]
- FLIXOTIDE DISKUS 250 250 μG Poudre Pour Inhalation Buccale FL/60 DOSES GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA inhalation 27.828 DT [E]

4.1.6. - Sympathicomimétique + corticostéroïde

Associer un sympathicomimétique à longue durée d'action et un corticostéroïde à inhaler est indiqué dans le traitement continu de l'asthme et dans le traitement symptomatique de la BPCO sévère. Les effets indésirables et les précautions d'usage des associations sont ceux des substances utilisées séparément. Ces associations ne sont pas indiquées pour le traitement de la crise aigue d'asthme.

SALMETEROL+FLUTICASONE

 CYVAX 250µg/25µg Suspension Pour Inhalation Buccale FL/120 DOSES BERG LIFE SCIENCES TA Locale 36.255 DT [E]

- SERETIDE 100 ACCUHALER Poudre Pour Inhalation Buccale FL/60 DOSES GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Locale 40.912 DT [E]
- SERETIDE 500 ACCUHALER 500 μ G /50 μ G Poudre Pour Inhalation Buccale FL/60 DOSES GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Locale 72.573 DT $^{[E]}$
- SERETIDE 250 ACCUHALER Poudre Pour Inhalation Buccale FL/60 DOSES GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Locale 51.585 DT [E]

FORMOTEROL+BUDESONIDE

- SYMBICORT TURBUHALER 100/6 μG Poudre Pour Inhalation Buccale FL/120 DOSES ASTRA ZENECA TA Inhalation 59.387 DT ^[E]
- SYMBICORT TURBUHALER 200 μ G /6 μ G Poudre Pour Inhalation Buccale FL/120 DOSES ASTRA ZENECA TA Inhalation 76.354 DT $^{[E]}$
- SYMBICORT TURBUHALER 400 μG /12 μG Poudre Pour Inhalation Buccale FL/60 DOSES ASTRA ZENECA TA Inhalation 76.354 DT [E]

FORMOTEROL+BECLOMETASONE

FOSTER 100/6 μG Solution/inhalation fl:120 doses CHIESI TA Inhalation 48.462 DT [E]

4.1.7. - Inhibiteurs de la libération de médiateurs

Ces substances agissent vraisemblablement par un effet stabilisant au niveau de la membrane des mastocytes.

Le *kétotifène* est administré par voie orale; l'effet de ce médicament repose surtout sur l'action antagoniste au niveau du récepteur histaminique H₁. Sa place dans la thérapeutique antiasthmatique n'est pas claire. Il peut provoquer de la somnolence surtout au début du traitement.

KETOTIFENE

- KETIN 0.2% Solution Buvable FL/150 ML OPALIA TC Orale 4.520 DT [E]
- TEFANYL 1 MG Comprimé Enrobé B/60 SAIPH TC Orale 11.440 DT [E]
- TEFANYL 1 MG/5ML Sirop FL/150 ML SIMED TC Orale 4.630 DT [E]

4.1.8. - Autres antiasthmatiques

Le *Montelukast* est indiqué en traitement additif chez les patients présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta2 mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés "à la demande" n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme.

MONTELUKAST

- SINGULAIR JUNIOR 5 MG Comprimé à Croquer B/30 MSD B.V HOLLANDE TA Orale 73,655 DT [E]
- SINGULAIR 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 MSD B.V HOLLANDE TA Orale 73,655 DT [E]

Le cromoglycate de sodium est utilisé pour le traitement préventif de la crise d'asthme allergique et de l'asthme à l'effort.

4.2. - ANTITUSSIFS, MUCOREGULATEURS ET EXPECTORANTS

4.2.1. - Antitussifs

La toux nécessite rarement un traitement. Dans les affections pulmonaires obstructives, la toux est souvent due à l'obstruction des voies respiratoires, et des bronchodilatateurs sont alors indiqués.

Les antitussifs ont une action essentiellement symptomatique et ne sont pas dépourvus d'effets indésirables. Les antitussifs doivent être administrés quand ils sont le plus nécessaires, en règle générale le soir avant le coucher.

Une efficacité n'a été clairement démontrée que pour les antitussifs narcotiques, et uniquement chez l'adulte. Etant donné l'absence de preuves quant à une efficacité chez l'enfant, et la possibilité d'effets indésirables graves, il convient d'utiliser le moins possible d'antitussifs chez l'enfant. A ce sujet, les directives suivantes peuvent être émises.

- Au-dessous de 1 an, l'emploi d'antitussifs est contre-indiqué.
- Entre 1 et 2 ans, l'emploi d'antitussifs doit être exceptionnel et ne peut se faire qu'après avis médical. Les dérivés phénothiaziniques, le dextrométhorphane et la noscapine sont formellement contre-indiqués avant 2 ans.
- Entre 2 et 6 ans, l'emploi d'antitussifs doit rester très limité.

4.2.1.1. - Antitussifs narcotiques

La codéine est un antitussif efficace.

Les effets indésirables des antitussifs narcotiques sont la constipation et la sédation; lors d'un usage normal, le risque de toxicomanie et de dépression respiratoire est faible.

CODEINE CAMPHOSULFONATE

• NEO-CODION ADULTES Sirop FL/180 ML ADWYA Orale 3.225 DT [C]

CODEINE+CODETHYLINE+ESPECES PECTORALES

- CALMATUX ADULTE Sirop FL/200 ML SIPHAT Orale 3.995 DT [C]
- CALMATUX ENFANT Sirop FL/125 ML SIPHAT Orale 2.470 DT [C]
- CALMATUX Comprimé Pelliculé B/20 SIPHAT TA Orale 3.045 DT [C]
- PECTO 6 ADULTES Sirop FL/180 ML SIMED Orale 4.555 DT [C]

CODEINE+ERYSIMUM

- EUPHON 1.25 MG/5ML Sirop FL/150 ML MAYOLY SPINDLER Orale 2.704 DT [C]
- POLERY Adulte Sirop FL/200 ML PIERRE FABRE PRODUCTION Orale 4.360 DT [G]

CODEINE+ESPECES PECTORALES

- PECTO 6 ENFANTS Sirop FL/150 ML SIMED Orale 3.800 DT [C]
- PECTORAL ENFANT Sirop FL/200 ML SIPHAT Orale H [C]
- PECTORAL ADULTE 60 mg/100 ml Sirop FL/200 ML SIPHAT Orale 3.115 [C]

CODEINE+ ESPECES PECTORALES +GAIACOL

• EUCAMPHINE Sirop FL/150 ML SIPHAT Orale 2.290 DT [C]

CODEINE+GAIACOL

• PULMOSERUM Sirop FL/200 ML BAILLY-CREAT Orale 3.859 DT [C]

CODEINE+SODIUM BENZOATE+VITAMINE C

• NEO-CODION ENFANT Sirop FL/125 ML ADWYA Orale 2.625 DT [9]

ESSENCE DE TEREBENTHINE

- OZOTHINE ENFANT 30 MG Suppositoire B/10 ZAMBON FRANCE Rectale 3.305 DT [C]
- OZOTHINE ADULTE 60 MG Suppositoire B/10 ZAMBON FRANCE Rectale 3.461 DT [C]

4.2.1.2. - Antitussifs non narcotiques

Le dextrométhorphane est l'antitussif non narcotique le mieux connu. L'unanimité n'est pas faite quant à son efficacité. Les effets indésirables comprennent vertiges et troubles gastro-intestinaux. En cas de surdosage, on peut observer une excitation, une confusion et une dépression respiratoire.

Il existe peu de données pour les autres antitussifs non narcotiques.

DEXTROMETHORPHANE

- DRILL TOUX SECHE ADULTE 0.3% Sirop FL/150 ML SIMED Orale 4.685 DT [C]
- DRILL TOUX SECHE ENFANT 0.1% Sirop FL/150 ML SIMED Orale 5.185 DT [C]

DEXTROMETHORPHANE+GUAIFENESINE

- TUSSIPAX Sirop FL/125ML OPALIA PHARMA Orale 3.385 DT [C]
- TUSSIPAX ENFANT Sirop FL/125ML OPALIA PHARMA Orale 3.090 DT [C]

OXOMEMAZINE

• TOPLEXIL Sirop FL/150ML ADWYA Orale 2.300 DT [C]

OXELADINE

PAXELADINE Sirop 0.2% FL/125 ML TERIAK Orale 4.080 DT [C]

SODIUM BENZOATE+SODIUM BROMURE+THIOCOLOR

• PECTO 6 NOURRISSON Sirop FL/125 ML SIMED Orale 2.440 DT [C]

VITAMINE C+ESPECES PECTORALES+SODIUM BENZOATE

• CALMATUX NOURRISSONS Sirop FL/90 ML SIPHAT Orale 2.190 DT [C]

BUTAMIRATE

• DRICOD 0.150% Sirop FL/200 ML SIMED Orale 5.500 DT [C]

4.2.2. - Mucolytiques et expectorants

Les mucolytiques peuvent être utiles en instillation dans la trachée ou en inhalation dans des indications spécifiques, comme la mucoviscidose ou en cas de respiration artificielle. Par voie générale, par exemple en cas de toux et d'expectorations, l'intérêt des mucolytiques de même que celui des expectorants est souvent moins évident. Ils peuvent souvent être utilement remplacés par des mesures telles que l'humidification de l'air. De plus, des effets indésirables notamment gastro-intestinaux peuvent survenir avec ces produits.

Il existe quelques preuves que l'acétylcystéine réduise le risque d'exacerbations en cas de bronchite chronique.

4.2.2.1. - Dérivés de la cystéine

ACETYLCYSTEINE

- MUCOLATOR 200 MG Poudre Pour Suspension Orale B/30 S/3GR ADWYA Orale 4.740 DT [I]
- MUCOLYSE 200 MG Poudre Pour Solution Orale B/30 SACHETS GALPHARMA Orale 3.300 DT [I]

CARBOCISTEINE

- BRONCHOKOD 2% Sirop FL/125 ML SIMED Orale 1.780 DT [I]
- BRONCHOKOD 5% Sirop FL/125 ML SIMED Orale 3.590 DT [4]
- BRONCHOKOD 5% Sirop FL/300 ML SIMED Orale 5.165 DT [I]
- BRONCHOKOD SANS SUCRE 5% Solution Buvable FL/300 ML SIMED Orale 6.700 DT [I]
- BRONCHOTHIOL 2% Sirop FL/125 ML SIPHAT Orale 1.925 DT [I]
- BRONCHOTHIOL 5% Sirop FL/200 ML SIPHAT Orale 3.760 DT [I]
- CARBOGAM ADULTES SANS SUCRE 5% Solution Buvable FL/300 ML PHARMAGHREB Orale 5.290 DT [I]
- CARBOSTINE ENFANT NOURRIS 2% Sirop FL/125 ML PHARMADERM Orale 2.275 DT [I]
- CARBOSTINE ADULTES 5% Sirop FL/200 ML PHARMADERM Orale 3.670 DT [4]
- CARBOSTINE SANS SUCRE ADULTE 5% Solution Buvable FL/200 ML PHARMADERM Orale 4.460 DT [1]
- DRILL EXPECTORANT Sans Sucre Adulte 5% Sirop FL/200 ML PIERRE FABRE PRODUCTION Orale 4.500 DT [I]
- MUCOLARE 5% Sirop Fl/150 ML GALPHARMA Orale 2.535 DT [I]
- MUCOLARE 5% Sirop Fl/300 ML GALPHARMA Orale 4.390 DT [I]
- MUCOLARE 2% Sirop Fl/125 ML GALPHARMA Orale 1.690 DT [1]
- MUCOSOL 2% 100 MG/5ML Sirop FL/200 GR OPALIA PHARMA Orale 2.790 DT [1]
- MUCOSOL ADULTES 5% Sirop FL/200 GR OPALIA PHARMA Orale 4.520 DT [I]
- RHINATHIOL 5% MG Sirop FL/300ML SANOFI -AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 5.780 DT [I]
- RHINATHIOL 2% Sirop FL/125ML SANOFI -AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 2.200 DT [I]

4.2.2.2. - Bromhexine

BROMHEXINE

- BROMHEXINE 4 MG Comprimé Pelliculé B/40 SIPHAT TC Orale 2.325 DT [I]
- BROMISOL 0.2% Solution Buvable FL/60 ML OPALIA PHARMA TC Orale 1.990 DT [I]
- MUCOLYTE 4 MG/5 ML Sirop FL/100 ML JULPHAR TC Orale 2.315 DT [I]

4.2.2.3. - Mucolytiques et expectorants divers

AMBROXOL

- AMBROGAM 0.6% Solution Buvable FL/150ML PHARMAGHREB Orale 4.845 DT [I]
- AMBROGAM 0.3% Solution Buvable Fl/150 ML PHARMAGHREB Orale 2.910 DT [I]
- MUXOL 30 MG Comprimé B/30 LEURQUIN MEDIOLANUM Orale 3.355 DT [1]
- MUXOL 0.3% Solution Buvable FL/180ML TERIAK Orale 4.000 DT [1]
- MUXOL FORT 0.6% Solution Buvable FL/180ML TERIAK Orale 5.250DT [I]

4.2.3. - Associations

Ce chapitre reprend une série de préparations composées présentées pour la plupart comme antitussives et/ou expectorantes. Certaines de ces préparations sont aussi proposées pour d'autres indications, le bronchospasme par exemple, mais leur composition est telle qu'elles ne sont pas justifiables dans ces indications. Ces associations contiennent généralement un antitussif et un mucolytique ou un expectorant. Certaines renferment en plus d'autres composants comme des antipyrétiques, des antihistaminiques H₁, des anticholinergiques, des bronchodilatateurs, des vasoconstricteurs.

L'efficacité de beaucoup de ces spécialités n'est pas établie. Certaines sont impossibles à justifier et, même les plus acceptables, n'ont vraisemblablement pas d'avantage sur les préparations ne contenant qu'un seul principe actif (codéine p.ex.). Lors du choix d'une de ces spécialités comme médicament antitussif et expectorant, il est important de rechercher celles qui ne contiennent qu'un petit nombre de principes actifs dont on connaît les propriétés.

Il ne faut pas perdre de vue que certaines de ces spécialités ne sont pas dénuées d'effets indésirables résultant de la présence de substances telles des anticholinergiques, des antihistaminiques, des sympathicomimétiques. De telles associations ne peuvent pas être considérées comme inoffensives.

ESSENCE DE TEREBENTHINE

- OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE ADULTES 60 MG Suppositoire B/10 ZAMBON FRANCE Rectale 4.280 DT [E]
- OZOTHINE A LA DIPROPHYLLINE ENFANTS 30 MG Suppositoire B/10 ZAMBON FRANCE Rectale 2.737 DT [E]

CAMPHRE+EUCALYPTOL+GAIACOL

- EUCAMPHINE ENFANT Suppositoire B/10 SIPHAT Rectale 0.825 DT [C]
- EUCAMPHINE ADULTE Suppositoire B/10 SIPHAT Rectale 1.110 DT [C]

TENOATE DE SODIUM

- TOUFILEX ADULTES Suppositoire B/8 PHARMAGHREB Rectale 2.300 DT [C]
- TOUFILEX ENFANTS Suppositoire B/8 PHARMAGHREB Rectale 1.570 DT [C]

CAMPHRE+EUCALYPTOL+MENTHOL PUR

BAUME CALMOL ADULTES Baume T/60 GR PHARMADERM Locale 4.190 DT [C]

ESSENCE DE TEREBENTHINE+EUCALYPTOL+GAIACOL

• EUCAMPHINE BEBE ET ENFANT Pommade Dermique T/25 GR SIPHAT Locale 1.500 DT [C]

EUCALYPTOL+MENTHOL PUR+SALICYLATE DE METHYLE

- CHEFIX Liniment FL/5ML PHARMADERM Locale 2.145 DT [C]
- CALYPTINE NOURRISSONS Baume T/40 GR PHARMADERM Locale 2.245 DT [C]

EUCALYPTOL+MENTHOL PUR+THYMOL

• EUCAMPHINE ADULTE Pommade Dermique T/25 GR SIPHAT Locale 1.501 DT [C]

LEVOMENTHOL+CAMPHRE+THYMOL

GOLDIX Pommade Dermique Pot/50 GR OPALIA PHARMA Locale 4.005 DT [C]

4.3. - MEDICAMENTS DES RHINITES ET SINUSITES

Figurent successivement dans ce chapitre:

- les préparations administrées par voie générale
- les préparations à usage nasal
- les préparations à inhaler.

4.3.1. - Par voie générale

PSEUDOEPHEDRINE+TRIPROLIDINE

• ACTIFED RHUME Comprimé B/20 TERIAK Orale 2.625 DT [C]

PARACETAMOL+CHLORPHENIRAMINE+PHENYLEPHRINE+CAFEINE

• COLDEX Comprimé B/20 APM Orale 1.924 DT [E]

PARACETAMOL+PSEUDOEPHEDRINE

- DOLI RHUME Comprimé B/16 WINTHROP PHAEMA TUNISIE Orale 1.900 DT [E]
- RHUMAGRIP Comprimé Sécable B/20 IBN AL BAYTAR Orale 1.750 DT 🖭

PARACETAMOL+PSEUDOEPHEDRINE+CHLORPHENIRAMINE

- RHINOSTOP Sirop FL/100ML SIMED Orale 2.310 DT [E]
- RHINOSTOP Comprimé B/20 SAIPH Orale 1.855 DT [E]

PARACETAMOL+PSEUDOEPHEDRINE+TRIPROLIDINE

- TRIFED PLUS Comprimé Sécable B/20 IBN AL BAYTAR Orale 1.855 DT [E]
- ACTIFED RHUME ET FIEVRE Comprimé B/16 TERIAK Orale 2.485 DT [E]

PARACETAMOL+VITAMINE C+PHENIRAMINE

- FERVEX ENFANT Poudre Pour Solution Orale B/8 Sachets/3 GR BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 3.940 DT [E]
- FERVEX ADULTE Poudre Pour Solution Orale B/8 Sachets BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 3.940 DT [E]
- FERVEX ADULTE SANS SUCRE Poudre Pour Solution Orale B/8 Sachets/5 GR BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 4.560 DT [E]
- GRIPEX ENFANTS Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS GALPHARMA Orale 3.570 DT [E]
- GRIPEX ADULTES Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS GALPHARMA Orale 3.570 DT [E]
- GRIPEX SANS SUCRE ADULTES Poudre Pour Solution Orale B/12 Sachets GALPHARMA Orale 4.345 DT [E]
- RHINOFEBRAL Gélule B/20 Mc Neil Orale 3.465 DT [E]
- RHUMEX ADULTE Granules Pour Suspension Buvable B/8 Sachets TERIAK Orale 2.755 DT [E]
- RHUMEX ENFANT Granules Pour Suspension Buvable B/8 Sachets TERIAK Orale 2.700 DT [E]
- RHUMEX ADULTE Sans Sucre Granules Pour Suspension Buvable B/8 Sachets TERIAK Orale 3.740 DT [E]

PARACETAMOL +PSEUDOEPHEDRINE+VITAMINE C

- ACTIFED VITAMINE C Comprimé Pelliculé B/20 TERIAK Orale 2.625 DT [E]
- DOLIPREX PDRE/SOL/ORAL B/8 SACHETS SANOFI-AVENTIS Orale 3.800 DT [E]

4.3.2. - Préparations nasales

Sont successivement repris ici:

- les solutions salines
- les préparations utilisées dans la rhinite allergique
- diverses préparations.

4.3.2.1. - Solutions salines

Chez les jeunes enfants, la solution saline physiologique est à préférer à un vasoconstricteur.

CHLORURE DE SODIUM

- PHYSIOL 0.9% Solution Ophta-ORL B/15F/10ML UNIMED Locale 2.650 DT [C]
- PHYSIOL 0.9% Solution Ophta-ORL B/10F/5 ML UNIMED Locale 1.815 DT [C]

4.3.2.2. - Préparations contre la rhinite allergique

Ces médicaments qui contiennent un corticostéroïde, un anticholinergique, un antihistaminique H_1 ou un inhibiteur de la libération des médiateurs ne sont indiqués que dans la rhinite allergique et dans la rhinite vasomotrice éosinophilique. Le cromoglicate n'est utile qu'à titre prophylactique.

BECLOMETASONE

- BECONASE 50 μG/DOSE Suspension Nasale FL/200 DOSES GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Locale 9.140 DT [E]
- RINOCLENIL 100 μ G/DOSE Suspension Nasale FL/200 DOSES CHIESI FARMACEUTICI S.p.A TA Locale 11.902 DT $^{[E]}$

FLUTICASONE

• FLIXONASE 50 µG Spray Nasal FL/120 DOSES GLAXO WELLCOME ESPAGNE TA Locale 17.927 DT [E]

- AVAMYS 27.5 μG Pulv. Spray Nasal FL/120 DOSES GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED TA locale 16.955 DT [E]
- RINOSAL 50 μG Pulv. Spray Nasal FL/120 DOSES OPALIA PHARMA TA locale 14.340 DT [E]

MOMETASONE

NASONEX 50 μG/DOSE Suspension Nasale FL/120 DOSES SCHERING-PLOUGH TA Locale 18.694 DT [E]

PREDNISOLONE

• DETURGYLONE 0.25% Spray Nasal FL/10ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Locale 3.020 DT [E]

TIXOCORTOL

PIVALONE 1% Suspension Nasale FL/10 ML
 PFIZER S.A
 TC
 Locale
 3.520 DT IEI

TRIAMCINOLONE

NASACORT AQ 2% (55 μG/DOSE) Spray Nasal FL/120 doses/16,5g
 MAY AND BECKER TA Locale 18.760 DT [E]

AZELASTINE

 ALLERGODIL 127 μG/DOSE Spray Nasal FL/17ML avec pompe doseuse MEDA PHARMA TA Locale 14.690 DT [C]

BUDESONIDE

- CORTINASE 64μg/DOSE Suspension Nasale OPALIA PHARMA TA Locale 14.405 DT [E]
- RHINOCORT 64 µg/DOSE Suspension Nasale FL/120 DOSES ASTRA ZENECA TA Locale 18.689 DT [E]

4.3.2.3. - Divers

Il existe peu de données relatives à l'efficacité de ces médicaments. Certaines associations contiennent des substances allergisantes. Ces préparations, surtout celles qui contiennent des anesthésiques, des antibiotiques, des corticostéroïdes à action systémique ou des sulfamidés, sont à déconseiller.

THIOPHENECARBOXYLATE

• SOUFRANE 2% Spray Nasal FL/15 ML ADWYA Locale 1.920 DT [C]

LEVURE DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE + SOUFRE

- SOLACY PEDIATRIQUE Comprimé soluble b/60 Grimberg Orale 10.570 DT[C]
- SOLACY Adulte gélule b/45 Grimberg Orale 7.599 DT [C]
- ACTISOUFRE Sol puly nas ou buccale fl/100 ml Grimberg Locale 11.440 DT [C]

ACETYLCYSTEINE + BENZALKONIUM + TUAMINOHEPTANE

RHINOFLUIMUCIL Sol pulv nas ou buccale fl/10 ml ZAMBON TC Locale 3.210 DT [C]

4.3.3. - Préparations à inhaler

Il n'est pas établi que les inhalations faites avec les préparations décrites ici donnent de meilleurs résultats que celles réalisées avec de l'eau ou avec des solutions salines. Des spasmes laryngés ont été signalés lors de l'inhalation de certaines substances, surtout chez les enfants. Leur mode d'emploi doit être bien explicité.

ESSENCES NATURELLES

• PERUBORE Comprimé Pour Inhalation B/30/2GR MAYOLY SPINDLER Locale 3.707 DT [C]

5. - DOULEUR ET INFLAMMATION

5.1. - ANALGESIQUES - ANTIPYRETIQUES

Il s'agit du paracétamol, des salicylés et des dérivés de la pyrazolone. En principe, ce sont les préparations qui contiennent uniquement soit de l'acide acétyl salicylique, soit du paracétamol qui constituent le premier choix. Chez certains patients, l'ajout de codéine peut s'avérer nécessaire; la dose de codéine doit être suffisante (chez l'adulte, 30 mg en phosphate ou plus par prise).

Les médicaments qui ne contiennent que du paracétamol, un salicylé ou un dérivé de la pyrazolone associé ou non à un spasmolytique sont décrits en premier lieu. Viennent ensuite les associations contenant en outre de la caféine, de la codéine et/ou de la vitamine C.

Dans les douleurs neurogènes chroniques, d'autres médicaments sont aussi utilisés tels des antidépresseurs et des antiépileptiques.

5.1.1. - Paracétamol

Le paracétamol exerce des effets analgésiques et antipyrétiques. Il est dépourvu d'activité antiinflammatoire et n'irrite guère le tractus gastro-intestinal. Dans les douleurs arthrosiques, il permet souvent d'éviter l'usage des antiinflammatoires non stéroïdiens.

Le paracétamol peut dans une certaine mesure potentialiser l'effet des anticoagulants coumariniques.

En cas de surdosage, le paracétamol peut provoquer des lésions hépatocellulaires importantes qui se manifestent par un ictère ou même une nécrose parfois fatale. Ces phénomènes n'apparaissent souvent que 24 à 48 heures après l'ingestion massive. S'il apparaît, sur la base de la mesure des taux plasmatiques de paracétamol, que le danger d'hépatotoxicité est réel, il y a lieu d'administrer aussi rapidement que possible de la N-acétylcystéine par voie intraveineuse à titre préventif. On admet en général que, chez l'adulte, des problèmes sont prévisibles lors d'une prise supérieure à 10 g. Une toxicité peut cependant déjà être observée avec des doses moindres, chez les adultes, parfois déjà à partir de 4 g, notamment chez les alcooliques, en cas d'atteinte hépatique et après un jeûne prolongé ; chez les enfants, à partir de 150 mg/kg.

5.1.1.1. - Paracétamol

Posologie usuelle.

- adulte: 300 à 500 MG, éventuellement jusqu'à 4 à 6 x p.j.
- enfant: 10 à 15 MG/KG jusqu'à 4 x p.j.(max. 60 MG/KG/jour)

PARACETAMOL

- ADOL 500 MG Comprimé B/15 SAIPH Orale 0.840 DT [E]
- ADOLINE 500 MG Comprimé B/10 ALLIANCE PHARMA Orale 0.750 DT [E]
- ADOLINE 500 MG Comprimé B/20 ALLIANCE PHARMA Orale 1.000 DT [E]
- ALGESIC 500 MG Comprimé Sécable B/20 DAR ESSAYDALI Orale 1.295 DT [E]
- ANALGAN 500 MG Comprimé B/20 SIPHAT Orale 1.200 DT [E]
- APYREX PEDIATRIQUE 3% Solution Buvable FL/90 ML TERIAK Orale 1.430 DT [E]
- CETAMOL 3% Solution Buvable FL/90 ML GALPHARMA Orale 1.205 DT [E]
- CETAMOL 500MG Gélule B/16 GALPHARMA Orale 1.035 DT [E]
- DOLEL 3% Sirop FL/90ML SIMED Orale 1.105 DT [E]

- DOLIPRANE 500 MG Comprimé B/16 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1.380 DT [E]
- DOLIPRANE 1000 MG Comprimé Sécable B/8 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 2.205 DT [E]
- DOLIPRANE 1000 MG Comprimé Effervescent B/8 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 2.100 DT [E]
- DOLIPRANE 500 MG Comprimé Effervescent B/2Tb/8 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1.850 DT [E]
- DOLIPRANE 500 MG Gélule B/16 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1.250 DT [E]
- DOLIPRANE 500 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 2.540 DT [E]
- DOLIPRANE 100 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1.280 DT [E]
- DOLIPRANE 150 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1.500 DT [E]
- DOLIPRANE 200 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 1 700 DT [E]
- DOLIPRANE 300 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 2.100 DT [E]
- EFFERALGAN 500 MG Comprimé B/16 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 1.105 DT EI
- EFFERALGAN 600 MG Suppositoire B/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Rectale 1.970 DT [E]
- EFFERALGAN PEDIATRIQUE 3% Solution Buvable FL/90 ML BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 1.335 DT [E]
- EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150 MG Suppositoire B/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Rectale 1.335 DT [E]
- EFFERALGAN GRAND ENFANT 300 MG Suppositoire B/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Rectale 1.620 DT [E]
- EFFERALGAN NOURRISSONS 80 MG Suppositoire B/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Rectale 1.160 DT [E]
- EFFERALGAN 500 MG Comprimé Effervescent B/2x8 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 2.045 DT IEI
- NOVADOL 100 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS ADWYA Orale 1.200 DT [E]
- NOVADOL 200 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS ADWYA Orale 1.500 DT [E]
- NOVADOL 300 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS ADWYA Orale 1.900 DT [E]
- NOVADOL 500 MG Poudre Pour Solution Orale B/12 SACHETS ADWYA Orale 2.100 DT [E]
- NOVADOL 500 MG Gélule B/16 ADWYA Orale 1.100 DT [E]
- PANADOL 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/8 TERIAK Orale 0.750 DT [E]
- PANADOL 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/16 TERIAK Orale 1.275 DT [E]
- PARADOL PEDIATRIQUE 3% Solution Buvable FL/90 ML PHARMADERM Orale 1.405 DT [E]
- PARACETAMOL IPS 500 MG Comprimé Effervescent B/2x8 IPS Orale 1.855 DT [E]
- PARACETAMOL IPS 500 MG Comprimé Sécable B/16 IPS Orale 1.000 DT [E]
- PARACETAMOL IPS PEDIATRIQUE 3% Solution Buvable FL/90 ML IPS Orale 1.095 DT [E]
- PARACETAMOL IPS NOURRISSONS 80 MG Suppositoire B/10 IPS Rectale 1.050 DT [E]
- PARACETAMOL IPS jeune enf. 150 MG Suppositoire B/10 IPS Rectale 1.210 DT IEI
- PARACETAMOL IPS grand enf. 300 MG Suppositoire B/10 IPS Rectale 1.470 DT IEI
- PARACETAMOL IPS adulte 600 MG Suppositoire B/10 IPS Rectale 1.785 DT [E]
- PARALGYL 1000 10MG/ML Solution Injectable B/6/100ML DORCAS Parentérale H 24.000 DT [E]
- PARALGYL 500 10MG/ML Solution Injectable B/6/50ML DORCAS Parentérale H 12.000 DT [E]
- PERFALGAN IV 10 MG/ML Solution Injectable B/12/100ML BRISTOL MYERS SQUIBB Parentérale H 63.718 DT [E]
- PERFALGAN ENFANTS/NOURRISSON IV 10 MG/ML Solution Injectable B/12/50ML BRISTOL MYERS SQUIBB Parentérale H [E]

5.1.1.2. - Propacétamol

Le propacétamol, un ester du paracétamol facilement soluble dans l'eau, est destiné à l'usage parentéral. In vivo, il est quasi immédiatement transformé en paracétamol. Des cas de dermatite de contact par manipulation du propacétamol ont été décrits.

5.1.2. - Salicylés

5.1.2.1. - Acide acétylsalicylique

L'acide acétylsalicylique exerce une action antalgique et antipyrétique. Au-delà de 3 g par jour, il possède, en outre, une action antiinflammatoire. L'agrégation plaquettaire est réduite pendant plusieurs jours après une dose unique d'acide acétylsalicylique; cette propriété justifie son utilisation dans la prévention cardio-vasculaire. L'élévation de la tendance au saignement peut poser problème, notamment en cas d'extraction dentaire et lors de la prise concomitante d'anticoagulants oraux.

L'acide acétylsalicylique administré par voie orale irrite la muqueuse gastrique. On observe fréquemment des pertes sanguines occultes dans les selles et parfois des hémorragies gastriques graves. Lors de l'utilisation de doses élevées d'acide acétylsalicylique, il existe outre l'effet irritant local, un risque de lésion gastro-intestinale due au produit circulant, comme c'est le cas avec les antiinflammatoires non stéroïdiens. L'acide acétylsalicylique est contre-indiqué dans l'ulcère gastrique évolutif.

La prise répétée d'acide acétylsalicylique pendant le troisième trimestre de la grossesse peut entraîner le prolongement de la grossesse et de l'accouchement, des hémorragies chez la mère, le foetus et le nouveau-né, et la fermeture précoce du canal artériel.

Chez certains patients, notamment chez ceux qui ont des antécédents d'allergie, l'acide acétylsalicylique peut provoquer des réactions d'hypersensibilité (par ex. un bronchospasme), avec une hypersensibilité croisée avec les antiinflammatoires non stéroïdiens. Il pourrait accroître le risque de syndrome de Reye chez les enfants atteints d'infections virales (grippe, varicelle); il est de ce fait de moins en moins utilisé dans cette tranche d'âge.

Des bourdonnements d'oreille et une augmentation de la fréquence et de l'amplitude respiratoires apparaissent aux doses élevées. En cas d'intoxication aiguë, des convulsions, une dépression respiratoire avec acidose métabolique, de la confusion et un coma peuvent survenir, le plus souvent à des doses supérieures à 10 g (moins chez l'enfant).

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE

- ASPIRINE 500 MG Comprimé B/20 SIPHAT Orale 1.090 DT [E]
- ASPIRINE PH 8 500 MG Comprimé Pelliculé B/20 SAIPH Orale 1.635 DT [E]

5.1.2.2. - Autres salicylés

L'acétylsalicylate de lysine est un sel hydrosoluble de l'acide acétylsalicylique; 1,8 g équivaut à 1 g d'acide acétylsalicylique.

ACETYLSALICYLATE DE LYSINE

- ACETYLSALICYLATE DE LYSINE LABESFAL 900 MG Poudre Pour Préparation Injectable B/6+6 Solvant/5ML LABESFAL ALMIRO S.A Parentérale 6.587 DT [E]
- ASPEGIC 100 MG Poudre Pour Solution Orale B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 1.550 DT [E]
- ASPEGIC 250 MG Poudre Pour Solution Orale B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 2.060 DT [E]
- ASPEGIC 500 MG Poudre Pour Solution Orale B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 2.450 DT [E]
- ASPEGIC 1000 MG Poudre Pour Solution Orale B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 4.145 DT [E]
- ASPEGIC 1 GR Poudre Pour Préparation Injectable B/6+S/5ML SANOFI-AVENTIS FRANCE Parentérale 6.143 DT [E]

 KARDEGIC 160 MG Poudre Pour Solution Orale B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 1.630 DT [E]

5.1.3 – Associations

En principe, il faut donner la préférence à des préparations qui ne contiennent qu'un seul principe actif sauf si en raison d'un effet analgésique insuffisant l'on souhaite y adjoindre de la codéine à dose suffisante (chez l'adulte, 30 mg en phosphate ou plus par prise); à cette dose, des effets indésirables tels la constipation et l'étourdissement sont toutefois possible. La dose de codéine dans la plupart des associations fixes (par exemple, 5 à 10 mg) est insuffisante.

L'association de codéine, ou d'autres psychotropes à l'acide acétylsalicylique ou au paracétamol en favoriserait l'usage chronique. Des néphropathies aux analgésiques ont été constatées lors de l'usage chronique de telles associations.

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE+CAFEINE

• CAFENOL Comprimé Sécable B/20 TERIAK Orale 1.050 DT [E]

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE+PHENOBARBITAL

- PHENASPIRINE 2 CG Suppositoire B/10 SIPHAT TC Rectale 1.000 DT [E]
- PHENASPIRINE 1 CG Suppositoire B/10 SIPHAT TC Rectale 0.975 DT [E]

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE+VITAMINE C

 ASPEGIC 500 VITAMINE C Poudre Pour Solution Orale B/10 Sachets Bipoches SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 3.530 DT [E]

CODEINE+PARACETAMOL

- ALGISEDAL Comprimé B/16 VIATRIS PHARMACEUTICALS TA Orale 3.000 DT [E]
- ANALGAN CODEINE 300 MG/25MG Comprimé B/16 SIPHAT Orale 2.160 DT [E]
- ANALGAN CODEINE 600 MG/50MG Comprimé B/12 SIPHAT TA Orale 2.945 DT [E]
- CO-ALGESIC 500MG/30MG Comprimé Sécable B/16 DAR ESSAYDALI TA Orale 2.940 DT [E]
- CODOLIPRANE Ad 400MG/20MG Comprimé Sécable B/16 WINTHROP PHARMA TUNISIE Orale 2.900 DT [E]
- EFFERALGAN CODEINE 500 MG Comprimé Effervescent B/2TUBES/8 BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale 2.790 DT [E]
- KLIPAL CODEINE 300 MG/25MG Comprimé B/16 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 2.500 DT [F]
- KLIPAL CODEINE 600 MG/50MG Comprimé B/12 PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Orale 3.500 DT [E]

PARACETAMOL+ACIDE ACETYLSALICYLIQUE+CODEINE

• VIGASPIR Comprimé B/20 SIPHAT Orale 1.150 DT [E]

PARACETAMOL+BELLADONA+OPIUM

• LAMALINE Suppositoire B/10 SIPHAT TC Rectale 3.963 DT [E]

PARACETAMOL+VITAMINE C

• DOLIPRANE VIT C 500 MG/150MG Comprimé Effervescent B/2x8 SANOFI AVENTIS Orale 1.950 DT [E]

- EFFERALGAN VIT C 330 MG Comprimé Effervescent B/2x10 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 1.520 DT [E]
- PARACETAMOL IPS vitaminé C Comprimé Effervescent B/2x10 IPS Orale 1.250 DT [E]

PARACETAMOL+CAFEINE

- ANALGAN EXTRA 500MG/65MG Comprimé Sécable B/16 SIPHAT Orale 1.500 DT [E]
- PANADOL EXTRA Comprimé Pelliculé Sécable B/16 TERIAK Orale 1.970 DT [E]
- PANADOL EXTRA Comprimé Pelliculé Sécable B/8 TERIAK Orale 1.040 DT [E]

PARACETAMOL+TRAMADOL

- SUPRADOL 37.5MG/325MG Gélule B/16 ADWYA TA Orale 5.800 DT [E]
- ZALDIAR 37.5MG/325MG Comprimé Pelliculé B/20 GRUNENTHAL TA Orale 11.680 DT [E]

5.2. - ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS

A côté de l'acide acétyl salicylique, il existe un grand nombre d'autres substances non stéroïdiennes douées de propriétés antiinflammatoires. Les antiinflammatoires non stéroïdiens sont utilisés principalement pour leurs propriétés antiinflammatoires mais certains sont aussi préconisés à doses moindres pour leur action analgésique.

Certains d'entre eux inhibent davantage la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) qui intervient dans la formation des prostaglandines impliquées dans l'inflammation, que la cyclo-oxygénase-1 (COX- 1) laquelle est impliquée entre autres dans la synthèse des prostaglandines qui jouent un rôle de protection de la muqueuse gastrique. Le célécoxib est un antiinflammatoire non stéroïdien avec une sélectivité biochimique COX-2 plus prononcée que les molécules disponibles jusqu'à présent. L'efficacité de ce médicament dans l'arthrite rhumatoïde et l'arthrose semble comparable à celle des autres antiinflammatoires non stéroïdiens.

Les antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent provoquer des malaises digestifs et des lésions des muqueuses gastro-intestinales allant jusqu'à l'ulcération, l'hémorragie et la perforation. Ces lésions peuvent survenir quelle que soit la voie d'administration de ces médicaments.

Avec les antiinflammatoires non stéroïdiens, un bronchospasme et des troubles neurologiques, hématologiques et dermatologiques peuvent survenir. Des cas d'hépatotoxicité ont été rapportés. Les antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë surtout en présence d'insuffisance cardiaque, de cirrhose hépatique avec ascite, de déplétion volémique par diurétique, de restriction sodée, de syndrome néphrotique, d'affections vasculaires. En outre, ils peuvent entraîner une hyperkaliémie surtout chez les patients traités par des suppléments potassiques, des diurétiques d'épargne potassique, des IECA ou des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Les antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent contrecarrer l'effet des diurétiques et de certains antihypertenseurs, et pourraient aggraver une insuffisance cardiaque.

Ils sont contre-indiqués en cas d'ulcère gastro-duodénal et en présence d'antécédents d'asthme ou d'urticaire secondaires à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'un antiinflammatoire non stéroïdien.

Beaucoup de ces antiinflammatoires non stéroïdiens déplacent les anticoagulants coumariniques de leurs sites de fixation aux protéines plasmatiques; la vigilance s'impose spécialement durant les premiers jours qui suivent l'instauration du traitement par l'antiinflammatoire non stéroïdien. Les antiinflammatoires non stéroïdiens peuvent augmenter la lithémie en diminuant l'excrétion rénale du lithium, et accroître la néphrotoxicité de la ciclosporine.

Les dérivés arylacétiques et indoliques sont plus fréquemment à l'origine de céphalées, vertiges et confusion mentale. Les dérivés arylpropioniques provoquent moins d'effets indésirables gastro-intestinaux. Les oxicams peuvent provoquer un syndrome de Lyell ou de Stevens-Johnson.

Chez les personnes âgées, les effets indésirables des antiinflammatoires non stéroïdiens sont plus fréquents et ont des conséquences souvent plus graves. Il est en général préférable de leur donner un antiinflammatoire non stéroïdien de courte demi-vie (par exemple, le diclofénac, le flurbiprofène, l'ibuprofène, l'indométacine, le kétoprofène, l'acide tiaprofénique). Les indications doivent être correctement établies. La posologie et la durée du traitement doivent dans toute la mesure du possible être limitées.

La prise répétée d'antiinflammatoires non stéroïdiens pendant le troisième trimestre de la grossesse peut entraîner le prolongement de la grossesse et de l'accouchement, des hémorragies chez la mère, le foetus et le nouveau-né, et la fermeture précoce du canal artériel.

L'administration parentérale doit également être limitée.

En raison de leurs effets indésirables, les antiinflammatoires non stéroïdiens ne doivent être utilisés que lorsqu'ils sont vraiment nécessaires: dans de nombreux cas, un médicament moins toxique (par ex. le paracétamol dans l'arthrose ou en cas de fièvre) est suffisant.

La gravité et l'incidence des effets indésirables des antiinflammatoires non stéroïdiens sont probablement proportionnelles à l'effet antiinflammatoire obtenu. Pour les antiinflammatoires non stéroïdiens qui inhibent tant la COX-1 que la COX-2, il y a probablement peu de différence d'une substance à l'autre en ce qui concerne les effets indésirables, mais la dose utilisée a de l'importance. Avec les molécules COX-2 sélectives, un risque moindre d'ulcères gastro-duodénaux compliqués a été observé dans des études randomisées par rapport aux molécules non sélectives. La question est de savoir si cette diminution du risque est suffisamment importante pour justifier la prescription d'un antiinflammatoire non stéroïdien COX-2 sélectif à la place d'un antiinflammatoire non stéroïdien non sélectif; cela dépend du risque individuel du patient. Les molécules COX-2 sélectives peuvent entraîner les mêmes effets indésirables rénaux que les molécules non sélectives. Les précautions d'usage et les contre-indications des antiinflammatoires en général sont dès lors aussi d'application pour les molécules COX-2 sélectives, certainement chez les patients à risque. Les antiinflammatoires COX-2 sélectifs n'ont pas d'effet inhibiteur sur l'agrégation plaquettaire, contrairement aux autres antiinflammatoires non stéroïdiens qui inhibent l'agrégation plaquettaire de manière réversible.

En raison d'un risque accru d'accidents cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux), toutes les spécialités à base de rofécoxib (Vioxx®) ont été retirées du marché en 2004. Certaines études ont également montré un risque accru d'accidents cardio-vasculaires dans certains groupes à risque avec les autres AINS COX-2 sélectifs (célécoxib). Certaines études suggèrent des problèmes cardio-vasculaires avec certains AINS COX-2 non sélectifs (p. ex. le naproxène), mais la signification de ces conclusions n'est pas claire.

La décision de prescrire un inhibiteur sélectif de la COX2 doit être basée sur l'évaluation de l'ensemble des risques spécifiques à chaque patient.

5.2.1. - Dérivés arylcarboxyliques

DICLOFENAC

DICLOFEN 25 MG Comprimé Gastroresistant B/30 DAR ESSAYDALI TC Orale 2.415 DT [E]

- DICLOFEN 50 MG Comprimé Gastroresistant B/30 DAR ESSAYDALI TC Orale 4.095 DT [E]
- DICLOFEN 100 MG Suppositoire B/10 DAR ESSAYDALI TC Rectale 3.311 DT [E]
- DICLOGESIC 12.5 MG Suppositoire B/10 DAR ALDAWA TC Rectale 2.407 DT [E]
- DICLOGESIC 75 MG Solution Injectable B/5/3 ML SAIPH TC Parentérale 3.000 DT [E]
- DICLOPAL 100 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TC Rectale 4.345 DT [E]
- DICLORIUM ASW 100 MG Comprimé à Liberation Prolongée B/20 ALFA WASSERMANN S.p.A TC Orale 1.370 DT [E]
- MEDISIUM 75 MG Solution Injectable B/5/3 ML MEDIS TC Parentérale 3.000 DT [E]
- VOLFENAC ADULTE 100 MG Suppositoire B/8 I.P.S TC Rectale 3.000 DT [E]
- VOLTARENE 25 MG Comprimé Gastroresistant B/30 TERIAK TC Orale 3.150 DT [E]
- VOLTARENE 50 MG Comprimé Gastroresistant B/30 TERIAK TC Orale 5.355 DT [E]
- VOLTARENE LP 75 MG Comprimé à Liberation Prolongée B/30 NOVARTIS PHARMA S.A TC Orale 11.071 DT [E]
- VOLTARENE 12.5 MG Suppositoire B/10 TERIAK TC Rectale 2.890 DT [E]
- VOLTARENE 25 MG Suppositoire B/10 TERIAK TC Rectale 3.000 DT [E]
- VOLTARENE 50 MG Suppositoire B/10 TERIAK TC Rectale 3.700 DT [E]
- VOLTARENE 100 MG Suppositoire B/10 TERIAK TC Rectale 5.000 DT [E]
- VOTREX 25 MG Comprimé Gastrorésistant B/30 IBN AL BAYTAR TC Orale 2.220 DT [E]
- VOTREX 50 MG Comprimé Gastrorésistant B/20 IBN AL BAYTAR TC Orale 3.000 DT [E]
- VOTREX LP 100 MG Comprimé à Liberation Prolongée B/10 IBN AL BAYTAR TC Orale 3.000 DT [E]
- XEDOL 100 MG Suppositoire B/10 PHARMAGHREB TC Rectale 3.125 DT [E]

DICLOFENAC +MISOPROSTOL

- ARTOTEC 50 MG/0.2MG Compr.gastro. B/30 PFIZER TA Orale 15.030 DT [E]
- ARTOTEC 75 MG/0.2MG Compr.gastro. B/20 PFIZER TA Orale 12.626 DT [E]

5.2.2. - Dérivés arylpropioniques

ACIDE TIAPROFENIQUE

- BI-TIAPRAM 200 MG Comprimé Sécable B/20 SIPHAT TC Orale 6.180 DT [E]
- FLANID 100 MG Comprimé Sécable B/30 PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE TC Orale 5.425 DT [E]
- FLANID 200 MG Comprimé Sécable B/15 PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE TC Orale 4.875 DT [E]
- INFLAGAM 200 MG Comprimé Sécable B/20 IBN AL BAYTAR TC Orale 5.850 DT [E]
- SURGAM 200 MG Comprimé Sécable B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 8.435 DT [E]
- SURGAM 100 MG Comprimé Sécable B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 6.425 DT [E]
- TIAGAM 100 MG Comprimé Sécable B/30 PHARMAGHREB TC Orale 5.695 DT [E]
- TIAGAM 200 MG Comprimé Sécable B/20 PHARMAGHREB TC Orale 6.830 DT [E]
- TIAPRAM 100 MG Comprimé Sécable B/30 SIPHAT TC Orale 4.600 DT [E]

IBUPROFEN

- BALKAPROFEN 400 MG Comprimé B/20 APM TC Orale 2.926 DT [E]
- BUPROFEN 200 MG Comprimé Effervescent T/2/10 IPS Orale 3.000 DT [E]
- DOLVEN 100 MG/5ML Suspension Buvable FL/120ML TERIAK Orale 3.080 DT [E]
- DOLVEN 200 MG Gélule B/20 TERIAK Orale 2.300 DT [E]
- GELUFENE 200 MG Gélule B/20 IBN AL BAYTAR Orale 2.535 DT [E]
- IBUPHIL Enfant-Nourrisson 100 MG/5ML Suspension Buvable FL/125 ML SIMED Orale 3.355 DT [E]
- IBUPHIL 400 MG Comprimé Pelliculé B/20 SIMED TC Orale 3.900 DT [E]
- IBUPHIL 600 MG Comprimé B/20 SIMED TC Orale 4.900 DT [E]
- MOMENT 200 MG/ML Gouttes Buvables FL/12.5 ML OPALIA PHARMA TC Orale 3.370 DT [E]

- MOMENT 100 Enf-Nourr.100MG/5ML Suspension Buvables FL/120 ML OPALIA PHARMA Orale 2.940 DT [E]
- UPFEN 200 MG Comprimé Effervescent T/2/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 3.310 DT [E]

KETOPROFENE

- AXEN 100 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TC Rectale 3.530 DT [E]
- BI-PROFENID LP 100 MG Comprimé Sécable LP B/20 SANOFI AVENTIS FRANCE TC Orale 8.665 DT [E]
- KETOFEN 50 MG Gélule Fl/24 DAR ESSAYDALI TC Orale 2.380 DT [E]
- KETOFEN 100 MG Gélule Fl/30 DAR ESSAYDALI TC Orale 7.620 DT [E]
- KETOFEN 100 MG Gélule Fl/15 DAR ESSAYDALI TC Orale 3.890 DT [E]
- KETOFEN LP 200 MG Gélule Fl/14 DAR ESSAYDALI TC Orale 9.315 DT [E]
- KETOFEN 100 MG Suppositoire B/10 DAR ESSAYDALI TC Orale 3.200 DT [E]
- KETOMED IM 100 MG Solution Injectable B/5/2ML UNIMED TC Parentérale 5.140 DT [E]
- KETOMED IM 100 MG Solution Injectable B/2/2ML UNIMED TC Parentérale 2.300 DT [E]
- KETOPROF 100 50 MG/ML Solution Injectable B/5/2 ML DORCAS TC Parentérale 5.020 DT [E]
- PROFENID 50 MG Gélule B/24 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 2.646 DT [E]
- PROFENID 100 MG Comprimé Pelliculé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 10.040 DT 🖾
- PROFENID 100 MG Comprimé Pelliculé B/15 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 5.250 DT [E]
- PROFENID LP 200 MG Gélule à Libération Prolongée B/14 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 11.395 DT [E]
- PROFENID IM 100 MG/2ML Solution Injectable B/5/2 ML WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Parentérale 6.715 DT ^[E]
- PROFENID IM 100 MG/2ML Solution Injectable B/2/2 ML WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Parentérale 2.755 DT [E]
- RHUTA 100 Suppositoire b/10 WEST PHARMA TC Rectale 3.320 DT [E]

NAPROXENE

- APRANAX 275 MG Comprimé Enrobé B/30 TERIAK TC Orale 6.510DT [E]
- APRANAX 275 MG Comprimé Pelliculé B/10 TERIAK TC Orale 2.500DT [E]
- APRANAX 550 MG Comprimé Enrobé Sécable B/16 TERIAK TC Orale 7.290 DT [E]
- APRANAX 550 MG Comprimé Enrobé Sécable B/8 TERIAK TC Orale 3.760 DT [E]
- NOXEN 500 MG Suppositoire B/12 SIMED TC Orale 6.715 DT [E]

5.2.3. - Dérivés indoliques

INDOMETACINE

- INDOCINE 100 MG Suppositoire B/10 SIPHAT TA Rectale 3.130 DT [E]
- INDOCINE 50 MG Suppositoire B/10 SIPHAT TA Rectale 1.645 DT [E]
- INDOMETACINE IPS 100 MG Suppositoire B/10 IPS TA Rectale 2.330 DT [E]
- INDOMETACINE IPS 50 MG Suppositoire B/10 IPS TA Rectale 1.280 DT [E]
- INDOPAL 50 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TA Rectale 1.430 DT [E]
- INDOPAL 100 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TA Rectale 2.750 DT [E]
- METHACIN 50 MG Suppositoire B/10 SIMED TA Rectale 1.505 DT [E]
- METHACIN 100 MG Suppositoire B/10 SIMED TA Rectale 2.745 DT [E]
- ROTHACIN 25 MG Gélule B/30 JULPHAR TA Orale 2.013 DT [E]
- TENDINYL 25 MG Gélule B/30 WEST PHARMA TA 2.020 DT
- TENDINYL 50 MG Suppositoire B/10 WEST PHARMA TA 1.360 DT
- TENDINYL 100 MG Suppositoire B/10 WEST PHARMA TA 2.370 DT

5.2.4. - Oxicams

MELOXICAM

- MOBIC 15 MG Solution Injectable B/3/1.5 ML BOEHRINGER ING. TC Parentérale 4.757 DT [E]
- MOBIC 7.500 MG Comprimé Sécable B/14 BOEHRINGER ING. TA Orale 9.577 DT IEI
- OXIMAL 15 MG Comprimé Sécable Fl/14 SAIPH TA Orale 11.920 DT [E]

PIROXICAM

- CYCLADOL 20 MG Comprimé Sécable B/14 CHIESI S.A TA Orale 10.915 DT [E]
- CYCLADOL 20 MG Comprimé Effervescent B/14 CHIESI S.A TA Orale 10.915 DT [E]
- CYCLADOL 20 MG Suppositoire B/10 IBN AL BAYTAR TA Rectale 7.000 DT [E]
- CYCLODEX 20 MG Comprimé Sécable B/14 TERIAK TA Orale 8.200 DT 🖭
- FELDENE 20 MG Suppositoire B/15 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Rectale 10.300 DT [E]
- FELDENE 20 MG Solution Injectable B/2/1ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Parentérale 3.014 DT ^[E]
- FELDENE 20 MG Solution Injectable B/6/1ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Parentérale 9.035 DT [E]
- FELDENE DISPERSIBLE 20 MG Comprimé Soluble B/15 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 9.892 DT [E]
- FELDENE DISPERSIBLE 20 MG Comprimé Sécable B/10 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 6.500 DT [E]
- FELDENE DISPERSIBLE 20 MG Comprimé Sécable B/20 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 10.550 DT [E]
- INFLACED 20 MG Gélule B/15 IBN AL BAYTAR TA Orale 5.850 DT IEI
- PAINOXAM 20 MG Suppositoire B/15 OPALIA PHARMA TA Rectale 9.725 DT [E]
- PIRALDENE IM 20 MG/ML Solution Injectable B/2/1 ML DORCAS TA Parentérale 2.320 DT [E]
- PIROXEN 20 MG Solution Injectable B/2/1 ML MEDIS TA Parentérale 2.601 DT [E]
- PIROXEN DISPERSIBLE 20 MG Comprimé Soluble B/12 MEDIS TA Orale 5.920 DT [E]
- ROXAM 20 MG Suppositoire B/15 SIMED TA Rectale 9.145 DT [E]
- ROXAM 20 MG Solution Injectable B/2/1 ML SAIPH TA Parentérale 2.730 DT [E]
- ROXAM 20 MG Gélule B/15 SAIPH TA Orale 6.380 DT [E]
- ROXAM 20 MG Poudre pour Solution Orale B/8 Sachets SAIPH TA Orale 4.900 DT [E]

5.2.5. - Fénamates

Ils sont utilisés pour le traitement symptomatique au long cours de la polyarthrite rhumatoïdes, des rhumatismes inflammatoires chronique et dans certaines arthroses douloureuse et invalidantes (formes à 250 et 700 mg).

Ils peuvent être utilisés dans le traitement symptomatique de courte durée des poussées aigues des rhumatismes articulaires et d'arthroses ainsi que dans le traitement symptomatique des douleurs inflammatoires en ORL et en stomatologie.

ACIDE MEFENAMIQUE

- DYSMAN 500 Suppositoire B/08 SIMED TC Rectale 3.185 DT [E]
- DYSMAN 50 MG/5 ML Suspension Buvable FL/150 ML SIMED TC Orale 3.750 DT [E]
- FENAMYL 250 MG Gélule B/16 ALLIANCE PHARMA TC Orale 1.700 DT [E]
- FENDOL 500 MG Comp.pel.sec B/20 IBN ALBAYTAR TC Orale 3.600 DT [E]
- INFLAMYL 50 MG/5 ML Suspension Buvable FL/150 ML GALPHARMA TC Orale 3.400 DT IEI
- INFLAMYL 250 MG Gélule B/20 GALPHARMA TC Orale 2.310 DT [E]
- INFLAMYL FORT 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/20 GALPHARMA TC Orale 3.600 DT [E]

- MEFENAL 250 MG Gélule B/20 TERIAK TC Orale 2.200 DT [E]
- MEFENAL 1% Suspension Buvable Fl/150ML TERIAK TC Orale 3.400 DT [E]

ACIDE NIFLUMIQUE

- INFLOCINE enf 400 MG Suppositoire B/8 IPS TC Rectale 1.945 DT [E]
- INFLOCINE ad 700 MG Suppositoire B/8 IPS TC Rectale 2.760 DT [E]
- NIFLUMIC 700 MG Suppositoire B/8 SIPHAT TC Rectale 2.898 DT [E]
- NIFLUMIC 400 MG Suppositoire B/8 SIPHAT TC Rectale 2.042 DT [E]
- NIFLURIL 700 MG Suppositoire B/8 BMS-U P S A-TUN-SAID TC Rectale 3.195 DT [E]
- NIFLURIL ENFANT 400 MG Suppositoire B/8 BMS-U P S A-TUN-SAID TC Rectale 2.250 DT [E]
- NIFLURIL 250 MG Gélule B/30 BRISTOL MYERS SQUIBB TC Orale 1.951 DT [E]

5.2.6. – Pyrazolés

L'action de la benzydamine sur les phénomènes locaux de l'inflammation se manifeste par : une réduction de la perméabilité vasculaire, une diminution de l'oedème et des réactions exsudatives et une sédation de la douleur inflammatoire.

La benzydamine antagonise peu la biosynthèse des prostaglandines. Elle est inhibitrice de l'action vasoactive des médiateurs de l'inflammation (histamine et sérotonine); elle réduit la libération par les cellules inflammatoires des radicaux libres et des enzymes lytiques; de plus, ses propriétés antiagrégantes plaquettaires et érythrocytaires contribuent à l'amélioration des conditions hémodynamiques locales du foyer inflammatoire.

BENZYDAMINE

- VERAX ADULTES 100 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TC Rectale 2.420 DT [E]
- VERAX ENFANT 25 MG Suppositoire B/10 OPALIA PHARMA TC Rectale 1.785 DT [E]

5.2.7. - AINS COX-2 sélectifs

CELECOXIB

- CELOXX 200 MG Gélule B/10 SAIPH TA Orale 10.585 DT [I]
- CELEBREX 200 MG Gélule B/10 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 13.240 DT [4]
- CELEBREX 200 MG Gélule B/20 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 21.500 DT [4]
- INIBREX 200 MG Gélule B/10 DAR ESSAYDALI TA Orale 8.520 DT [I]
- INIBREX 200 MG Gélule B/20 DAR ESSAYDALI TA Orale 15.600 DT [1]

5.3. - TRAITEMENT DES MALADIES OSSEUSES

5.3.1. - Calcitonine

La calcitonine est une hormone polypeptidique sécrétée principalement par la thyroïde. Elle inhibe la résorption osseuse et contribue à la régulation de la calcémie. La calcitonine utilisée en thérapeutique est synthétique et correspond soit à la calcitonine de saumon (salcatonine), soit à la calcitonine humaine. Elles sont administrées par voie parentérale.

La calcitonine est utilisée dans les cas de maladie de Paget, mais aussi dans les hypercalcémie d'origine maligne ainsi que comme traitement de l'algodystrophie.La calcitonine de saumon est aussi utilisée dans l'ostéoporose postménopausique.

Au début du traitement par la calcitonine peuvent apparaître de la congestion faciale, des paresthésies, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la pollakiurie. Les réactions locales et générales d'hypersensibilité sont rares. L'hypocalcémie avec manifestations tétaniques est exceptionnelle.

CALCITONINE

• TONOCALCIN 100 UI Solution Injectable B/5/1ML ALFA WASSERMANN S.p.A TC Parentérale 21.513 DT [E]

5.3.2. - Diphosphonates

Les diphosphonates sont de puissants inhibiteurs de la résorption osseuse ostéoclastique. Les indications dans la maladie de Paget sont les mêmes que celles de la calcitonine. Les diphosphonates sont également indiqués, surtout par voie parentérale, pour le traitement symptomatique de l'hypercalcémie grave dans certaines affections hématologiques et dans les processus tumoraux (avec ou sans métastases osseuses). Ils sont aussi utilisés dans le traitement de l'ostéoporose postménopausique symptomatique. L'alendronate est également indiqué dans le traitement de l'ostéoporose masculine.

Pami les biphosphonates, l'alendronate et le risedonate sont utilisés dans l'ostéoporose alors que le pamidonate le clodronate et l'acide zoledronique sont utilisés dans la maladie de paet ainsi que dans les hypercalcémies et les métastases osseuses.

Les effets indésirables sont e.a. de la fièvre en cas d'administration i.v., et de la diarrhée lors de l'administration orale. En cas d'usage prolongé de doses élevées d'étidronate, une aggravation des douleurs osseuses et des fractures peuvent survenir. Des ulcères oesophagiens ont été rapportés après prise d'alendronate.

La biodisponibilité de tous les diphosphonates est faible par voie orale; ils doivent être pris à jeun avec un grand verre d'eau et ne pas s'allonger pendant une heure. La biodisponibilité est fortement réduite par la prise d'aliments; ils ne peuvent dès lors être pris qu'avec de l'eau.

ALENDRONATE

• FOSALEN 70 MG Comprimé Enrobé B/4 TERIAK TA Orale 46.915 DT [E]

ALENDRONATE+COLECALCIFEROL

• FOSAVANCE 75 MG/5600 UI Comprimé B/4 MSD LIMITED ENGLAND TA Orale 66.147 DT [E]

CLODRONATE

- BONEFOS 800 MG Comprimé Pelliculé B/100 BAYER SCHERING PHARMA OY TA Orale 531.460 DT [E]
- CLEDOS 400 MG Gélule B/50 WEST PHARMA TA Orale 143.500 DT [E]

RISEDRONATE

- ACTONEL 35 MG Comprimé Pelliculé B/4 WARNER CHILCOTT GmbH TA Orale 63.659 DT [E]
- ACTONEL 5 MG Comprimé Pelliculé B/28 WARNER CHILCOTT GmbH TA Orale 68.835 DT [E]
- ACTONEL 30 MG Comprimé Pelliculé B/28 WARNER CHILCOTT GmbH TA Orale 363.262 DT [E]
- AKTONATE 35 MG Comprimé Pelliculé B/4 PHARMAGHREB TA Orale 39.500 DT [E]
- OSTENEL 35 MG Comprimé Pelliculé B/12 DAR ESSAYDALI TA Orale 118.500 DT [E]
- OSTENEL 35 MG Comprimé Pelliculé B/4 DAR ESSAYDALI TA Orale 44.520 DT [E]

RISEDRONATE+CALCIUM+VIT D3

 ACTONEL PLUS CALCIUM D 35 MG+1000MG/880UI Comprimé/Granulé B/4 étuis WARNER CHILCOTT DEUTCHLAND Gmbh TA Orale 66.695 DT ^[E]

RALOXIFENE

• EVISTA 60 MG COMP.PELL B/28 ELI LILLY TA Orale 64.701 DT^[E]

STRONTIUM

• PROTELOS 2G Pdre pour susp.or.sach. B/28 SERVIER TA Orale 80.438 DT[E]

5.4. - SUBSTANCES DIVERSES

5.4.1. – Traitement de fond des rhumatismes inflammatoires

Dans les traitements de l'arthrite rhumatoïde, outre les antiinflammatoires non stéroïdiens, des glucocorticoïdes, des immunosuppresseurs, le méthotrexate et la sulfasalazine, on utilise des antipaludéens, des sels d'or et la D- pénicillamine.

5.4.1.1. - Antipaludéens

La chloroquine, et dans une moindre mesure, l'hydroxychloroquine peuvent provoquer, en usage prolongé, des atteintes oculaires avec dépôts cornéens réversibles et une choriorétinite pouvant entraîner une cécité irréversible; un contrôle ophtalmique régulier s'impose. La chloroquine est reprise avec les antimalariques.

HYDROXYCHLOROQUINE

• PLAQUENIL 200 MG Comprimé Enrobé B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE Orale 4.000 DT [E]

5.4.1.2. – D Pénicillamine

La D (-) pénicillamine est un agent chélateur. Les effets indésirables sont des réactions cutanées, une altération du goût, de la protéinurie, de la thrombopénie, de l'agranulocytose et de l'anémie aplastique; un contrôle régulier de la formule sanguine s'impose.

5.4.1.3. – Sulfalazine

Utilisée comme traitement de la polyathrite rhumatoide à 2g/jour cette dose sera atteinte progréssivement au bout de 4 semaines par paliers hebdomadaires de 500mg.

Les effets indésiables sont surtout hépatiques, dermatologiques et rarement syndrome d'hypersensibilité.

5.4.1.4. – Méthotrexate

Le méthotrexate à la dose de 7,5mg à 20mg/ semaine est indiqué comme traitement de fond de la polyarthrite rhumatoide, du rhumatisme psoriasique. Les effets indésirables sont surtout hépatiques, cutanés, hématologiques et pulmonaires.

METHOTREXATE

- EBETREXAT 2.5 MG Comprimé FL/50 EBEWE Pharma TA Orale [V]
- METHOTREXAT 2.5 MG Comprimé Fl/20 SANOFI AVENTIS FRANCE TA Orale H [V]
- METHOTREXAT-EBEWE 500 MG Solution Injectable FL/5 ML EBEWE TA Parentérale H [V]
- METHOTREXAT EBEWE 50 MG Solution Injectable B/5/5 ML EBEWE Pharma TA Parentérale H [V]
- METHOTREXAT MYLAN 100 MG/ML Solution Injectable B/10 FL/50 ML (perfusion) MYLAN S.A.S TA Parentérale H ^[V]
- METHOTREXAT MYLAN 50 MG/2ML Solution Injectable B/10 FL/2 ML MYLAN S.A. TA Parentérale H [V]
- METHOTREXAT MYLAN 25 MG/ML Solution Injectable B/10 FL/20 ML (perfusion) MYLAN S.A.S TA Parentérale H IVI
- METHOTREXAT MERCK 5 MG/2ML Solution Injectable B/10 FL/2 ML MERCK GENERIQUES TA Parentérale ^[V]

5.4.1.5. – Léflunomide

c'est un Immunodépresseur inhibant la dihydro-orotate déshydrogénase et donc la synthèse des pyrimidines, avec une action antiproliferative sur les lymphocytes T activés impliqués dans la pathogénie de la polyarthrites rhumatoïde.

LEFLUNOMIDE

- ARAVA 100 MG Comprimé Pelliculé B/3 SANOFI-AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND Gmbh TA Orale 91.982 DT [E]
- ARAVA 10 MG Comprimé Pelliculé FL/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND Gmbh TA Orale 103.202 DT [E]
- ARAVA 20 MG Comprimé Pelliculé FL/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND Gmbh TA Orale 146.293 DT ^[E]

5.4.1.6. - Inhibiteurs du TNF

Les inhibiteurs du TNF sont indiqués en deuxième intention dans le traitement de la polyathite rhumatoide, de l'arthrite juvénile idiopathique et du humatisme psoriasique actif et évolutif de l'adulte en cas de éponse inadéquate aux traitements de fond, y compris le méthotrexate.

INFLIXIMAB

• REMICADE 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon CENTOCOR B.V TA Parentérale H [E]

ETANERCEPT

- ENBREL 25 MG Solution Injectable B/4 ser.pré-rempliesWYETH EUROPA Ltd TA Parentérale H [E]
- ENBREL 50 MG Solution Injectable B/4 ser.pré-remplies WYETH EUROPA Ltd TA Parentérale H [E]

ADALIMUMAB

HUMIRA 40 MG Solution Injectable B/2 ser.pré-rempliesABBOTT Ltd UK TA Parentérale H [E]

5.4.1.7. - Myorelaxants

THIOCOLCHICOSIDE

- COLTRAMYL 4 MG Comprimé Sécable B/12 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.910 DT [I]
- MIOREL 4MG Gélule B/12 TERIAK TA Orale 4.100 DT [I]

- MYOLAX 4 MG Comprimé B/12 ADWYA TA Orale 4.250 DT [I]
- RELAXIL 4 MG Gélule B/14 OPALIA PHARMA TA Orale 4.870 DT [I]
- RELAXIL 4 MG/2 ML Solution Injectable B/6/2ML OPALIA PHARMA TA Parentérale 4.725 DT [I]
- RELAXIL 4 MG/2 ML Solution Injectable B/5/2ML OPALIA PHARMA TA Parentérale 3.900 DT [I]
- THIOMED 4 MG Solution Injectable B/6/2 ML UNIMED TA Parentérale 3.430 DT [I]

TETRAZEPAM

- MYOLASTAN 50 MG Comprimé Sécable B/20 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 7.540 DT [I]
- MYOZEPAM 50 MG COMP PELL SECABLE B/20 DAR ESSAYDALI TA Orale 5.060 DT [I]

MEPHENESINE

• DECONTRACTYL 500 MG Comprimé Pelliculé B/24 TERIAK Locale 4.850 DT [I]

5.4.1.8. - Traitement symptomatique de l'arthrose

CHONDROITINE SULFATE

• STRUCTUM 500 MG Gélule B/60 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 24.775 DT [9]

INSAPONIFIABLE D'HUILE D'AVOCAT ET DE SOJA

• PIASCLEDINE 300 MG Gélule B/15 EXPANSCIENCE Orale 13.555 DT [C]

HYALURONATE DE SODIUM

- HYALGAN 20 MG/2ML Solution Injectable FL/2 ML FIDIA Farmaceutici SpA Parentérale 59.533 DT [C]
- SUPLASYN 20 MG/2ML Solution Injectable B/1/2ML NORDIC PHARMA Locale 75.471 DT [C]

5.4.1.9. - Traitement des dorsalgies essentielles

ACIDE URIDINE-5' TRIPHOSPHORIQUE

• UTEPLEX 2 MG/ML Solution Buvable B/45/2 ML BIODIM Orale 13.525 DT [C]

ADENOSINE

• ATEPADENE 30 MG Gélule B/30 MAYOLY SPINDLER Orale 9.850 DT [C]

5.4.2. - Médicaments de la goutte

Les médicaments utilisés contre la goutte comprennent d'une part la colchicine et les antiinflammatoires non stéroïdiens employés dans la crise aiguë, et d'autre part les médicaments qui font baisser l'uricémie et permettent ainsi de prévenir les accès de goutte. Au début d'un traitement visant à corriger l'hyperuricémie, il vaut mieux ajouter temporairement un antiinflammatoire non stéroïdien ou de la colchicine. L'hyperuricémie asymptomatique inférieure à 9 mg/100 ML requiert rarement un traitement médicamenteux.

La colchicine réduit la réponse inflammatoire provoquée par l'acide urique et est utilisée dans le traitement de la crise de goutte. On commence par 1 mg suivi de 0,5 mg toutes les 2-3 heures jusqu'à disparition de la douleur ou jusqu'au moment où les effets indésirables gastro-intestinaux apparaissent (6 à 8 mg maximum). La colchicine entraîne en effet fréquemment des nausées, des vomissements et de

la diarrhée. Elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale et hépatique. L'administration prolongée dans un but prophylactique, ce qui n'est probablement pas indiqué, peut provoquer une dépression médullaire et une névrite périphérique. Ces effets indésirables lui font souvent préférer, pour la crise de goutte, les antiinflammatoires non stéroïdiens. Aussi bien la colchicine que les antiinflammatoires non stéroïdiens doivent être donnés dès le début de la crise, ce qui permet d'éviter le recours aux corticoïdes. Le traitement ne sera pas prolongé au-delà de quelques jours.

L'allopurinol inhibe la formation d'acide urique et peut prévenir les crises de goutte et de lithiase urique. Il est également utile dans les cas de production exagérée d'acide urique rencontrés dans les polycythémies et pendant le traitement des leucémies. On commence habituellement à la dose de 100 mg p.j. à augmenter le cas échéant en fonction des taux d'acide urique sans dépasser 600 mg p.j. en 2 prises. Le déclenchement d'une crise aiguë est l'effet indésirable le plus fréquent, surtout si le traitement a été commencé moins de six semaines après une crise aiguë et/ou si la dose de départ a été élevée. Les autres effets indésirables sont : troubles gastro-intestinaux, exanthème, hépatite cholestatique, troubles de l'hématopoïèse et rarement syndrome de Lyell. L'allopurinol ralentit la métabolisation de la 6-mercaptopurine et de l'azathioprine dont les doses doivent être réduites en cas d'association. L'allopurinol potentialise l'effet des anticoagulants coumariniques et augmente l'incidence d'allergie cutanée aux aminopénicillines. Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique. En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être réduite.

COLCHICINE

COLCHICINE OPOCALCIUM 1 MG Comprimé B/20 OPOCALCIUM TA Orale 2.949 DT [E]

ALLOPURINOL

- PURINOL 100 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 2.890 DT [E]
- PURINOL 300 MG Comprimé Sécable B/50 IBN AL BAYTAR TA Orale 5.810 DT [E]

5.4.3. - Autres analgésiques non morohiniques

Le nefopam est utilisé pour le traitement symptomatique des affections douloureuses, possède une structure chimique non apparentée à celle des antalgiques actuellement connus. Il ne provoque ni accoutumance, ni dépendance, ni phénomène de sevrage. Son utilisation prolongée n'est pas suivie d'un épuisement de son activité antalgique. Acupan n'a aucune action anti-inflammatoire ou antipyrétique. Il n'entraîne pas de dépression respiratoire et ne ralentit pas le transit intestinal et possède une faible activité anticholinergique.

La floctafénine est un antalgique réservé à l'adulte et qui peut etre à l'origine d'accidents d'allure allergique : ces accidents sont rares mais graves et imposent l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés. La prise de floctafénine est déconseillée pendant la grossesse et au cours de l'allaitement et contre indiquée en présence de bêtabloquants.

NEFOPAM

- ACUPAN 20 MG Solution Injectable B/5/2 ML BIOCODEX TA Parentérale 5.643 DT [E]
- NEFOMED 20 MG Solution Injectable B/5/2 ML UNIMED TA Parentérale 4.670 DT [E]

FLOCTAFENINE

• IDARAC 200 MG Comprimé Sécable B/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 2.615 DT [E]

5.4.4. - Enzymes à visée anti-inflammatoire

ALFA AMYLASE

- MAXILASE 3000 UI Comprimé Enr B/24 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 5.165 DT [C]
- MAXILASE Sirop FL/125 ML SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE Orale 3.550 DT [C]
- SUPRAMYLASE 1000 U.CEIP/5ML Sirop FL/125 ML SIPHAT Orale 1.570 DT [C]
- SUPRAMYLASE 3000 U.CEIP Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT Orale 2.966 DT [C]

6. - ANALGESIQUES MORPHINIQUES

La classification des analgésiques de l'Oganisation Mondiale de la Santé prévoit trois paliers :

- Antalgiques de palier 3, il s'agit des analgésiques puissants : morphine, buprénorphine, Fentanyl
- Antalgiques de palier 2, ils concernent les analgésiques morphiniques de puissance intermédiaire (tramadol) et les analgésiques morphiniques peu puissants (codéine, dihydrocodéine, dextropopoxyphène)
- Antalgiques de palier 1, ils concernent les analgésiques non morphiniques : paracétamol, acide acétyl salicylique (voir chapitre 5. douleur et inflammation)

D'une manière générale, le risque de toxicomanie croît avec l'intensité de l'effet analgésique; ce risque limite fortement l'utilisation des analgésiques morphiniques dans le traitement d'affections chroniques.

Aux doses thérapeutiques, la morphine et les autres analgésiques puissants sont capables de supprimer des douleurs d'origines diverses. Surtout aux doses plus élevées, on observe de la sédation et une dépression respiratoire. En stimulant la zone chémosensible du bulbe, la morphine et les dérivés analgésiques puissants peuvent provoquer des nausées et des vomissements. Enfin, les analgésiques morphiniques inhibent également le réflexe de la toux. Parmi les effets indésirables de la morphine et de plusieurs autres analgésiques narcotiques, on relève encore: hypotension orthostatique, myosis, constipation, spasme du pylore et contraction des voies biliaires et du sphincter d'Oddi.

Selon la dose et la durée de l'administration, une tolérance aux effets des analgésiques narcotiques peut se manifester, mais elle ne se produit pas avec la même intensité en ce qui concerne le myosis et la constipation. L'augmentation de la dose s'avère alors nécessaire pour surmonter la tolérance. Lors d'un usage répété, il y a risque de dépendance psychique et physique ainsi que d'apparition d'un syndrome de sevrage lors de l'arrêt brutal du traitement.

Dans le cadre des soins palliatifs, on insiste de plus en plus sur la nécessité de calmer la douleur de manière adéquate. Le schéma de l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit 3 étapes chez ces patients.

- La première étape prévoit l'administration d'un analgésique courant comme l'acide acétylsalicylique ou le paracétamol.
- La deuxième étape prévoit l'association d'un analgésique narcotique mineur comme la codéine à un analgésique courant.
- La troisième étape prévoit le passage à un analgésique narcotique majeur comme la morphine.

On passera le plus souvent à une préparation à libération prolongée de morphine quand la dose adéquate aura été trouvée. La dose de morphine doit être augmentée en fonction des besoins. Quand la voie orale est ou devient inapplicable, la morphine peut être administrée par voie parentérale, par ex. en perfusion sous-cutanée.

Le *tramadol* a une action analgésique qui résulterait à la fois d'effets de type morphinique et d'autres types. Il peut provoquer des réactions anaphylactiques, des nausées, de la sécheresse de la bouche, de la transpiration, de la sédation, des vertiges et des tremblements. Des convulsions ont été observées notamment chez des épileptiques et chez des patients atteints de troubles métaboliques ainsi que lors de la prise concomitante d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Il y a possibilité de dépendance physique.

Le *fentanyl* est disponible sous forme d'emplâtre pour administration transdermique en cas de douleur chronique. Ces emplâtres ne peuvent être utilisés qu'en cas de douleur stable.

La pethidine est un morphinomimétique agoniste pur. L'action analgésique est cinq à dix fois plus faible que celle de la morphine. Une dépression respiratoire modérée existe même aux doses thérapeutiques.

La codéine est un agoniste morphinique pur indiqué pour la douleurs d'intensité modérée à intense ne répondant pas à l'utilisation d'antalgiques périphériques utilisés seuls, chez l'enfant à partir de 1 an.

Des agonistes partiels tels la buprénorphine diminuent l'effet d'agonistes complets tels la morphine.

L'utilisation concomitante de plusieurs analgésiques narcotiques ne se justifie pas dans la plupart des cas.

Les antagonistes morphiniques sont repris à la fin de ce chapitre.

MORPHINE

- MOSCONTIN 10 MG Comprimé à Libération Prolongée B/14 MUNDIPHARMA S.A.S TB Orale H [V]
- MOSCONTIN 30 MG Comprimé à Libération Prolongée B/14 MUNDIPHARMA S.A.S TB Orale H [V]
- MOSCONTIN 60 MG Comprimé à Libération Prolongée B/14 MUNDIPHARMA S.A.S TB Orale H [V]
- MOSCONTIN 100 MG Comprimé à Libération Prolongée B/14 MUNDIPHARMA S.A.S TB Orale H [V]
- MOSCONTIN 200 MG Comprimé à Libération Prolongée B/14 MUNDIPHARMA S.A.S TB Orale H [V]
- MORPHINE RENAUDIN 10 MG/ML Solution Injectable B/100/1ML RENAUDIN TB Parentérale H [V]
- MORPHINE AGUETTANT 0.1 MG/ML Solution Injectable B/10/5ML AGUETTANT TB Parentérale H [V]
- SKENAN LP 10 MG Gélule à Libération Prolongée B/14 BRISTOL MYERS SQUIBB TB Orale 5.175 DT [V]
- SKENAN LP 30 MG Gélule à Libération Prolongée B/14 BRISTOL MYERS SQUIBB TB Orale 13.059 DT [V]
- SKENAN LP 60 MG Gélule à Libération Prolongée B/14 BRISTOL MYERS SQUIBB TB Orale 25.686 DT [V]

FENTANYL

- DUROGESIC 25 μ G/Heure 2.5 MG/10 cm² Timbre Trans-Dermique B/5 Dispositifs transdermiques JANSSEN-CILAG TB Locale 67.519 DT [V]
- DUROGESIC 50 μG /Heure 5 MG/20 cm² Timbre Trans-Dermique B/5 TTD JANSSEN-CILAG TB Locale 118.461 DT [V]
- DUROGESIC 75 μG /Heure 7.5 MG/30 cm² Timbre Trans-Dermique B/5 Dispositifs transdermiques JANSSEN-CILAG TB Locale 164.263 DT [V]
- DUROGESIC 100 μ G /Heure 10 MG/40 cm² Timbre Trans-Dermique B/5 Dispositifs transdermiques JANSSEN-CILAG TB Locale 201.647 DT [V]

PETHIDINE

• PETHIDINE RENAUDIN 100 MG/2 ML Solution Injectable B/10/2 ML RENAUDIN TB Parentérale H [V]

TRAMADOL

- ASTRADOL 50 MG Gélule B/10 ADWYA TA Orale 3.300 DT [E]
- ASTRADOL 50 MG Gélule E B/30 ADWYA TA Orale 8.900 DT [E]
- ASTRADOL 100 MG/ML Gouttes Buvables FL/10 ML ADWYA TA Orale 7.350 DT IEI
- ASTRADOL LP 100 MG Comprimé à Libération Prolongée B/10 ADWYA TA Orale 7.200 DT [E]
- ASTRADOL 100MG/2ML Solution Injectable B/5/2ML ADWYA TA 7.900 DT [E]
- SOULADOL 100 100 MG/2ML Solution Injectable B/5/2 ML DORCAS TA Parentérale 7.820 DT [E]
- TRAMADIS 50 MG Gélule B/10 MEDIS TA Orale 3.000 DT [E]
- TRAMADIS 100MG/2ML Solution Injectable B/5/2ML MEDIS TA 8.920 DT [E]
- TRAMAL 50 MG Gélule B/10 TERIAK TA Orale 4.682 DT [E]
- TRAMAL 100 MG/ML Gouttes Buvables FL/10 ML TERIAK TA Orale 10.290 DT [E]
- TRAMAL RETARD 100 MG Comprimé à libération prolongée B/10 TERIAK TA Orale 9.360 DT [E]

• TRAMAL 100 MG Suppositoire B/5 TERIAK TA Rectale 4.000 DT [E]

CODEINE

• CODENFAN 1 MG/ML Sirop FL/200 ML BOUCHARA-RECORDATI TA Orale 4.991 DT [E]

Addenda: antagonistes morphiniques

La naloxone peut être utile dans le traitement des intoxications aiguës par analgésiques narcotiques, p.ex. pour combattre une dépression respiratoire. L'administration d'un tel antagoniste chez des personnes qui prennent en chronique des narcotiques provoque des symptômes aigus de sevrage. Les ampoules ne peuvent être conservées que trois ans, ce qui est important pour la trousse d'urgence.

7. - SYSTEME NERVEUX

7.1. - HYPNOTIQUES, SEDATIFS, ANXIOLYTIQUES

Ce chapitre reprend:

- les benzodiazépines
- les médicaments apparentés aux benzodiazépines
- des préparations diverses.

Il est difficile de séparer nettement les propriétés anxiolytiques, sédatives et hypnotiques; celles-ci ne dépendent souvent que de la dose. Ces médicaments doivent être utilisés de façon limitée en raison de leurs effets indésirables qui se rencontrent surtout à doses élevées et/ou après utilisation prolongée. Les associations ne présentent pas d'avantages par rapport aux produits simples, et comme elles posent des problèmes plus graves en cas de surdosage, leur emploi est à déconseiller.

En cas d'insomnie, il faut en premier lieu rechercher les facteurs qui en sont la cause. Une approche non médicamenteuse telle une modification du mode de vie ou éventuellement une psychothérapie peut être indiquée. Si un hypnotique est malgré tout prescrit, une benzodiazépine est le premier choix mais son usage doit être limité à quelques jours.

Dans la prise en charge de l'anxiété, il y a lieu de rechercher de quel type d'anxiété il s'agit: stress posttraumatique, phobie sociale, réactions de panique, syndrome obsessionnel compulsif ou angoisse généralisée. Dans toutes ces formes d'angoisse, la préférence doit être accordée à un traitement cognitif comportemental en raison de son efficacité et de l'absence d'effets indésirables. Les médicaments, par exemple les benzodiazépines, n'ont qu'une place limitée. Dans la phobie sociale, les β-bloquants sont un premier choix, et les antidépresseurs sont indiqués dans le syndrome compulsif obsessionnel ainsi que dans les formes graves du trouble panique.

Lorsqu'un anxiolytique, un sédatif ou un hypnotique s'avère nécessaire, la préférence est donnée le plus souvent aux benzodiazépines qui ont une moindre toxicité lors de surdosage tout en étant aussi efficaces. Ceci n'empêche que même pour les benzodiazépines, l'indication doit être bien établie, la posologie doit être maintenue aussi basse que possible et la durée du traitement doit être limitée à quelques semaines au maximum. Les substances apparentées aux benzodiazépines ne semblent pas plus avantageuses que les benzodiazépines.

L'usage des barbituriques comme hypnotique, sédatif ou anxiolytique est obsolète. Il n'existe plus de spécialités à base de barbituriques enregistrées dans cette indication. Certains barbituriques qui possèdent une durée d'action intermédiaire ou longue sont employés comme antiépileptiques. Les substances à très courte durée d'action (thiopental) sont utilisées en anesthésiologie comme inducteurs de la narcose; elles ne sont pas reprises ici.

7.1.1. - Benzodiazépines

Les benzodiazépines provoquent chez l'homme différents effets: anxiolyse, sédation et induction du sommeil, relâchement musculaire et aussi effet anticonvulsivant. On peut y faire appel pour le traitement de l'anxiété, de l'insomnie et de l'épilepsie (par exemple lors de myoclonies, de crise épileptique et dans l'état de mal épileptique).

L'intoxication aiguë aboutit à de la somnolence et de la confusion mentale, mais rarement à une dépression respiratoire et au coma. Une issue fatale n'est généralement pas à craindre sauf en cas

d'absorption simultanée d'alcool ou d'autres substances à effet dépresseur, ou en présence d'une pathologie sous-jacente.

L'effet sédatif des benzodiazépines peut être gênant et représenter un risque pour la conduite automobile ou l'utilisation d'outils dangereux. En cas d'utilisation comme hypnotique, il peut exister un effet résiduel pendant la journée. Une sédation exagérée et de longue durée peut se manifester, surtout en cas de traitement à doses élevées, chez les personnes âgées (risque d'amnésie rétrograde et de chutes avec fractures de la hanche), en présence d'affections hépatiques et en cas de prise concomitante d'autres médicaments à effet dépresseur ou d'alcool. Des réactions dites paradoxales avec insomnie aggravée, angoisse et même agressivité ont été décrites avec diverses benzodiazépines. La biodisponibilité du midazolam après prise orale augmente en cas de prise concomitante de jus de pamplemousse.

De la tolérance aux effets thérapeutiques et aux effets indésirables apparaît lors d'usage chronique. De la dépendance psychique et physique se manifeste après quelques semaines de traitement et des manifestations de sevrage peuvent survenir à l'arrêt du traitement parmi lesquelles angoisse, insomnie, troubles de la perception allant jusqu'à des phobies, des réactions maniaques et d'autres manifestations psychotiques, et parfois des convulsions.

Il n'est pas clairement établi qu'il existe des différences cliniques significatives entre les benzodiazépines disponibles. Certaines benzodiazépines dont le clonazépam sont utilisées en thérapeutique antiépileptique; dans l'état de mal épileptique, on utilise surtout le diazépam par voie intraveineuse ou rectale. Des propriétés pharmacocinétiques comme la demi-vie et la formation ou non de métabolites actifs sont susceptibles d'influencer la durée des effets, du moins lors d'usage chronique.

On subdivise classiquement les benzodiazépines en trois groupes, en fonction de leurs propriétés pharmacocinétiques: les benzodiazépines à courte durée d'action, à durée d'action intermédiaire et à longue durée d'action.

- Au vu des propriétés pharmacocinétiques, on doit s'attendre à une très courte durée d'action pour le midazolam utilisé par voie intraveineuse. Des manifestations de sevrage sont plus prononcées lors de l'arrêt de la prise de ces benzodiazépines à demi-vie brève; les réactions paradoxales décrites plus haut semblent également plus fréquentes.
- On peut s'attendre à une durée d'action intermédiaire pour l'alprazolam, le lorazépam.
- Pour les autres benzodiazépines, les propriétés pharmacocinétiques suggèrent une plus longue durée d'action.

Comme hypnotique, il est logique de choisir une benzodiazépine à durée d'action intermédiaire, et comme anxiolytique, un médicament à plus longue durée d'action.

Il est précisé ci-après pour chaque spécialité si, parmi les indications mentionnées dans la notice, figurent l'anxiété, l'insomnie ou les deux; ces informations ne correspondent pas toujours à la logique décrite plus haut. Il faut remarquer que lorsqu'un même principe actif existe sous deux ou plusieurs dénominations différentes, les indications peuvent éventuellement varier de même que les posologies. Il existe en effet d'importantes différences individuelles en matière de sensibilité aux effets sédatifs des benzodiazépines. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser de faibles doses au début d'un traitement. Les doses nécessaires sont généralement plus faibles pour les personnes âgées, les insuffisants rénaux et hépatiques ou ceux qui souffrent d'autres affections. Pour l'usage exceptionnel des benzodiazépines chez l'enfant, il existe des règles particulières de posologie.

Si l'on souhaite arrêter un traitement prolongé, la posologie devra être diminuée progressivement à raison de 10 à 20% par semaine, de préférence après être passé à une benzodiazépine à demi-vie longue.

ALPRAZOLAM

- PRAZINE 0.5 MG Comprimé Sécable B/30 HIKMA PHARMACUTICALS TA Orale 2.949 DT [I]
- XANAX RETARD 1 MG Comprimé LP B/30 PFIZER FA BELGIQUE TA Orale 7.865 DT [I]

BROMAZEPAM

- ANXIOMYL 6 MG Comprimé Sécable Tube/30 ADWYA TA Orale 4.200 DT [I]
- LEXOMIL 6 MG Comprimé Sécable T/30 TERIAK TA Orale 6.485 DT [1]

CLOBAZAM

• URBANYL 10 MG Comprimé Sécable B/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 3.695 DT [I]

CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE

- TRANXENE 50 MG Poudre pour Préparation Injectable B/5+S/2.5ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale 9.260 DT [I]
- TRANXENE 20 MG Poudre pour Préparation Injectable B/5+S/2ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale 8.205 DT [I]
- TRANXENE 10 MG Gélule B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 1.380 DT [I]
- TRANXENE 5 MG Gélule B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 1.595 DT [I]

LORAZEPAM

- TEMESTA 2.5 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 BIODIM TA Orale 2.178 DT [I]
- TEMESTA 1 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 BIODIM TA Orale 1.778 DT [1]

PRAZEPAM

- LYSANXIA 10 MG Comprimé Sécable B/40 PFIZER S.A MAROC TA Orale 5.215 DT [1]
- LYSANXIA 15 MG/ML Gouttes Buvables FL/20 ML PFIZER S.A MAROC TA Orale 3.875 DT [I]

MIDAZOLAM

- IPNODIS MEDIS 25 MG/5ML Solution Injectable B/5/5 ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- IPNODIS MEDIS 2 MG/2 ML Solution Injectable B/10/2 ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- IPNODIS MEDIS 5 MG/1 ML Solution Injectable B/10/1 ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- IPNODIS MEDIS 50 MG/10 ML Solution Injectable B/6/10 ML MEDIS TA Parentérale H [V]

7.1.2. - Médicaments apparentés aux benzodiazépines

Le *zolpidem* est une imidazopyridine. Cette substance est proposée comme hypnotique. Des études récentes ont montré qu'elle a les mêmes effets escomptés et les mêmes effets indésirables que les benzodiazépines, y compris la tolérance et la dépendance. Le traitement sera bref.

ZOLPIDEM

- SOMEX 10 MG Comprimé Pell. Séc. B/15 PHARMAGREB TA Orale 5.020 DT [C]
- STILNOX 10 MG Comprimé B/14 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 5.774 DT [C]
- ZOLPINOX 10 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/15 ADWYA TA Orale 4.590 DT [C]

7.1.3. - Divers

Les données relatives à l'efficacité et à l'innocuité de certains de ces médicaments sont peu nombreuses.

Le *méprobamate* engendre une dépendance physique et psychique prononcée et provoque une induction enzymatique. La prise d'une dose excessive est dangereuse. Le méprobamate est à déconseiller.

MEPROBAMATE

- MEPROBAMATE 400 MG Comprimé B/40 SIPHAT TA Orale 1.755 DT [I]
- EQUANIL 400 MG Solution Injectable B/10/5ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale 1.960 DT [I]

HYDROXYZINE

- ATARAX 10 MG Sirop FL/200 ML UCB PHARMA TA Orale 1.750 DT [I]
- ATARAX 25 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 4.925 DT [I]
- ATARAX 100 MG Solution Injectable B/6/2ML UCB PHARMA TA Parentérale H [1]

CAPTODIAMINE

COVATINE 50 MG Comprimé Enrobé B/45 BAILLY-CREAT TC Orale 4.705 DT [I]

BROMOLACTOBIONATE DE CA

- BROMOLACTOBIONATE DE CALC Sirop FL/200 ML SIPHAT Orale H [C]
- CALCIBRONAT 2 GR COMPRIME EFFERV. T/20 TRACIS Orale 7.625 DT[C]

ETIFOXINE

• STRESAM 50 MG Gélule B/60 BIOCODEX TA Orale 9.986 DT [C]

7.2. - NEUROLEPTIQUES

Les neuroleptiques ou antipsychotiques ont été regroupés comme suit :

- les phénothiazines
- les butyrophénones et les diphénylpipéridines
- les benzamides
- les autres neuroleptiques.

Les neuroleptiques ou antipsychotiques sont indiqués dans le traitement des psychoses et de certains autres syndromes comportant des hallucinations, du délire et de l'agitation psychomotrice. Certains neuroleptiques sont également prescrits comme antiémétiques. Les neuroleptiques sont aussi souvent utilisés chez des patients agressifs, dans les accès maniaques et chez des malades agités, par exemple les patients déments. Dans les épisodes aigus, il peut être utile de recourir à l'administration parentérale. En raison de l'incidence élevée des effets indésirables, surtout chez les personnes âgées, l'établissement du diagnostic, le choix du médicament et de la posologie doivent se faire avec le plus grand soin. Les neuroleptiques ne sont en général pas indiqués dans le traitement de l'insomnie et de l'angoisse.

Comme les propriétés thérapeutiques des neuroleptiques, leurs effets indésirables sont en grande partie la conséquence d'une action inhibitrice sur des récepteurs dopaminergiques centraux. Les neuroleptiques peuvent induire, parfois dès le début du traitement, des symptômes extrapyramidaux tels que hypokinésie (pseudo-parkinsonisme), hyperkinésie (dystonie, dyskinésie) et acathisie (impossibilité

de rester immobile). Ces symptômes sont atténués par l'arrêt du traitement ou par la réduction de la posologie, ou éventuellement, par l'administration d'un anticholinergique qu'il ne faut cependant pas prescrire d'emblée. L'acathisie est peu influencée par la prise d'un anticholinergique. En cas de dystonie aiguë, un anticholinergique est souvent administré par voie parentérale.

Les neuroleptiques augmentent le risque de manifestations épileptiformes chez l'épileptique. Les neuroleptiques provoquent également une perturbation de la fonction hypothalamo-hypophysaire, avec hyperprolactinémie, pouvant conduire lors d'un traitement prolongé, à de l'aménorrhée, de la galactorrhée et de la gynécomastie, ainsi qu'une réduction de la sécrétion des gonadotrophines. L'administration prolongée surtout de fortes doses de neuroleptiques peut provoquer des dyskinésies tardives, parfois irréversibles, se manifestant surtout par des mouvements anormaux oro-faciaux. Les neuroleptiques potentialisent l'effet sédatif d'autres médicaments et de l'alcool. Les neuroleptiques provoquent à différents degrés de la sédation et de l'hypotension orthostatique. Un allongement de l'intervalle QT est décrit avec certains neuroleptiques, surtout les phénothiazines (la thioridazine en premier lieu, raison pour laquelle elle a été retirée du marché), l'halopéridol et le sultopride. Des torsades de pointes peuvent survenir, surtout en cas d'usage parentéral et certainement en présence de facteurs de risque. L'usage parentéral mène parfois à une dépression cardio-respiratoire qui peut être mortelle. Le syndrome malin des neuroleptiques, qui se manifeste par de la pyrexie, une rigidité musculaire, une sédation prononcée, des troubles de la conscience et une élévation du taux de CK, est une complication très grave qui doit être diagnostiquée et traitée précocement.

L'effet des neuroleptiques diffère d'un produit à l'autre et selon le patient. Les doses doivent être adaptées à chaque cas, en se basant sur la réponse clinique et l'apparition d'effets indésirables extrapyramidaux. Dans les traitements de longue durée, il convient de rechercher la dose minimale efficace de façon à réduire les risques de dyskinésie tardive. Si cette dose est prise en une fois, elle le sera de préférence le soir.

7.2.1. - Phénothiazines

Parmi les phénothiazines, les dérivés pipérazinés ont une action antipsychotique particulièrement marquée, mais les effets extrapyramidaux sont prononcés. Par contre, certains dérivés à chaîne latérale diméthylaminoalkyle comme la lévomépromazine sont davantage sédatifs et hypotenseurs.

Pour obtenir une longue durée d'action, certaines molécules ont été estérifiées. C'est le cas du palmitate de pipotiazine qui s'administre uniquement par voie intramusculaire.

Outre les effets indésirables déjà signalés dans l'introduction générale, les phénothiazines peuvent provoquer dans de rares cas une hypersensibilité se manifestant par une leucopénie le plus souvent réversible, par une hépatite cholestatique, ou par des dermatoses allergiques. On a également signalé des pigmentations cutanées anormales et de la photosensibilisation. Certaines phénothiazines exercent également des effets anticholinergiques dont il faut tenir compte en cas de glaucome à angle fermé ou d'hypertrophie prostatique; cet effet anticholinergique est probablement responsable du fait que certains dérivés des phénothiazines produisent moins de manifestations extrapyramidales.

CHLORPROMAZINE

- CHLORPROMAZINE 25 MG Comprimé Drageifié B/600 SIPHAT TA Orale H [E]
- CHLORPROMAZINE 100 MG Comprimé Dragéifié B/500 SIPHAT TA Orale H [E]
- LARGACTIL 100 MG Comprimé Sécable B/30 AVENTIS TA Orale 1.553 DT [E]
- LARGACTIL 25 MG Comprimé Sécable B/50 AVENTIS TA Orale 0.610 DT [E]
- LARGACTIL 25 MG/5 ML Solution Injectable B/5/5 ML SANOFI-AVENTIS TA Parentérale 1.790 DT [E]

LEVOMEPROMAZINE

- LEVOMEPROMAZINE 100 MG Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT TA Orale 3.655 DT [E]
- LEVOMEPROMAZINE 25 MG Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT TA Orale 1.765 DT [E]
- NOZINAN 25 MG Solution Injectable B/5/1 ML AVENTIS TA Parentérale 3.175 DT [E]
- NOZINAN 4% Gouttes Buvables FL/30 ML AVENTIS TA Orale 1.722 DT [E]

PIPOTIAZINE

PIPORTIL 4% Gouttes Buvables FL/10 ML SANOFI-AVENTIS TA Orale 15.712 DT [E]

PIPOTIAZINE PALMITATE

- PIPORTIL L4 25 MG Solution Injectable B/3/1ML AVENTIS TA Parentérale 21.722 DT [E]
- PIPORTIL L4 100 MG Solution Injectable B/1/4ML AVENTIS TA Parentérale 20.591 DT [E]

PROPERICIAZINE

• NEULEPTIL 4% Gouttes Buvables FL/30 ML SANOFI-AVENTIS TA Orale 4.143 DT [E]

7.2.2. - Butyrophénones et diphénylpipéridines

Ces substances sont caractérisées par des propriétés antipsychotiques prononcées et donnent moins de sédation et d'hypotension orthostatique que les phénothiazines. Les effets indésirables extrapyramidaux sont fréquents.

HALOPERIDOL

- HALDOL 1 MG Comprimé B/40 JANSSEN-CILAG TA Orale 1.436 DT [E]
- HALDOL 5 MG Solution Injectable B/5/1 ML JANSSEN-CILAG TA Parentérale 1.377 DT [E]
- HALDOL 5 MG Comprimé B/30 PHARMAGHREB TA Orale 3.940 DT [E]
- HALDOL 2 pour mille Gouttes Buvables FL/15 ML PHARMAGHREB TA Orale 1.825 DT [E]
- HALDOL DECANOAS 50 MG Suspension Injectable B/5/1ML JANSSEN-CILAG TA Parentérale 18.729 DT ^[E]
- HALDOL DECANOAS 50 MG Suspension Injectable B/1/1ML JANSSEN-CILAG TA Parentérale 4.646 DT [E]
- NEURODOL 0.2% Gouttes Buvables FL/30 ML OPALIA PHARMA TA Orale 2.160 DT [E]

PIPAMPERONE

• DIPIPERON 40 MG Comprimé B/20 JANSSEN-CILAG TA Orale 1.701 DT [E]

7.2.3. - Benzamides

Les benzamides peuvent présenter les effets indésirables classiques des neuroleptiques, notamment les effets extrapyramidaux et endocriniens.

Le *sulpiride*, à faibles doses, est proposé sans beaucoup d'arguments dans certaines dépressions légères et certains troubles psychosomatiques; à doses élevées, il peut être utilisés dans la schizophrénie et d'autres états psychotiques.

Le tiapride est utilisé dans des états d'agitation psychomotrice, par exemple lors de délire alcoolique; il est repris avec les Médicaments utilisés dans le traitement des dépendances alcoolique et tabagique.

Le métoclopramide qui n'exerce pas d'effet antipsychotique, est repris avec les Antiémétiques.

AMISULPRIDE

- SOLIAN 100 MG Comprimé Sécable B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 42.965 DT [E]
- SOLIAN 400 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 124.458 DT [E]
- ZOLEN 100 MG Comprimé Sécable B/60 GALPHARMA TA Orale 30.000 DT [E]
- ZOLEN 200 MG Comprimé Sécable B/60 GALPHARMA TA Orale 80.000 DT [E]
- ZOLEN 200 MG Comprimé Sécable B/20 GALPHARMA TA Orale 28.000 DT [E]
- ZOLEN 400 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 85.080 DT [E]

SULPIRIDE

- DOGMATIL 200 MG Comprimé Sécable B/12 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 7.712 DT [E]
- DOGMATIL 100 MG Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT TA Parentérale 1.722 DT [E]
- DOGMATIL 0.5% Solution Buvable FL/200 ML SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 3.335 DT [E]
- DOGMATIL 50 MG Gélule B/30 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 4.540 DT [E]
- DOPRID 100 MG 100MG/2ML Solution Injectable B/4/2 ML DORCAS TA Parentérale 1.700 DT [E]
- SEDATYL 100 MG Solution Injectable B/4/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.722 DT [E]
- SINAPRID 0.5% Solution Buvable Fl/150 ML GALPHARMA TA Orale 2.260 DT [E]
- SINAPRID 50 MG Gélule B/30 GALPHARMA TA Orale 3.950 DT [E]
- SINAPRID 200 MG Comprimé Sécable B/10 GALPHARMA TA Orale 5.000 DT [E]
- SULPIRIL 0.5% Solution Buvable FL/200 ML OPALIA PHARMA TA Orale 3.110 DT [E]

TIAPRIDE

- TIAPRIDAL 100 MG Comprimé Sécable B/20 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 5.057 DT [E]
- TIAPRIDAL 100 MG Solution Injectable B/12/2 ML SANOFI-AVENTIS France TA Parentérale 4.649 DT [E]

7.2.4. - Autres neuroleptiques

Les substances ci-dessous diffèrent des précédentes par leur structure chimique et souvent aussi par leurs propriétés.

Quelques substances (*clozapine, olanzapine, rispéridone*), appelées "neuroleptiques atypiques", se distinguent par une activité s'exerçant tant sur les symptômes positifs que sur les symptômes négatifs de la schizophrénie; elles provoqueraient moins d'effets indésirables extrapyramidaux mais on ne sait pas si elles entraînent moins de dyskinésie tardive.

La clozapine est efficace chez certains patients qui ne répondent pas aux autres neuroleptiques. Elle est utilisée pour la réduction (à long terme) du comportement suicidaire récurrent lors de schizophrénie ou en cas de trouble schizoaffectif et dans les psychoses au cours de l'évolution de la maladie de Parkinson. Le traitement doit être instauré en milieu hospitalier. En raison du risque d'agranulocytose ainsi que de myocardite et de cardiomyopathie, son usage doit être limité et un contrôle régulier de la formule sanguine (hebdomadaire au début du traitement) et de la fonction cardiaque s'avère indispensable.

L'olanzapine, et la rispéridone peuvent être responsables de l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral avec mortalité accrue chez des patients atteints de démence. Un tel risque ne peut être exclu pour aucun antipsychotique (atypique ou non).

La Ziprasidone est indiquée dans le traitement de la schizophrénie, des épisodes mixtes ou maniaques des troubles bipolaires modérément sévères.

CLOZAPINE

- LEPONEX 25 MG Comprimé Sécable B/50 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Orale H [E]
- LEPONEX 100 MG Comprimé Sécable B/50 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Orale H [E]

OLANZAPINE

- OLANZA 5 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 107.920 DT [E]
- OLANZA 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 198.920 DT [E]
- VAINCOR 5 MG Comprimé Enrobé Sécable B/28 MEDIS TA Orale 107.720 DT [E]
- VAINCOR 10 MG Comprimé Enrobé Sécable B/28 MEDIS TA Orale 199.520 DT [E]

PIMOZIDE

• ORAP 4 MG Comprimé B/30 JANSSEN-CILAG TA Orale 10.027 DT [E]

RISPERIDONE

- RAXIDONE 2 MG Comprimé Pelliculé B/60 SAIPH TA Orale 68.000 DT [E]
- RAXIDONE 2 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 34.920 DT [E]
- RESPIROX 2 MG Comprimé B/20 AL HIKMA TA Orale 27.040 DT [E]
- RISPERDAL 2 MG Comprimé Sécable B/60 JANSSEN-CILAG TA Orale 125.227 DT EI
- RISPERDAL 1 MG/ML Solution Buvable FL/60 ML JANSSEN-CILAG TA Orale 87.697 DT [E]
- RISPERIDONE 2 MG Comprimé Pelliculé B/60 TERIAK TA Orale 67.000 DT [E]

ZIPRAZIDONE

- ZELDOX 40 MG Gélule B/30 PFIZER PHARMA GMBH TA Orale 88.030 DT [E]
- ZELDOX 20 MG/ML Poudre Pour Préparation Injectable B/1FL+S/1.2 ML PFIZER PHARMA GMBH TA Parentérale 43.131 DT [E]

ARIPIPRAZOLE

- ABILIFY 10 MG Comprimé B/28 OTSUKA Pharma. Europe UK TA Orale 261.131 DT [E]
- ABILIFY 15 MG Comprimé B/28 OTSUKA Pharma. Europe UK TA Orale 261.131 DT [E]

QUETIAPINE

- SEROQUEL 25 MG Comprimé Pell. B/60 ASTRA ZENECA TA Orale 59.055 DT [E]
- SEROQUEL 100 MG Comprimé Pell. B/60 ASTRA ZENECA TA Orale 180.535 DT [E]
- SEROQUEL 200 MG Comprimé Pell. B/60 ASTRA ZENECA TA Orale 225.755 DT [E]
- SEROQUEL 300 MG Comprimé Pell. B/60 ASTRA ZENECA TA Orale 371.200 DT [E]

7.3. - ANTIDEPRESSEURS

Ce chapitre reprend:

- les antidépresseurs tricycliques et substances apparentées, ainsi que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
- les sels de lithium.
- autres antidepresseurs.

7.3.1. - Antidépresseurs tricycliques, substances apparentées et ISRS

En fonction de leur structure et de leur mécanisme d'action, ces substances sont souvent classées en trois groupes. Les substances du premier groupe ont une structure tricyclique, les autres pas. A quelques exceptions près, les substances du premier et du deuxième groupe inhibent de façon variable la recapture tant de la noradrénaline que de la sérotonine. Les substances du troisième groupe sont des inhibiteurs plus sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Toutes ces substances ont un effet antidépresseur à peu près équivalent qui se manifeste après une à trois semaines de traitement pour autant qu'il s'agisse bien d'une dépression majeure. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, les crises de panique et les phobies, des ISRS et la clomipramine peuvent être indiqués. L'imipramine, l'amitriptyline et leurs dérivés sont encore exceptionnellement utilisés dans l'énurésie nocturne mais seulement après échec d'autres mesures. Les antidépresseurs tricycliques et les substances apparentées sont aussi utilisés dans le traitement des douleurs neuropathiques et d'autres douleurs chroniques. Les ISRS semblent avoir un effet favorable dans le syndrome prémenstruel sévère.

La biotransformation de toutes ces substances peut fortement varier d'une personne à l'autre de sorte que la posologie optimale doit être déterminée individuellement. Il est recommandé de commencer le traitement avec une dose faible et de l'augmenter progressivement si nécessaire. Il est préférable d'interrompre le traitement progressivement étant donné que des symptômes de sevrage sont décrits pour certains médicaments. Le traitement est en général poursuivi 4 à 6 mois après disparition des symptômes dépressifs. En cas de dépression grave et récidivante, il est parfois nécessaire de prescrire un traitement d'entretien de plusieurs années.

Certains effets indésirables et certaines interactions peuvent survenir avec les antidépresseurs des trois groupes, d'autres sont propres à certains groupes.

Effets indésirables survenant avec les différents groupes

Des troubles sexuels (troubles de l'érection et de l'éjaculation, problèmes en rapport avec la libido et l'orgasme) sont fréquemment rapportés avec tous les antidépresseurs. Un abaissement du seuil convulsif, avec risque d'induction d'une crise épileptique, peut survenir avec tous les antidépresseurs, surtout à doses élevées et en cas d'antécédents d'épilepsie. Des tremblements et une sudation exagérée sont assez fréquemment rapportés. Des symptômes de sevrage (par ex. tremblements, vertiges, nausées, diarrhée, tendances maniaques) surviennent parfois lors de l'arrêt brutal du traitement, plus fréquemment avec les substances à demi-vie courte. Des cas d'hépatotoxicité ont été décrits avec les antidépresseurs des différents groupes.

Effets indésirables propres aux premier et deuxième groupes

Les antidépresseurs du premier groupe peuvent provoquer une hypotension orthostatique et des troubles de la conduction cardiaque (effet de type quinidine); ceux-ci surviennent surtout chez les personnes âgées, en cas de pathologie cardio-vasculaire préexistante et à doses élevées. En cas de surdosage, des troubles du rythme pouvant être fatals peuvent survenir.

Les antidépresseurs du premier groupe et certaines substances du deuxième groupe ont des effets anticholinergiques. Cela peut occasionner des problèmes chez les patients atteints d'une hypertrophie de la prostate ou d'un glaucome à angle fermé, ou en cas de traitement concomitant par d'autres médicaments à action anticholinergique.

La plupart des substances des premier et deuxième groupes contrecarrent l'action des antihypertenseurs à action centrale (méthyldopa, clonidine); ils renforcent l'effet des sympathicomimétiques utilisés par exemple comme décongestionnants.

Un effet sédatif survient entre autres avec l'amitriptyline, la maprotiline. Cette propriété sédative est intéressante en cas de dépression associée à de l'angoisse; la dose principale ou unique se fera de préférence le soir.

L'association de ces antidépresseurs à des inhibiteurs des monoamine oxydases peut entraîner des effets indésirables graves, tels que des crises hypertensives et hyperpyrétiques.

Effets indésirables propres aux ISRS

Un syndrome sérotoninergique peut se manifester notamment par de la fièvre, de l'agitation, des myoclonies et, plus rarement, des convulsions, une arythmie ventriculaire ou une hyperthermie marquée. Ce syndrome a parfois une évolution fatale chez des patients traités avec des doses élevées d' ISRS ou lors de leur association à un inhibiteur des monoamine oxydases ou à d'autres substances à action sérotoninergique comme certains antidépresseurs du premier et du deuxième groupe (p.ex. clomipramine, imipramine, venlafaxine...), le dextrométhorphane, le lithium, la péthidine, le tryptophane, le millepertuis. Si de telles associations s'avèrent nécessaires, le traitement doit être instauré progressivement et régulièrement contrôlé.

Les ISRS induisent fréquemment des troubles gastro-intestinaux tels des nausées. Ils sont peu sédatifs. Ils peuvent provoquer des manifestations extrapyramidales et renforcer celles induites par les neuroleptiques. Les ISRS pourraient provoquer des hémorragies, par ex. au niveau du système gastro-intestinal, de la peau ou des muqueuses; la prudence est de rigueur en cas d'utilisation concomitante d'autres médicaments qui influencent la coagulation. Une hyponatrémie peut survenir, surtout chez les personnes âgées.

Les ISRS inhibent dans le foie certaines iso-enzymes du cytochrome P450, responsables du catabolisme de divers médicaments. Ils diffèrent entre eux à cet égard et la signification clinique de certaines interactions n'est pas évidente. Ce sont surtout la fluoxétine (et son métabolite actif la norfluoxétine), la fluvoxamine et la paroxétine qui inhibent le catabolisme des antidépresseurs du premier et du deuxième groupe; la fluvoxamine principalement inhibe le catabolisme des anticoagulants coumariniques, de la carbamazépine, de la clozapine et de la théophylline; la fluoxétine inhibe le catabolisme de la carbamazépine et de la phénytoïne.

Lorsque l'on désire passer d'un ISRS à un autre antidépresseur, surtout s'il s'agit d'un inhibiteur des monoamine oxydases, la longue demi-vie des ISRS peut poser des problèmes; ceci est surtout important pour la fluoxétine dont le métabolite actif (la norfluoxétine) a une demi-vie de plus de 7 jours. En fonction de la demi-vie, un intervalle sans médicament de 1 à 2 semaines (5 semaines pour la fluoxétine) devrait être respecté.

7.3.1.1. - Premier groupe

AMITRIPTYLINE

- APO-AMITRIPTYLINE 10 MG Comprimé Enrobé FL/100 APOTEX TA Orale 1.912 DT [E]
- APO-AMITRIPTYLINE 25 MG Comprimé Enrobé FL/100 APOTEX TA Orale 3.018 DT [E]

CLOMIPRAMINE

- ANAFRANIL 25 MG Solution Injectable B/5/2ML DEFIANTE FARMACEUTICATA Parentérale 3.771 DT [E]
- ANAFRANIL 25 MG Comprimé Enrobé B/50 DEFIANTE FARMACEUTICATA TA Orale 8.700 DT [E]
- ANAFRANIL 10 MG Comprimé Enrobé B/60 DEFIANTE FARMACEUTICA TA Orale 6.950 DT [E]
- ANAFRANIL 75 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/20 DEFIANTE FARMACEUTICA TA Orale 14.723 DT [E]
- CLOMIPRAMINE (CHLRHYDRATE) MERCK 25 MG Comprimé Pellicule B/50 MERCK GENERIQUES TA Orale 5.222 DT [E]

TRIMIPRAMINE

- SURMONTIL 4% Gouttes Buvables FL/30 ML AVENTIS TA Orale 3.268 DT [E]
- SURMONTIL 25 MG Comprimé Sécable B/50 AVENTIS TA Orale 2.738 DT [E]

7.3.1.2. - Deuxième groupe

MILNACIPRAN

- IXEL 25 MG Gélule B/56 PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Orale 22.115 DT [E]
- IXEL 50 MG Gélule B/56 PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Orale 39.735 DT [E]

VENLAFAXINE

- EFFEXOR LP 37.5 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale 21.967 DT [E]
- EFFEXOR LP 75 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale 44.179 DT [E]
- TEDEMA 25 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TA Orale 8.980 DT [E]
- TEDEMA 37.5 MG Gélule LP B/30 MEDIS TA Orale 15.160 DT [E]
- TEDEMA 50 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TA Orale 13.500 DT [E]
- ZENEXOR LP 37.5 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 OPALIA PHARMA TA Orale 14.900 DT [E]
- ZENEXOR LP 75 MG Gélule à Libération Prolongée B/30 OPALIA PHARMA TA Orale 29.900 DT [E]

7.3.1.3. - Troisième groupe (ISRS)

ESCITALOPRAM

- ESOPREX 10 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 TERIAK TA Orale 29.900 DT [E]
- SEROPLEX 10 MG Comprimés Pellicule Sécable B/28 H.LUNDBECK A/S TA Orale 40.303 DT [C]
- SEROPLEX 10 MG Comprimés Pellicule Sécable B/14 SANOFI AVENTIS MAROC TA Orale 20.425 DT [C]

FLUOXETINE

- DINALEXIN 20 MG Gélule B/30 PHARMAGHREB TA Orale 22.990 DT [E]
- ROSAL 20 MG Gélule B/30 MEDIS TA Orale 24.900 DT [E]
- SEROTYL 20 MG/5 ML Solution Buvable Fl/90 ML + cuillère mesure GALPHARMA TA Orale 12.000 DT [E]
- SEROTYL 20 MG Gélule B/20 GALPHARMA TA Orale 15.000 DT [E]
- SEROTYL 20 MG Gélule B/30 GALPHARMA TA Orale 21.000 DT [E]

FLUVOXAMINE

• FLOXYFRAL 100 MG Comprimé Pelliculé B/15 SOLVAY PHARMA TA Orale 12.888 DT [E]

PAROXETINE

- DEPROXYL 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 GALPHARMA TA Orale 11.020 DT [E]
- DEPROXYL 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 GALPHARMA TA Orale 22.020 DT [E]
- DEROXAT 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 GlaxoSmithKline TA Orale 20.911 DT [E]
- DIVARIUS 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 CHIESI S.A TA Orale 13.100 DT [E]
- DIVARIUS 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 CHIESI S.A TA Orale 24.780 DT [E]
- PAREXAT 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 PHARMAGHREB TA Orale 11.880 DT [E]
- PAREXAT 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 PHARMAGHREB TA Orale 11.880 DT [E]
- PAREXAT 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 PHARMAGHREB TA Orale 22.880 DT [E]
- PAROXINE 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 ALLIANCE PHARMA TA Orale 10.400 DT [E]
- PAROXINE 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 ALLIANCE PHARMA TA Orale 20.800 DT [E]
- PAXETIN 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ACTAVIS TA Orale 14.575 DT [E]

SERTRALINE

- ZOLOFT 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/15 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 15.280 DT [E]
- NETRAL 50 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TA Orale 23.920 DT [E]
- SERVAL 25 MG Gélule B/30 MEDIS TA Orale 11.080 DT [E]
- SERVAL 50 MG Gélule B/30 MEDIS TA Orale 19.900 DT [E]
- SERTRALINE ACTAVIS 50 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ACTAVIS TA Orale 22.640 DT [E]
- SERTRALINE ACTAVIS 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ACTAVIS TA Orale 42.045 DT EI
- SOLOTIK 100 MG Comprimés Pellicule Sécable FI/15 IBN AL BAYTAR TA Orale 20.710 DT [C]
- SOLOTIK 50 MG Comprimés Pellicule Sécable Fl/15 IBN AL BAYTAR TA Orale 10.355 DT [C]
- SOLOTIK 50 MG Comprimés Pellicule Sécable Fl/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 20.710 DT [C]

CITALOPRAM

- CELOPRAM 20 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 15.000 DT [E]
- CELOPRAM 40 MG/ML Solution Buvable Fl/12ML ADWYA TA Orale 11.000 DT [E]

7.3.2. - Sels de lithium

Les sels de lithium sont actifs dans la prévention des phases maniaques et dans une moindre mesure, des épisodes dépressifs des psychoses maniaco-dépressives où ils sont souvent associés à un autre antidépresseur. Ils peuvent aussi être utiles dans la dépression unipolaire, en particulier lorsqu'il s'agit de dépressions rapidement récidivantes, de troubles atypiques de l'humeur, en présence d'une anamnèse familiale de dépression bipolaire ainsi que de dépressions résistantes. L'effet du lithium ne se manifeste qu'après 2 à 3 semaines de traitement de sorte que des neuroleptiques sont indiqués pour traiter les crises de manie aiguë.

En raison des grandes variations d'une personne à l'autre quant à la cinétique et la sensibilité au lithium, la posologie doit être adaptée individuellement en fonction des concentrations plasmatiques qui sont mesurées environ 12 heures après la dernière prise. Il est généralement admis qu'une lithémie entre 0,8 et 1 mEq/l ne présente pas de danger et est efficace. Chez les personnes âgées, les concentrations plasmatiques souhaitées sont légèrement moindres. Une réduction de la posologie s'impose lors d'insuffisance rénale.

Les effets indésirables tels que nausées, diarrhée, sédation, tremblements fins des extrémités sont fréquents, surtout 2 à 4 heures après la prise, mais ils sont le plus souvent passagers. Une polyurie n'est pas rare; des cas de diabète insipide néphrogénique ont été décrits. Si la concentration plasmatique dépasse 1 mEq/l, les symptômes augmentent; modifications électrocardiographiques et troubles du

rythme, ataxie, dysarthrie, convulsions et désorientation peuvent se manifester progressivement. Après une intoxication, des symptômes neurologiques résiduels peuvent persister et une plus grande sensibilité à la neurotoxicité du lithium peut se manifester aux concentrations plasmatiques normales. Un goitre éventuellement associé à une hypothyréose est rare.

Une réduction de la natrémie par la prise de diurétiques, un régime sans sel, des vomissements ou de la diarrhée, ainsi que la prise d'antiinflammatoires non stéroïdiens, d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent augmenter la lithémie et ainsi accroître le risque d'effets indésirables. La prudence s'impose lors de l'association du lithium à un ISRS. Les sels de lithium sont probablement tératogènes de sorte que leur prise pendant le premier trimestre de la grossesse doit être évitée, sauf en cas d'indication impérative.

Une évaluation de la fonction rénale, cardiaque et thyroïdienne est conseillée avant d'instaurer un traitement au lithium, et doit être répétée annuellement.

LITHIUM CARBONATE

• TERALITHE 250 MG Comprimé Sécable B/100 THERAPLIX TC Orale 2.834 DT [E]

7.3.3. - Autres antidépresseurs

La Tianeptine se caractérise par une activité sur les troubles de l'humeur qui la situe en position médiane dans la classification bipolaire entre les antidépresseurs sédatifs et les antidépresseurs stimulants, une activité nette sur les plaintes somatiques et sur les troubles du caractère et du comportement de l'éthylique en période de sevrage.

TIANEPTINE

• STABLON 12.5 MG Comprimé Enrobé B/30 SERVIER TA Orale 11.963 DT [E]

7.4. - ANTIPARKINSONIENS

La symptomatologie de la maladie de Parkinson résulte d'un déséquilibre entre les neurones cholinergiques et dopaminergiques dans les ganglions de la base. Ce déséquilibre peut être corrigé par différentes catégories de médicaments:

- la lévodopa + inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique
- les agonistes dopaminergiques
- les anticholinergiques

7.4.1. - Lévodopa

La lévodopa, un précurseur de la dopamine, est le médicament le plus efficace dans la maladie de Parkinson. Environ 75% des patients traités pour une maladie de Parkinson idiopathique répondent favorablement à la lévodopa. La bradykinésie est améliorée en premier lieu, puis la rigidité. L'amélioration du tremblement nécessite souvent plusieurs semaines voire plusieurs mois de traitement. La lévodopa est pratiquement toujours associée à un inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique afin de diminuer les effets indésirables de la dopamine (troubles gastro-intestinaux, plus rarement troubles du rythme cardiaque).

Les effets indésirables précoces de cette association dépendent de la dose et sont souvent transitoires: troubles gastro-intestinaux (nausées, constipation), hypotension, troubles du comportement (confusion, surtout chez les patients âgés). Ce sont principalement les effets indésirables tardifs qui sont gênants; ils sont surtout d'origine centrale. Il s'agit le plus souvent de mouvements involontaires anormaux (dyskinésies), et plus rarement d'hallucinations, d'insomnie, de cauchemars, de comportement psychotique. Avec l'évolution de la maladie, on constate souvent une diminution de l'efficacité thérapeutique ou une disparition puis un retour rapide de l'efficacité: effet on-off. Les préparations à libération prolongée ou l'administration plus fréquente de doses plus faibles peuvent atténuer ces fluctuations.

Les contre-indications sont un ulcère gastro-duodénal en évolution, un accident coronarien récent, des troubles graves du rythme cardiaque, un état psychotique et le glaucome à angle fermé. La prudence s'impose lors d'antécédents d'ulcère gastro-duodénal ou d'hématémèse, d'une décompensation cardiaque et de troubles mineurs du rythme cardiaque, et chez les patients atteints d'un glaucome à angle ouvert chronique.

Les inhibiteurs non-sélectifs des monoamine oxydases et probablement le moclobémide augmentent les effets de la lévodopa; des crises hypertensives et de l'hyperpyrexie sont observées lors de leur administration concomitante.

Pour la lévodopa associée à un inhibiteur de la dopadécarboxylase, la dose journalière initiale sera de 100 à 250 mg de lévodopa. On augmentera la dose chaque semaine selon les besoins jusqu'à une dose quotidienne d'environ 500 mg en 2 ou 3 prises.

BENSERAZIDE+LEVODOPA

• MADOPAR 250 MG Comprimé quadrisécable B/100 ROCHE TA Orale 75.852 DT [E]

7.4.2. - Agonistes dopaminergiques

La bromocriptine, le ropinirole et le pramipexole sont le plus souvent utilisés en association à la lévodopa et permettent d'en diminuer les doses. Ces agonistes dopaminergiques doivent être ajoutés à doses progressivement croissantes. Chez les patients au stade débutant de la maladie de Parkinson, un agoniste dopaminergique peut être prescrit en monothérapie afin de retarder l'utilisation de levodopa. La bromocriptine est aussi utilisée dans le traitement de l'hyperprolactinémie.

Ces agonistes dopaminergiques présentent les mêmes effets indésirables précoces que la lévodopa tels que hypotension orthostatique, nausées, constipation et somnolence. Des spasmes vasculaires, des hallucinations et des réactions psychotiques sont rares aux doses usuelles. Des réactions inflammatoires de type fibrose telles pleurésie, péricardite et fibrose rétropéritonéale sont parfois observées lors de l'emploi prolongé des dérivés de l'ergot. Des cas d'endormissement soudain ont été rapportés, surtout avec le ropinirole.

BROMOCRIPTINE

- RONALIN 2.5 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 7.400 DT [E]
- BROMOCRIPTINE 2.5 MG Comprimé Sécable B/30 TERIAK TA Orale 7.500 DT [E]

ROPINIROLE

- REQUIP 5 MG Comprimé Pelliculé B/21 GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Orale 52.894 DT [E]
- REQUIP 2 MG Comprimé Pelliculé B/21 GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Orale 25.670 DT [E]
- REQUIP 0.5 MG Comprimé Pelliculé B/21 GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Orale 10.599 DT [E]

PRAMIPEXOLE

- SIFROL 0.18 MG Comprimé B/100 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 69.210 DT [E]
- SIFROL 0.18 MG Comprimé B/30 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 20.755 DT [E]
- SIFROL 0.70 MG Comprimé B/100 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 276.685 DT [E]
- SIFROL 0.70 MG Comprimé B/30 BOEHRINGER INGELHEIM TA Orale 83.015 DT [E]

7.4.3. - Anticholinergiques

Les anticholinergiques à action centrale sont parfois encore utilisés dans la maladie de Parkinson, principalement pour lutter contre le tremblement et la rigidité. Ils sont utilisés seuls, surtout en début de traitement, dans certaines formes mineures de parkinsonisme; toutefois, ils sont le plus souvent associés à la lévodopa. Ils sont aussi employés par voie intramusculaire ou intraveineuse, pour le traitement des dystonies aiguës survenant parfois lors de l'administration d'un neuroleptique ou d'une substance apparentée telle le métoclopramide. Ils sont aussi parfois utilisés pour contrecarrer les effets extrapyramidaux chroniques des neuroleptiques.

Les effets indésirables classiques des anticholinergiques sont de la sécheresse de la bouche, des troubles digestifs (nausées, constipation), oculaires (défaut d'accommodation, mydriase), urinaires (rétention) et plus rarement cardiaques (tachycardie, arythmie) ou centraux (confusion, agitation). Les anticholinergiques sont contre-indiqués en cas de glaucome à angle fermé et de troubles prostatiques. Un usage abusif de ces médicaments en raison de leurs propriétés hallucinogènes et euphorisantes a été décrit.

La liste ci-dessous reprend les anticholinergiques utilisés dans la maladie de Parkinson.

TRIHEXYPHENIDYLE

• PARKIZOL 5 MG Comprimé B/50 IBN AL BAYTAR TA Orale 3.565 DT [E]

BIPERIDENE

• AKINETON LP 4 MG Comprimé Pelliculé B/30 ABBOTT France TA Orale 4.142 DT [E]

7.4.4. - Inhibiteur de la catéchol-O-méthyltransférase

L'Entacapone un inhibiteur spécifique et réversible de la COMT qui agit principalement au niveau périphérique et qui est destiné à être administré en association avec des médicaments contenant de la lévodopa. Il est indiqué comme adjuvant aux traitements standards par lévodopa/bensérazide ou lévodopa/carbidopa chez des patients atteints de la maladie de Parkinson et de fluctuations motrices de fin de dose qui ne peuvent être stabilisés avec ces associations.

ENTACAPONE

COMTAN 200 MG Comprimé Pelliculé FL/30 NOVARTIS EUROPHARM LIMITED R.U TA Orale 60.375DT [E]

7.4.5. – Autre antiparkinsonien

AMANTADINE

• MANTADIX 100 MG Gélule BMS B/50 TA Orale 13.102 DT [E]

7.5. - ANTIEPILEPTIQUES

Sont utilisés dans le traitement de l'épilepsie:

- l'acide valproïque et le valproate de sodium
- la carbamazépine
- les barbituriques et apparentés
- le felbamate, la gabapentine et la vigabatrine
- les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.
- certaines benzodiazépines.

La décision d'instaurer un traitement antiépileptique de longue durée ne doit être prise que si le diagnostic d'épilepsie peut être considéré comme certain ou très vraisemblable. En effet, tous les antiépileptiques sont toxiques en usage chronique. Certains antiépileptiques sont aussi utilisés dans des neuropathies et autres douleurs chroniques.

En principe, dans l'épilepsie, une monothérapie devrait être choisie, avec recherche de la posologie la mieux adaptée, éventuellement à l'aide de la détermination des concentrations plasmatiques. Pour certains malades, un traitement faisant appel à deux ou même à plusieurs antiépileptiques sera nécessaire. L'interruption brusque ou même une réduction trop rapide de la posologie peut précipiter une crise convulsive. Lorsqu'il faut réduire la posologie, il convient de le faire de façon très progressive.

Pour plusieurs antiépileptiques, la possibilité d'un effet tératogène n'est pas à exclure, même si souvent elle ne justifie pas l'arrêt de la thérapeutique; un supplément d'acide folique doit toujours être prescrit en période périconceptionelle (voir chapitre Minéraux, vitamines et toniques).

Les barbituriques, la carbamazépine, sont des inducteurs enzymatiques et peuvent diminuer l'efficacité d'autres médicaments (p.ex. les contraceptifs hormonaux); ils peuvent provoquer de l'hypovitaminose D. Le millepertuis peut entraîner une diminution des taux plasmatiques de carbamazépine, de phénobarbital.

Des syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell ont été décrits avec plusieurs antiépileptiques.

7.5.1. - Acide valproïque et valproate de sodium

L'acide valproïque et les substances qui en libèrent sont les médicaments de premier choix pour toutes les formes d'épilepsie généralisée primaire comme absences, crises myocloniques, crises généralisées tonico-cloniques, et dans l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire.

Ils sont utilisés chez l'enfant à la dose initiale de 15 mg/kg/jour. Cette posologie peut être augmentée pour atteindre un maximum de 30 mg/kg/jour en trois prises. Chez l'adulte, la dose moyenne est de 900 à 1800 mg par jour. Les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont comprises entre 50 et 100 µg/ML mais l'intérêt de tels dosages n'est pas établi.

Parmi les effets indésirables, il faut citer des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements et diarrhée). Une perte temporaire de cheveux, des tremblements et une augmentation de poids peuvent également survenir. Des troubles hépatiques graves, qui apparaissent le plus souvent au cours des premières semaines de traitement, ont été observés, surtout chez les patients très jeunes qui présentent des syndromes épileptiques graves et qui sont sous polythérapie: les transaminases seront dosées tous les 3 mois lors de la première année de traitement puis une fois par an. Des troubles de l'hémostase avec thrombopénie ont aussi été observés, ainsi qu'une pancréatite. Il est dès lors utile de contrôler

l'hémostase (numération plaquettaire, temps de prothrombine) ainsi que les amylases et les lipases, en même temps que la fonction hépatique. Lors d'un usage prolongé, les effets néfastes sur la cognition sont nettement moindres qu'avec le phénobarbital et la phénytoïne.

ACIDE VALPROIQUE

- DEPAKINE 500 MG Comprimé Enrobé FL/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 7.900 DT [V]
- DEPAKINE 200 MG Comprimé Enrobé FL/20 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 3.280 DT IVI
- DEPAKINE 200 MG/3.5 ML Sirop FL/150 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TC Orale 5.697 DT [V]
- DEPAKINE 200 MG/ML Solution Buvable FL/40 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TC Orale 3.924 DT [V]
- DEPAKINE CHRONO 500 MG Comprimé à Libération Prolongée FL/30 SANOFI-AVENTIS FRANCE TC Orale 14.037 DT ^[V]
- VALOXINE 57.64 MG/ML Sirop FL/150 ML OPALIA PHARMA TC Orale 8.685 DT [V]

VALPROMIDE

• DEPAMIDE 300 MG Comprimé Dragéifié B/30 AVENTIS TC Orale 4.718 DT [V]

7.5.2. - Carbamazépine

La carbamazépine est employée en particulier dans le traitement de l'épilepsie partielle avec ou sans généralisation secondaire et dans les crises tonico-cloniques généralisées où elle est un des médicaments de premier choix. La carbamazépine est aussi utile dans le traitement des névralgies du trijumeau, et est parfois utilisée dans la psychose maniaco-dépressive.

La dose quotidienne est de 200 mg par jour en début de traitement. Cette dose peut être progressivement augmentée jusqu'à 800 à 1200 mg par jour en plusieurs prises. Les concentrations plasmatiques thérapeutiques de carbamazépine se situent entre 5 et $12 \,\mu g/ML$.

On observe des effets indésirables de type anticholinergique avec troubles de la vision, sécheresse de la bouche et rétention urinaire. Des réactions allergiques sont fréquentes et parfois graves. Des anémies aplastiques, des leucopénies et thrombopénies ainsi que des troubles de la fonction hépatique ont été décrits. La carbamazépine exerce un effet inducteur enzymatique.

CARBAMAZEPINE

- TAVER 200 MG Comprimé B/50 MEDOCHEMIE TC Orale 2.186 DT [V]
- TEGRETOL 100 MG Suspension Buvable FL/250 ML NOVARTIS PHARMA S.A TC Orale 11.856 DT IVI
- TEGRETOL LP 200 MG Comprimé Sécable à Libération Prolongée B/50 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TC Orale 14.418 DT [V]
- TEGRETOL LP 400 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TC Orale 16.396 DT ^[V]

7.5.3. - Barbituriques et apparentés

Le phénobarbital est le médicament antiépileptique le plus anciennement utilisé. Après avoir été délaissé pendant plusieurs années au profit des autres antiépileptiques, il reconnaît un regain d'intérêt. Il a l'avantage d'avoir une demi vie prolongée de 40 à 150 heure ,ce qui limite les problèmes de la non observance du médicament, et un coût faible. Des études récentes considèrent que les effets indésirables de ce médicament ont été souvent exagérés. Le phénobarbital est considéré par l'OMS comme le médicament antiépileptique de choix dans les pays en développement.

La dose habituelle de *phénobarbital* pour un adulte est de 100 à 200 mg par jour en une ou deux prises; elle peut être de 400 mg les premiers jours de traitement pour obtenir plus rapidement une concentration plasmatique efficace. Celle-ci se situe habituellement entre 15 et $40 \,\mu g/ML$.

Les effets indésirables les plus fréquents de ces médicaments sont la sédation, l'ataxie, la diplopie et certains troubles caractériels. Une induction enzymatique se produit.

D'après certaines études, l'emploi prolongé de barbituriques peut avoir un effet défavorable sur les facultés cognitives. Chez l'enfant, il peux parfois entraîner des troubles du comportement à type d'agitation ce qui nécessite son remplacement par un autre antiépileptique.

PHENOBARBITAL

- GARDENAL 10 MG Comprimé B/80 AVENTIS TC Orale 0.253 DT [V]
- GARDENAL 100 MG Comprimé B/20 AVENTIS TC Orale 0.253 DT [V]
- GARDENAL 40 MG Poudre pour Preparation Injectable B/1+S/2 ML AVENTIS TC Parentérale 1.427 DT [V]
- PHENOBARBITAL 50 MG Comprimé Sécable B/30 SIPHAT TC Orale 0.950 DT [V]

7.5.4. - Autres antiépileptiques

Ces substances sont utilisées le plus souvent en traitement complémentaire dans certaines formes d'épilepsie qui ne répondent pas suffisamment aux antiépileptiques classiques.

Les effets indésirables de la *gabapentine* sont principalement: somnolence, vertiges, ataxie, fatigue, céphalées, tremblements et troubles visuels.

Les effets indésirables de la *vigabatrine* sont: somnolence, nervosité, vertiges, troubles visuels et céphalées. Des psychoses et une prise pondérale ont été rapportées lors d'utilisation prolongée, ainsi que des lésions évolutives de la rétine avec rétrécissement concentrique du champ visuel. Un contrôle du champ visuel doit être effectué au moins une fois par an.

Les effets indésirables de la *lamotrigine* sont le plus souvent rencontrés sont de type : éruptions cutanées rapportées pour plus de 10 %, des cas Céphalées, sensations vertigineuses des troubles visuels et des nausées.

Pour le *clonazepam* les effets indésirables sont en rapport avec la dose ingérée, la sensibilité individuelle du patient de type : neuro-psychiatriques et cutanés.

VIGABATRIN

• SABRIL 500 MG Comprimé Sécable B/60 MARION MERREL S.A FRANCE TA Orale 97.884 DT [V]

GABAPENTINE

- GABA 300 MG Gélule B/90 OPALIA PHARMA TA Orale 59.615 DT [E]
- GABENTIN 300 MG Gélule B/45 ADWYA TA Orale 34.800 DT [E]
- GABOREX 300 MG Gélule B/48 ALLIANCE PHARMA TA Orale 31.000 DT [E]
- NEURONTIN 300 MG Gélule B/50 PARKE-DAVIS GmbH TA Orale 60.718 DT [E]
- NEURONTIN 600 MG Comprimé Pelliculé B/50 PARKE-DAVIS GmbH TA Orale 90.353 DT [E]
- NEURALGIN 300 MG Gélule B/90 PHARMAGHREB TA Orale 55.220 DT [E]

PREGABALINE

- LYRICA 75 MG Gélule B/14 PFIZER TA Orale 27.465 DT [E]
- LYRICA 150 MG Gélule B/56 PFIZER TA Orale 125.391 DT [E]

LAMOTRIGINE

- LAMICTAL 5 MG Comprimé Dispersible B/30 GSK FRANCE TA Orale 12.456 DT [V]
- LAMICTAL 25 MG Comprimé Dispersible B/30 GSK FRANCE TA Orale 25.959 DT [V]
- LAMICTAL 50 MG Comprimé Dispersible B/30 GSK FRANCE TA Orale 46.120 DT [V]
- LAMICTAL 100 MG Comprimé Dispersible B/30 GSK FRANCE TA Orale 76.561 DT [V]
- LAMICTAL 200 MG Comprimé Dispersible B/30 GSK FRANCE TA Orale 143.759 DT [V]
- LAMOTRIN 25 MG Comprimé Dispersible B/56 ACTAVIS TA Orale 31.890 DT [V]
- LAMOTRIN 50 MG Comprimé Dispersible B/56 ACTAVIS TA Orale 45.540 DT [V]
- LAMOTRIN 100 MG Comprimé Dispersible B/56 ACTAVIS TA Orale 82.020 DT [V]
- LAMOTRIN 200 MG Comprimé Dispersible B/56 ACTAVIS TA Orale 100.745 DT IVI

CLONAZEPAM

PMS CLONAZEPAM 2 MG Comprimé Sécable Fl/100 PHARMASCIENCE TA Orale 6.955 [V]

7.6. - ANTIMIGRAINEUX

Le traitement médicamenteux de la migraine nécessite d'abord un diagnostic exact et l'élimination des facteurs déclenchants ou aggravants.

Dans le traitement de la crise migraineuse, on prescrit d'abord un analgésique mineur ou un antiinflammatoire non stéroïdien (par ex. du paracétamol, de l'acide acétylsalicylique ou de l'ibuprofène) per os ou par voie rectale, souvent en association à un gastroprocinétique tel que le métoclopramide. Si ce traitement s'avère infructueux, il faut prescrire un antimigraineux: l'ergotamine ou, de plus en plus, un dérivé triptan par voie orale, nasale ou rectale. En cas d'échec, la crise migraineuse sévère sera traitée par le sumatriptan, ou par la dihydroergotamine. Sur base des données disponibles à ce jour, on ne sait pas si les triptans diffèrent entre eux quant à leur efficacité et le risque d'effets indésirables.

Comme effet indésirable des triptans, il faut signaler une sensation de lourdeur et d'oppression dans la poitrine; il pourrait s'agir dans de rares cas d'un spasme coronarien; les triptans sont contre-indiqués en présence d'affections coronariennes et d'antécédents d'accidents cérébro-vasculaires. Etant donné le risque accru de spasmes coronariens, l'emploi simultané de ces médicaments et d'ergotamine est contre-indiqué; un intervalle d'au moins 24 heures doit séparer l'administration de chacun de ceux-ci. L'utilisation concomitante d'un triptan et de millepertuis augmente les effets sérotoninergiques et le risque de syndrome sérotoninergique.

Les dérivés de l'ergot sont moins utilisés qu'auparavant en raison de leurs effets indésirables tels que des nausées, des vomissements, des douleurs épigastriques, de la diarrhée ainsi que des paresthésies, un refroidissement des extrémités et rarement de la claudication intermittente et de l'angor. Des spasmes vasculaires pouvant aboutir à une nécrose tissulaire (ergotisme) peuvent survenir en cas de surdosage, d'utilisation prolongée ou d'hypersensibilité. L'association à des macrolides tels l'érythromycine ou certaines substances apparentées augmente ce risque. L'utilisation chronique des dérivés de l'ergot peut provoquer des réactions inflammatoires de type fibrose telles que pleurésie, péricardite et/ou fibrose rétropéritonéale, et est donc à proscrire. Les dérivés de l'ergot sont contre-indiqués dans les affections coronariennes et vasculaires périphériques, pendant la grossesse (effet ocytocique, risque d'hypoxie foetale) et en cas d'insuffisance hépatique ou rénale. L'utilisation chronique de l'association ergotamine + caféine provoque des céphalées, ce qui prolonge indûment son utilisation.

Ni les dérivés de l'ergot, ni les triptans ne peuvent être utilisés à titre prophylactique ou en usage chronique. Chez les patients présentant des crises fréquentes (plus de deux accès par mois) ou des crises invalidantes ne répondant pas au traitement aigu, une prophylaxie antimigraineuse doit être envisagée. Les traitements prophylactiques les plus efficaces sont les β- bloquants sans activité sympathicomimétique intrinsèque (métoprolol, propranolol), les antisérotoninergiques (pizotifène, oxétorone). D'autres substances telles le valproate de sodium sont parfois utilisées comme traitement prophylactique. Les antimigraineux utilisés de manière chronique, mais surtout le pizotifène, peuvent entraîner une prise de poids. Ce dernier peut aussi provoquer de la somnolence.

Pendant la grossesse, les traitements antimigraineux prophylactiques doivent être évités.

7.6.1. - Médicaments de la crise migraineuse aiguê

SUMATRIPTANE

• IMIGRAN 50 MG Comprimé Pelliculé B/2 GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale 15.233 DT 🖪

DIHYDROERGOTAMINE

• IKARAN LP 5 MG Comprimé à Libération Prolongée B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION TUNISIE TC Orale 14.780 DT [E]

ÉLÉTRIPTAN

• RELPAX 40 MG Comprimé Enrobé B/2 PFIZER SA TA Orale 16.847 DT [E]

7.6.2. - Médicaments prophylactiques

PIZOTIFENE

- PIZOFEN 0.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 SAIPH TC Orale 3.990 DT [E]
- PIZOFEN 0.25 MG/5 ML Sirop FL/150 ML SIMED TC Orale 5.565 DT [E]

OXETORONE

NOCERTONE 60 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 ADWYA TC Orale 7.100 DT [E]

7.7. - ANTIHISTAMINIQUES H1

Les antihistaminiques H₁ sont indiqués dans le traitement symptomatique des manifestations cliniques de type allergique comme la rhinite et l'urticaire ainsi que dans les réactions légères d'hypersensibilité à des médicaments. Lors de réactions allergiques majeures tel le choc anaphylactique, l'administration d'un antihistaminique H₁ est cependant d'un intérêt secondaire, l'injection d'épinéphrine et de corticostéroïdes étant beaucoup plus importante. L'efficacité des antihistaminiques H₁ par voie générale dans le prurit non lié à une urticaire n'est pas établie. Les rhinites sans composante allergique et l'asthme bronchique ne sont pas améliorés par les antihistaminiques H₁. Leur utilisation comme antitussif ne se justifie pas. L'application cutanée d'antihistaminiques est à déconseiller en raison du risque élevé d'hypersensibilité et de photosensibilisation.

Certains antihistaminiques H₁, en particulier avec un effet anticholinergique marqué, sont efficaces dans le mal du transport et sont discutés ici. Ils sont également utilisés dans certains troubles labyrinthiques.

Les antihistaminiques H₁ possèdent souvent d'autres propriétés pharmacologiques qui parfois même peuvent être prédominantes. L'effet sédatif diffère d'un antihistaminique H₁ à l'autre mais aussi selon les individus et l'âge.

Un allongement de l'intervalle QT pouvant mener à des torsades de pointes parfois fatales a été décrit avec la terfénadine qui a été retirée du marché en octobre 2001. Cet allongement de l'intervalle QT a été décrit surtout à des doses élevées ou lors d'association à des substances qui peuvent ralentir son métabolisme telles que le jus de pamplemousse, les antimycosiques du groupe des azoliques tels que l'itraconazole, le kétoconazole, le miconazole, ainsi que certains macrolides (surtout la clarithromycine et l'érythromycine) et inhibiteurs de la protéase, ou à des substances arythmogènes. Il n'est pas exclu que ce problème puisse aussi survenir avec des antihistaminiques H₁ plus récents tels la fexofénadine et la loratadine, dont certains ont un métabolisme comparable à celui de la terfénadine. Pour les facteurs de risque des torsades de pointes en général, voir Gastroprocinétiques.

Les antihistaminiques H₁ nettement anticholinergiques sont contre-indiqués en cas de glaucome à angle fermé et d'hypertrophie prostatique. Chez les nourrissons, la prudence s'impose comme pour tous les médicaments à effet sédatif et il a été suggéré que les antihistaminiques H₁ du groupe des phénothiazines (alimémazine et prométhazine) donnés à des nourrissons prédisposés pouvaient jouer un rôle dans le syndrome de la mort subite. La plupart des antihistaminiques H₁ peuvent renforcer l'effet des psychotropes sédatifs et de l'alcool. De rares cas de leucopénie et d'agranulocytose ont été signalés.

Un addenda reprend la bétahistine utilisée dans le traitement des vertiges.

CYPROHEPTADINE

- CIPRACTINE 4 MG Comprimé B/30 TERIAK Orale 2.695 DT [E]
- CIPTADINE 4 MG Comprimé Enrobé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR Orale 2.970 DT [E]

CHLORPHENIRAMINE

• CHLOROHISTOL 4 MG Comprimé Sécable B/20 JULPHAR Orale 3.130 DT [E]

DEXCHLORPHENIRAMINE

- ALLERGAMINE 0.500 MG/5ML Sirop FL/125ML PHARMADERM Orale 2.080 DT [E]
- DENIR 0.5 MG/5ML Sirop FL/125 ML OPALIA PHARMA Orale 1.265 DT [E]

MEQUITAZINE

- PRIMALAN 0.03% Sirop FL/120 ML ADWYA Orale 5.280 DT [E]
- PRIMALAN 5 MG Comprimé Sécable B/10 ADWYA Orale 3.280 DT [E]
- PRIMALAN FORT 10 MG Comprimé Sécable B/15 ADWYA Orale 8.905 DT [E]

PROMETHAZINE

PROMETHAZINE 25 MG Comprimé Dragéifié B/20 SIPHAT Orale 0.935 DT IEI

CETIRIZINE

- ALLERGICA 10 MG Comprimé B/20 GALPHARMA TC Orale 6.900 DT [E]
- ALLERGICA 10 MG Comprimé B/10 GALPHARMA TC Orale 3.600 DT [E]
- ALLERGICA 10 MG Comprimé B/30 GALPHARMA TC Orale 10.200 DT [E
- ALLERGICA 0.1% Sirop FL/150 ML GALPHARMA TC Orale 6.900 DT [E]
- ARHIN 1% Sol.Buv. FL/15 ML OPALIA PHARMA TC Orale 4.200 DT [E]
- CETRIX 10 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 SIPHAT TC Orale 7.000 DT [E]
- VIRLIX 10 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/15 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TC Orale 7.825 DT [E]
- ZYRTEC 10 MG Comprimé Sécable B/15 IBN AL BAYTAR TC Orale 7.990 DT [E]

DESLORATADINE

- AERIUS 5 MG Comprimé Pelliculé B/15 SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TC Orale 10.940 DT [E]
- AERIUS 0.5 MG/ML Sirop FL/150 ML SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TC Orale 12.365 DT [E]
- ALLERGUS 5 MG Comprimé Pelliculé B/15 DAR ESSAYDALI TC Orale 6.220 DT [E]
- ALLERGUS 5 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAR ESSAYDALI TC Orale 11.400 DT [E]
- DESLOR 5 MG Comprimé Pelliculé B/15 MEDIS TC Orale 6.300 DT [E]
- DESLOR 5 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TC Orale 11.400 DT [E]

FEXOFENADINE

- FENADEX 180 MG Comprimé Pelliculé B/15 SAIPH TC Orale 6.800 DT [E]
- FENADEX 120 MG Comprimé Pelliculé B/15 SAIPH TC Orale 6.800 DT [E]
- TELFAST 180 MG Comprimé Enrobé B/15 MARION MERREL SA TC Orale 8.704 DT [E]
- TELFAST 120 MG Comprimé Enrobé B/15 MARION MERREL SA TC Orale 7.797 DT [E]

LORATADINE

- HISTADINE 10 MG Comprimé B/15 DAR ESSAYDALI TC Orale 5.120 DT [E]
- HISTADINE 0.1% Sirop FL/60 ML DAR ESSAYDALI TC Orale 3.148 DT [E]
- LORADINE 0.1% Sirop FL/60 ML OPALIA PHARMA TC Orale 3.675 DT [E]
- LORADINE 10 MG Comprimé B/10 OPALIA PHARMA TC Orale 4.890 DT [E]
- LORADINE 10 MG Comprimé Sécable B/30 OPALIA PHARMA TC Orale 7.520 DT ou H [E]
- ORAMINE 1MG/ML Sirop FL/60 ML WEST PHARMA TC Orale 3.500 DT [E]
- ORAMINE 10 MG Comprimés B/20 WEST PHARMA TC Orale 6.520 DT [E]
- RESTAMINE 10 MG Comprimé B/20 IBN AL BAYTAR TC Orale 6.500 DT [E]

LEVOCETIRIZINE

• XYZALL 5 MG COMPRIME B/14 UCB PHARMA TC Orale 9.707 DT [E]

ADDENDA: Bétahistine

La bétahistine est utilisée dans le traitement de la maladie de Ménière et dans certains cas de vertiges.

BETAHISTINE

- BETASERC 24 MG Comprimé sécable B/30 TERIAK TA Orale 12.970 DT [C]
- SERC 8 MG Comprimé B/60 TERIAK TA Orale 10.685 DT [C]

7.8. - MEDICAMENTS DES ETATS SPASTIQUES

Ce chapitre reprend un certain nombre de médicaments conseillés dans les états spastiques. Leur action est souvent limitée, et les doses efficaces s'accompagnent d'un certain nombre d'effets indésirables. Ces substances ne sont donc pas indiquées pour le traitement de crampes ou de raideurs musculaires banales. Leur emploi doit être limité aux affections spastiques graves telles que les maladies dégénératives de la moëlle épinière, sclérose en plaques et spasticité due à des lésions des voies corticospinales.

Certaines benzodiazépines présentent une certaine activité antispastique. Toutefois, celle-ci disparaît le plus souvent en cours de traitement. En outre, leur effet sédatif est une source de problèmes.

Le baclosène a une action favorable sur la spasticité d'origine spinale et peut-être aussi dans les manifestations spastiques liées à des troubles vasculaires cérébraux. Nausées et sédation sont les effets indésirables les plus fréquents.

La toxine botulique, injectée in situ, est utilisée pour certaines affections des muscles striés telles pied équin spastique, strabisme, blépharospasme, dystonie faciale et torticolis spasmodique.

TOXINE BOTULIQUE

- BOTOX 100 UI Poudre pour Préparation Injectable B/1 FLACON ALLERGAN FRANCE S.A.S. TA Parentérale H [E]
- DYSPORT 500 u.speywood Poudre pour Préparation Injectable B/1 FLACON BEAUFOUR IPSEN Pharma TA Parentérale H [E]

BACLOFENE

PMS-BACLOFEN 10 MG Comprimé Sécable FL/100
 PHARMASCIENCES
 TA Orale 4.710 DT [I]

7.9. - MEDICAMENTS DE LA SCLEROSE EN PLAQUE

INTERFERON BETA

- AVONEX 6MUI Solution Injectable B/4 seringues/1 ML BIOGENE Idec Ltd TA Parentéral H [E]
- BETAFERON 250μG/ML Solution Injectable B/15 Unidose+ Ser BAYER SCHERING PHARMA AG TA Parentéral H [E]
- REBIF 22 μ G 6 MUI Solution Injectable B/12 seringues/0.5 ML MERCK SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentéral H $^{[E]}$
- REBIF 44μG 12 MUI Solution Injectable B/12 seringues/0.5 ML MERCK SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentéral H [E]
- REBIF 22 μG/0.5ML Solution Injectable B/4 cartouches MERCK SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentéral H [E]
- REBIF 44μG/0.5 Solution Injectable B/4 cartouches MERCK SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentéral H [E]

7.10. - MEDICAMENTS DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

DONEPEZIL

- ARICEPT 5 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER S.A BELGIQUE TA Orale 126.475 DT [E]
- ARICEPT 10 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER S.A BELGIQUE TA Orale 126.475 DT [E]
- DOPEZIL 5 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TA Orale 91.000 DT [E]
- DOPEZIL 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 MEDIS TA Orale 91.000 DT [E]

RIVASTIGMINE

- EXELON 1.5 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale [E]
- EXELON 3 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale [E]
- EXELON 4.5 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale [E]
- EXELON 6 MG Gélule B/28 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale [E]
- EXELON PATCH 5 4.6mg/24h Dispositif Trans-dermique B/30 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale 239.110 DT [E]
- EXELON PATCH 10 9.5mg/24h Dispositif Trans-dermique B/30 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale 239.110 DT [E]

7.11. - MEDICAMENTS CONTRE LE TABAGISME

Nicotine

La nicotine est utilisée pour faciliter l'arrêt du tabagisme chez des personnes fortement motivées et soutenues par un programme d'accompagnement. La substitution nicotinique diminue dans une certaine mesure les manifestations de sevrage lors de l'arrêt du tabagisme (irritabilité...). Des vertiges, des nausées, des céphalées et des palpitations peuvent survenir chez des personnes qui n'ont pas développé de tolérance à la nicotine. Les différentes formulations à base de nicotine peuvent provoquer une irritation au site d'administration.

En vue d'éviter un surdosage, différentes présentations de nicotine ne peuvent pas être employées concomitamment et il est en principe contre-indiqué de fumer pendant la cure.

NICOTINE

- NICOPATCH 7MG/24H 17.5MG/10CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/7 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 24.360 DT ^[C]
- NICOPATCH 7MG/24H 17.5MG/10CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/28 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 86.125 DT ^[C]
- NICOPATCH 14MG/24H 35 MG/20CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/7 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 24.360 DT ^[C]
- NICOPATCH 14MG/24H 35 MG/20CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/28 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 85.300 DT ^[C]
- NICOPATCH 21MG/24H 52.5 MG/30CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/7 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 24.360 DT ^[C]
- NICOPATCH 21MG/24H 52.5 MG/30CM² TIMBRE TRANS-DERMIQUE B/28 TIMBRES PIERRE FABRE MEDICAMENT Locale 85.300 DT ^[C]
- NICOPASS ss menthe fraicheur 1.5MG past B/36 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 16.220 DT [C]
- NICOPASS ss menthe fraicheur 1.5MG past B/12 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.995 DT [C]
- NICOPASS ss reglisse menthe 1.5MG past B/36 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 16.220 DT [C]
- NICOPASS ss reglisse menthe 1.5MG past B/12 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.995 DT [9]

7.12. – ADDENDA : DERIVES AMPHETAMINIQUES

Le méthylphénidate est un stimulant du système nerveux central. Il augmenterait la concentration des monoamines (dopamine et noradrénaline) dans la fente synaptique. Il est indiqué dans le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez l'enfant de plus de six ans, sans limite supérieure d'âge et la narcolepsie avec ou sans cataplexie, en cas d'inefficacité du modafinil chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 6 ans. L'association du méthylphénidate à la phényléphrine, la phénylpropanolamine, l'éphédrine et la pseudoéphédrine constitue une contre indication absolue. Son emploi est également interdit chez la femme enceinte et chez les personnes présentant des manifestations psychotiques ou

ayant des troubles cardiaques. Les amphétamines sont le souvent à l'origine de nervosité, d'insomnie et une diminution de l'appétit.

METHYLPHENIDATE

• RITALIN 10 MG Comprimé Sécable B/30 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG S.A.S TB Orale [E]

8. - SYSTEME HORMONAL

8.1. - HORMONES CORTICO-SURRENALES ET HORMONE CORTICOTROPE

Figurent dans ce chapitre:

- la cortisone et l'hydrocortisone
- les glucocorticoïdes de synthèse

Les préparations à appliquer sur la peau et les muqueuses et celles destinées à l'inhalation sont reprises aux chapitres correspondants. Les associations de glucocorticoïdes et d'antihistaminiques sont décrites dans le chapitre Médicaments du système respiratoire.

Les glucocorticoïdes disponibles ne diffèrent entre eux que par l'activité par unité de poids et la durée de leur action, et par le degré de leur activité minéralocorticoïde. L'activité antiinflammatoire de 20 mg d'hydrocortisone ou de 25 mg de cortisone par voie générale est en première approximation équivalente à celle obtenue avec

- 5 mg de prednisone ou de prednisolone
- 4 mg de méthylprednisolone ou de triamcinolone
- 0,75 mg de bétaméthasone ou de dexaméthasone.

L'activité minéralocorticoïde, importante pour l'hydrocortisone et la cortisone, est moindre pour la prednisolone et la prednisone; elle est encore beaucoup moins prononcée pour les autres produits synthétiques. La durée d'action des glucocorticoïdes de synthèse est plus longue que celle de l'hydrocortisone.

Les indications générales des glucocorticoïdes sont les suivantes:

- l'insuffisance surrénale primaire ou secondaire: l'hydrocortisone est le traitement de choix; dans l'insuffisance surrénale primaire, on y associe souvent un minéralocorticoïde, par exemple la fludrocortisone;
- le traitement symptomatique des maladies dans lesquelles des processus immunitaires ou inflammatoires sont en cause: rhumatisme articulaire aigu, arthrite rhumatoïde après échec d'autres thérapeutiques, lupus érythémateux disséminé, certains syndromes néphrotiques, formes graves d'asthme bronchique, maladie sérique, oedème angio-neurotique, choc anaphylactique...
- certains cas d'agranulocytose, de lymphome, d'anémie hémolytique, de colite ulcéreuse, d'érythrodermie, de pemphigus, de leucémie aiguë, de lymphosarcome et de myélome multiple;
- l'immunosuppression après transplantation.

Dans la plupart de ces indications, les glucocorticoïdes ne représentent qu'un aspect de l'approche thérapeutique.

Les glucocorticoïdes par voie générale ne sont pas indiqués dans le psoriasis ou les maladies allergiques courantes de la peau ou des voies respiratoires supérieures.

Les glucocorticoïdes peuvent être responsables d'effets indésirables importants, surtout quand les doses physiologiques (20 à 30 mg par jour d'hydrocortisone ou l'équivalent) sont dépassées et lors de

traitement de longue durée. La rétention de sodium, parfois responsable d'oedème et d'hypertension, dépend de leur activité minéralocorticoïde.

Une insuffisance surrénale peut se manifester à l'arrêt du traitement mais aussi plus tardivement, lors d'un stress infectieux, traumatique ou chirurgical. Celle-ci est souvent réversible mais elle peut persister pendant plusieurs mois. Après un traitement prolongé (ou après peu de temps avec des doses massives), il est indispensable de réduire progressivement la posologie; en cas de stress ou d'intervention chirurgicale, la reprise de corticostéroïdes ou une augmentation temporaire de la posologie s'impose.

Parmi les autres effets indésirables, il faut relever:

- une symptomatologie clinique du syndrome de Cushing avec facies lunaire, acné et vergetures
- de la faiblesse musculaire et des troubles du rythme cardiaque consécutifs à une perte exagérée en potassium
- des myopathies graves, surtout chez l'enfant
- une hyperglycémie, surtout chez des sujets prédisposés
- une ostéoporose entraînant des fractures spontanées peu douloureuses ou des douleurs osseuses intenses, surtout lors de traitement prolongé avec des doses journalières équivalentes à au moins 7,5 mg de prednisolone; la perte osseuse est plus importante pendant les six premiers mois du traitement
- une nécrose osseuse aseptique notamment au niveau du col fémoral
- une résistance amoindrie aux agents infectieux et plus spécialement au Mycobacterium tuberculosis, au Candida albicans et aux virus, de même qu'une atténuation des symptômes cliniques de l'infection
- un arrêt de la croissance staturale
- de l'euphorie, de l'agitation, de l'insomnie, des vertiges, des céphalées et des réactions psychotiques survenant surtout chez des sujets à antécédents psychiatriques
- l'apparition de cataracte ou d'une augmentation de la pression intra-oculaire
- un risque d'arthropathie et d'infection lors d'injection intra-articulaire.

Ces effets indésirables justifient une posologie aussi basse et un traitement aussi bref que possible; l'administration locale ou en inhalation est à préférer quand elle est possible.

Les contre-indications absolues ou relatives des corticostéroïdes sont l'hypertension, la décompensation cardiaque, l'ostéoporose, l'épilepsie mal équilibrée, certaines psychoses, l'ulcère gastro-duodénal, la tuberculose et les infections virales ou mycosiques. Dans le diabète et durant la grossesse, les corticostéroïdes ne seront utilisés que pour des indications impérieuses.

La posologie pour les différents produits mentionnés n'est pas donnée vu qu'elle diffère d'une indication à l'autre. Pour la thérapeutique substitutive, on donne 20 à 30 mg d'hydrocortisone par jour en 2 à 3 prises. Dans les situations de stress, des doses plus élevées sont indiquées. Lorsqu'on veut obtenir un effet antiinflammatoire, on commence souvent avec des doses élevées d'un glucocorticoïde comme la prednisolone (40 à 60 mg par jour); on essaiera de diminuer le plus vite possible la dose pour aboutir à la dose d'entretien la plus faible possible, par exemple 10 à 20 mg par jour de prednisolone ou encore moins. Dans la mesure du possible, la dose journalière est prise en une fois le matin, ce qui respecte mieux le rythme circadien de la cortisolémie et provoque, aux doses faibles, une inhibition moins marquée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. L'administration un jour sur deux diminue davantage encore le risque d'une insuffisance surrénale; avec un tel schéma, on perd cependant dans certaines affections l'effet voulu le jour où le glucocorticoïde n'est pas donné. Pour l'immunosuppression, les doses sont plus élevées que lorsqu'on vise un effet antiinflammatoire.

Les préparations injectables sont généralement prévues pour une voie d'administration particulière par exemple intraveineuse, intramusculaire, intra-articulaire. Le terme «in situ» est utilisé dans les listes pour couvrir les voies intra-articulaire, intralésionnelle et locale. Il est indispensable de respecter scrupuleusement la voie d'administration indiquée. Les doses in situ dépendent de l'indication et ne sont pas données ici. Des effets indésirables systémiques peuvent ici aussi se manifester. Certaines préparations à usage intramusculaire sont des préparations «dépôt»; la posologie de ces préparations n'est pas définie.

8.1.1. - Cortisone et hydrocortisone

HYDROCORTISONE

- HYDROCORTISONE LEURQUIN 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/2 ML LEURQUIN MEDIOLANUM TA Parentérale 2.013 DT [E]
- CORTEF 10 MG Comprimé Sécable FL/100 PFIZER Canada Lnc TA Orale 5.191 DT [E]

8.1.2. - Glucocorticoïdes de synthèse

8.1.2.1. - Bétaméthasone

BETAMETHASONE

- ALERGOSONE 0.5 MG/ML Gouttes Buvables FL/30 ML OPALIA PHARMA TA Orale 3.418 DT [E]
- CELESTENE 2 MG Comprimé Soluble FL/20 SCHERING-PLOUGH TA Orale 6.581 DT [E]
- CELESTENE CHRONODOSE 5.7 MG/ML Suspension Injectable B/1/1 ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 1.943 DT [E]
- DIPROSTENE 7 MG Suspension Injectable B/1SER/1ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 5.165 DT [E]
- SUPRASTENE 0.05% Gouttes Buvables FL/30 ML WEST PHARMA TA Orale 3.220 DT [E]

BETAMETHASONE+DEXCHLORPHENIRAMINE

CELESTAMINE 0.250 MG Comprimé B/30 SCHERING-PLOUGH TA Orale 2.162 DT [E]

8.1.2.2. - Cortivazol

CORTIVAZOL

• ALTIM 3.750 MG Suspension Injectable B/1/1.5 ML AVENTIS TA Parentérale 8.394 DT [E]

8.1.2.3. - Dexaméthasone

La dexaméthasone est aussi utilisée pour inhiber la sécrétion cortico-surrénale en vue d'effectuer des tests de diagnostic ainsi que chez l'adulte avec syndrome adrénogénital et dans certains cas d'hirsutisme chez la femme.

DEXAMETHASONE

- DEXAMEDIS 4 MG Solution Injectable B/10/1 ML MEDIS TA Parentérale 6.800 DT [E]
- DEXAMEDIS FORT 8 MG/2 ML Solution Injectable B/1/2 ML MEDIS TA Parentérale 1.200 DT [E]
- DEXONE 4 4 MG Solution Injectable B/1/1 ML DORCAS TA Parentérale 0.675 DT [E]
- DEXONE 4 4 MG Solution Injectable B/5/1 ML DORCAS TA Parentérale 3.375 DT [E]
- DEXONE 8 8 MG Solution Injectable B/1/2 ML DORCAS TA Parentérale 0.920 DT [E]

- UNIDEX FORT 8 MG/2 ML Solution Injectable B/1/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.200 DT [E]
- UNIDEX 4 MG Solution Injectable B/10/1 ML UNIMED TA Parentérale 6.840 DT [E]

8.1.2.4. - Méthylprednisolone

METHYLPREDNISOLONE

- DEPO-MEDROL 80 MG Suspension Injectable B/Seringue pré-remplie/2 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale 4.807 DT [E]
- MEDROL 4 MG Comprimé Sécable B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale 3.203 DT [E]
- MEDROL 16 MG Comprimé Sécable B/20 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale 6.599 DT [E]
- MP 500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon +S/5 ML H [E]
- SOLU-MEDROL 20 MG/2 ML Poudre pour Préparation Injectable B/1 + S/2 ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Parentérale 1.820 DT [E]
- SOLU-MEDROL 40 MG/2 ML Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/2 ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Parentérale 2.679 DT [E]

8.1.2.5. - Prednisolone et prednisone

La prednisone est métabolisée par le foie en prednisolone; celle-ci convient mieux en cas d'insuffisance hépatique grave.

PREDNISOLONE

- SOLUPRED 20 MG Comprimé Effervescent FL/20 SANOFI AVENTIS TA Orale 4.504 DT [E]
- SOLUPRED 5 MG Comprimé Effervescent FL/30 SANOFI AVENTIS TA Orale 3.723 DT [E]

PREDNISONE

• PREDNISONE 5 MG Comprimé B/30 SIPHAT TA Orale 1.845 DT [E]

8.1.2.6. - Triamcinolone

TRIAMCINOLONE

 KENACORT RETARD 40 MG Suspension Injectable B/1/1 ML BRISTOL MYERS SQUIBB TA Parentérale 2.774 DT [E]

8.2. - MEDICAMENTS DE LA THYROÏDE

Ce chapitre reprend:

- les hormones thyroïdiennes
- les médicaments antithyroïdiens.

8.2.1. - Hormones thyroïdiennes

Il s'agit de la liothyronine ou T_3 (triiodothyronine) et de la lévothyroxine ou T_4 (tétraiodothyronine). Seule la T_4 est encore couramment utilisée. L'association de T_3 et de T_4 ne se justifie pas en raison de la transformation physiologique de la T_4 en T_3 .

L'hormone thyroïdienne (T₄) est indiquée dans l'hypothyroïdie, dans certaines formes de goitre euthyroïdien et de thyroïdite, et en association avec des antithyroïdiens après stabilisation de la

thyréotoxicose, pour empêcher l'hypertrophie thyroïdienne. Son utilisation dans l'obésité et dans les cas d'aménorrhée ou de stérilité non liés à une hypothyroïdie est à proscrire et dangereuse en raison du risque de thyréotoxicose.

La demi-vie de la T₄ étant de 6 à 7 jours, son effet maximal après prise répétée n'est obtenu qu'après plusieurs semaines et son activité peut persister plusieurs semaines après la fin du traitement.

La dose journalière de T₄ pour une substitution complète chez l'adulte est de 100 à 200 µg. Au début du traitement, de faibles doses sont généralement prescrites; elles sont ensuite progressivement augmentées. Dans les cas d'hypothyroïdie grave et chez les patients âgés, la prudence s'impose tout particulièrement. En effet, les hormones thyroïdiennes accélèrent le rythme cardiaque et augmentent la consommation d'oxygène du myocarde, ce qui impose une surveillance minutieuse des malades âgés ou présentant une affection coronarienne. La posologie d'entretien est déterminée en fonction de l'évolution clinique et des résultats du dosage plasmatique de la T₄ et surtout de la thyrotrophine (TSH). Une seule prise journalière, à jeun, est suffisante. Le surdosage provoque le tableau clinique de thyréotoxicose.

LEVOTHYROXINE

- LEVOTHYROX 100 μG Comprimé Sécable B/30 MERCK SANTE S.A.S TC Orale 2.100 DT [E]
- LEVOTHYROX 50 μG Comprimé Sécable B/30 MERCK SANTE S.A.S TC Orale 1.658 DT [E]
- LEVOTHYROX 25 μG Comprimé Sécable B/30 MERCK SANTE S.A.S TC Orale 1.052 DT [E]
- THYRO-4 100 μG Comprimé Sécable FL/100 FARAN TC Orale H [E]

8.2.2. - Médicaments antithyroïdiens

L'administration d'*iode* diminue temporairement la sécrétion thyroïdienne, l'hypervascularisation et le goitre dans la maladie de Basedow. C'est la raison pour laquelle l'iode est parfois utilisé lors d'une crise de thyréotoxicose ou comme préparation à une intervention chirurgicale. L'administration d'iode est contre-indiquée lorsqu'un traitement à base d'iode radioactif est prévu dans un délai rapproché.

Des *radioisotopes de l'iode* sont utilisés à petites doses (microcuries) dans un but diagnostique et à des doses nettement plus élevées (millicuries) dans le traitement de certaines thyréotoxicoses. L'iode radioactif est aussi employé dans certaines formes de carcinome de la thyroïde.

Les thioamides ou thiourées restent le traitement de base de la maladie de Basedow mais elles sont d'une utilité limitée en cas d'adénome toxique; elles n'apportent pas de solution à long terme dans le goitre multinodulaire toxique. Des doses élevées doivent être données aussi longtemps que persistent les signes de thyréotoxicose et l'hyperthyroxinémie. En fonction de ces paramètres, la dose sera progressivement réduite et le traitement d'entretien poursuivi d'habitude pendant 1 à 2 ans. En attendant les premiers signes cliniques d'amélioration, des β -bloquants tels le propranolol peuvent être indiqués.

En cas d'administration prolongée de thyréostatiques à posologie élevée, entraînant une hypothyroïdie iatrogène, il est important d'y associer en temps voulu la prise d'hormone thyroïdienne afin de corriger l'hypothyroïdie et d'éviter ainsi une hypertrophie de la thyroïde consécutive à une stimulation exagérée par l'hormone thyréotrope. Si une hypothyroïdie iatrogène se manifeste, elle est réversible à l'arrêt du traitement. Des éruptions cutanées et des troubles gastro-intestinaux sont assez fréquents; des arthralgies et des tests hépatiques perturbés sont plus rares. Une agranulocytose survient avec les thioamides chez environ 0,5% des patients, le plus souvent au cours des trois premiers mois du traitement. Aussi faut-il avertir les malades de la nécessité d'informer immédiatement leur médecin de

tout épisode fébrile ou infectieux. L'utilisation d'antithyroïdiens pendant la grossesse peut s'imposer en raison des risques que présente la chirurgie pendant cette période et de la contre-indication absolue que constitue alors l'iode radioactif, mais la patiente devra être suivie par un médecin spécialiste, vu le risque de goitre chez l'enfant.

BENZYLTHIOURACILE

• BASDENE 25 MG Comprimé B/50 BOUCHARA-RECORDATI TC Orale 0.761 DT [E]

THIAMAZOLE

- THYROZOL 10 MG Comprimé Pelliculé B/30 MERCK SERONO GmbH TA Orale 4.520 DT [E]
- THYROZOL 20 MG Comprimé Pelliculé B/20 MERCK SERONO GmbH TA Orale 5.455 DT [E]

8.3. - HORMONES SEXUELLES

Sont repris dans ce chapitre:

- les estrogènes
- les modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes
- les inhibiteurs de l'aromatase
- les progestatifs
- les associations estroprogestatives
- les androgènes et les antiandrogènes
- les gonadotrophines et les médicaments agissant sur leur libération et celle de la prolactine

8.3.1. - Oestrogènes

Les estrogènes naturels (estradiol, estrone et estriol) ainsi que les estrogènes conjugués obtenus par extraction d'urine de jument, subissent, après administration orale, un important effet de premier passage au niveau du foie. Ceci est évité par l'administration parentérale, par exemple par implant sous-cutané, voie transdermique ou intramusculaire; des esters à durée d'action plus longue sont utilisés pour la voie intramusculaire. L'éthinylestradiol est un dérivé synthétique qui connait une métabolisation de premier passage moins importante au niveau du foie.

Les estrogènes peuvent être utilisés comme traitement de substitution (THS) en cas de déficience en ces hormones, dans le cadre d'un hypogonadisme d'origine hypothalamique, hypophysaire ou ovarienne, après castration ou chez les femmes ménopausées. Chez les femmes non hystérectomisées, un progestatif est associé à l'estrogène dans le but de diminuer le risque d'hyperplasie et de carcinome de l'endomètre. Le progestatif doit être administré pendant au moins 12 jours consécutifs par mois, mais il peut aussi être pris en continu à une dose plus faible.

Une thérapeutique substitutive lors de la ménopause a pour but le traitement des symptômes qui accompagnent la baisse des taux d'estrogènes.

Un traitement aux estrogènes permet de lutter contre l'ostéoporose postménopausique.

La dose journalière moyenne efficace doit être la plus faible. Elle se situe aux environs de 1 à 2 mg d'estradiol ou de valérate d'estradiol, de 0,625 mg d'estrogènes conjugués par voie orale ou de 50 µg d'estradiol par voie transdermique.

Chez les femmes après la ménopause, un traitement hormonal de substitution aux estrogènes est associé à une légère diminution des taux de cholestérol total et de LDL-cholestérol et à une légère augmentation du taux de HDL-cholestérol; une augmentation du taux de triglycérides est possible.

Le THS (estrogènes + progestatif) est notamment contre-indiqué dans les situations suivantes :

- cancer du sein connu ou suspecté,
- autres tumeurs dépendantes des œstrogènes connues ou suspectées, comme par exemple un cancer de l'endomètre,

accidents thromboemboliques veineux en évolution ou d'antécédents thromboemboliques veineux récidivants ou de maladie thrombotique connue chez une patiente non encore traitée par anticoagulants.

Les estrogènes ne sont pas indiqués dans les menaces d'avortement, ni pour la suppression de la lactation.

Parmi les effets indésirables, des nausées et vomissements peuvent survenir avec les estrogènes. Une rétention hydrosaline associée à une augmentation de poids est fréquente. Une congestion douloureuse des seins est fréquente lors de la prise de doses élevées. Un traitement avec de l'éthinylestradiol à des doses contraceptives peut augmenter l'incidence des thrombo-embolies.

L'augmentation de la tension artérielle consécutive à la prise d'estrogènes est rare et souvent réversible à l'arrêt du traitement; elle n'est pratiquement jamais observée lors d'un traitement de substitution. La lithogénicité de la bile peut être augmentée. Une augmentation du volume des fibromes est possible. Spotting, dysménorrhée et syndrome prémenstruel ont été signalés de même que céphalées, vertiges, éruptions cutanées et modifications de la libido. Des traitements prolongés sans progestatif entraînent une hyperplasie de l'endomètre qui évolue parfois vers le carcinome.

Les contre-indications du traitement par estrogènes sont : la grossesse, les méno-métrorragies d'origine inconnue, les tumeurs estrogénodépendantes (carcinome de l'endomètre, carcinome mammaire), une insuffisance hépatique grave, la porphyrie, des antécédents de prurit gravidique, des antécédents thrombo-emboliques.

L'hyperplasie mammaire épithéliale atypique, les mastopathies fibrokystiques, l'endométriose, les fibromyomes, les affections cardio-vasculaires, l'hypertension, les antécédents familiaux de maladie thrombo-embolique, le diabète et l'hypertriglycéridémie constituent des contre-indications relatives.

La prudence s'impose en cas d'apparition de migraine et de troubles visuels. Le traitement sera, si c'est possible, interrompu pendant le mois qui précède une intervention chirurgicale ou en cas d'immobilisation.

A l'heure actuelle, certanes études tendent à établir que l'efficacité et les effets indésirables des estrogènes administrés par voie transdermique soient différents de ceux qui sont observés avec d'autres voies d'administration.

ESTRADIOL

- OESTRODOSE 0.06% Gel Dermique FL/80 GR/64 Doses BESINS INTERNATIONAL TC Locale 6.995 DT [E]
- OESTROGEL 0.06% Gel Dermique T/80 GR BESINS INTERNATIONAL TC Locale 4.183 DT [E]
- OROMONE 2 MG Comprimé Pelliculé B/28 SOLVAY PHARMA TC Orale 2.645 DT [E]
- OROMONE 1 MG Comprimé Pelliculé B/28 SOLVAY PHARMA TC Orale 2.703 DT [E]

8.3.2. - Modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes

Il s'agit de médicaments qui, suivant les tissus, exercent des effets agonistes, antagonistes ou neutres au niveau des récepteurs aux estrogènes. Le clomifène et le tamoxifène étaient auparavant appelés "antiestrogènes".

Le *clomisène* augmente la fréquence de la sécrétion pulsatile de GnRH (gonadoréline) au niveau de l'hypothalamus, ce qui provoque une hausse passagère de la concentration en LH et FSH. Il est utilisé pour stimuler la maturation des follicules et induire l'ovulation en cas d'anovulation d'origine hypothalamique.

Des données épidémiologiques selon lesquelles les inducteurs de l'ovulation augmentent le risque de cancer de l'ovaire ont été mises en doute. Le clomifène accroît l'incidence des grossesses multiples. Une hyperstimulation ovarienne est rare mais des kystes ovariens fonctionnels se forment assez fréquemment et imposent l'arrêt momentané du traitement. D'autres effets indésirables sont: bouffées de chaleur, diplopie, troubles visuels, céphalées. Le clomifène est contre-indiqué pendant la grossesse et en cas d'insuffisance hépatique, de kystes de l'ovaire et de troubles visuels.

Le *tamoxifène* est un agoniste des récepteurs aux estrogènes au niveau du squelette et du foie, et un antagoniste au niveau du sein; au niveau de l'endomètre, le tamoxifène est un agoniste partiel.

Le tamoxifène est souvent utilisé pendant 5 ans comme traitement palliatif dans le cancer mammaire avancé en post-ménaupause. Lors d'un usage chronique, apparaît chez certaines patientes une hyperplasie kystique de l'endomètre qui peut, bien que rarement, conduire à un carcinome. Il faut donc procéder à un examen de la cavité utérine avec prélèvement cytologique ou biopsie une fois par an; ces examens s'imposent certainement en cas de saignements. D'autres effets indésirables possibles sont: sécheresse vaginale et dyspareunie, bouffées de chaleur, troubles visuels, nausées, éruptions cutanées, hypercalcémie, hypertriglycéridémie, leucopénie et thrombopénie.

CLOMIFENE

• SERPAFAR 50 MG Comprimé Sécable B/20 FARAN TA Orale 12.008 DT [E]

TAMOXIFENE

- TAMIFEN 10 MG Comprimé Sécable B/30 MEDOCHIMIE TA Orale 13.000 DT [V]
- TAMOXIFEN 20 MG Comprimé Sécable Flacon/30 EBEWE PHARMA TA Orale 24.000 DT [V]

8.3.3. - Inhibiteurs de L'aromatase

L'anastrozol, létrozole et l'exemestane inhibent ou inactivent l'aromatase et ainsi la synthèse des estrogènes. On les utilise chez des femmes ménopausées pour le traitement de certains carcinomes mammaires résistants au tamoxifène.

ANASTROZOLE

ARIMIDEX 1 MG Comprimé Pelliculé B/30 ASTRA ZENECA TA Orale 265.905 DT [V]

LETROZOLE

• FEMARA 2.5 MG Comprimé Pelliculé B/30 NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG TA Orale 357.022 DT [E]

EXEMESTANE

• AROMASINE 25 MG Comprimé Enrobé B/30 PFIZER HOLDING FRANCE TA Orale HIVI

8.3.4. - Progestatifs

La progestérone n'est guère active par voie orale sauf sous une forme micronisée; elle peut aussi être administrée sous cette forme par voie vaginale en vue d'un effet systémique. On utilise surtout des progestatifs de synthèses dérivés de la progestérone ou de la 17α -hydroxyprogestérone, et de la testostérone, la nortestostérone et la norprogestérone.

Les progestatifs sont prescrits afin de régulariser les cycles chez des patients normo-oestrogéniques, en cas d'aménorrhée ou de saignements anovulatoires, pour prévenir l'hyperplasie de l'endomètre et, en association avec des estrogènes, dans le traitement de substitution après la ménopause. Les progestatifs en continu peuvent être indiqués pour le traitement d'affections bénignes telles l'endométriose, la mastopathie fibrokystique, les hémorragies utérines anormales et la dysménorrhée ainsi que d'affections malignes estrogénodépendantes. Leur intérêt dans le traitement de la dysménorrhée, des ménorragies et du syndrome prémenstruel est faible ou non démontré; dans ces cas, il convient de procéder à un examen clinique adéquat.

La progestérone naturelle ou un de ses dérivés (la dydrogestérone) peuvent être prescrits pour soutenir la phase lutéale, principalement en cas d'induction de l'ovulation. Des pertes sanguines pendant le premier trimestre de la grossesse (menace d'avortement) sont rarement le signe d'une carence en progestérone et ne constituent pas en soi une indication pour ce traitement. La progestérone à titre substitutif pendant les premières semaines de la grossesse n'est indiquée que s'il y a des raisons de croire à une déficience en corps jaune, comme après un traitement par les analogues de la gonadoréline ou comme de la phase lutéale en fivete.

En cas de traitement substitutif aux estrogènes après la ménopause (en continu ou de façon cyclique à raison de 21 à 25 jours par mois), l'association d'un progestatif pendant au moins 12 jours consécutifs par mois ou en continu à une dose plus faible protège partiellement contre le carcinome de l'endomètre. L'administration intermittente d'un progestatif n'est pas indiquée chez les femmes hystérectomisées.

A la posologie adéquate, la plupart des progestatifs sauf la progestérone, la médrogestone, la dydrogestérone sont des contraceptifs, mais souvent pour cette indication, ils sont utilisés en association avec des estrogènes. Une dose de 150 mg d'une forme retard de médroxyprogestérone, administrée trimestriellement, est utilisée comme contraceptif mais la durée d'action est imprévisible et des effets indésirables tels prise de poids, aménorrhée et spotting sont fréquents. La minipilule ne contient que des doses très faibles de progestatifs et doit être utilisée de façon continue dès le premier jour du cycle. De telles doses n'inhibent habituellement pas l'ovulation. Pour être efficaces, la minipilule doit être prise chaque jour à heure fixe. Les effets indésirables se limitent à des saignements intermenstruels mais l'incidence de grossesse est un peu plus élevée qu'avec les autres contraceptifs hormonaux. La minipilule est indiquée pendant la lactation ou chez les femmes pour lesquelle les contraceptifs estroprogestatifs ne sont pas indiqués.

Implanon est un implant non biodégradable contenant de l'étonogestrel destiné à un usage sous-cutané. L'étonogestrel est le métabolite biologiquement actif du désogestrel, un progestatif largement utilisé dans les contraceptifs oraux. L'effet contraceptif d'Implanon est principalement dû à une inhibition de l'ovulation. Il n'a pas été observé d'ovulation durant la 3^{ème} année. En plus de l'inhibition de l'ovulation, Implanon entraîne des modifications de la glaire cervicale, qui gêne le passage des spermatozoïdes. L'action contraceptive d'Implanon est réversible, ce qui se manifeste par un retour rapide à un cycle

menstruel normal après le retrait de l'implant après une période maximale de 3 mois. La sécurité et l'efficacité ont été établies chez les femmes entre 18 et 40 ans.

Comme contraception d'urgence ("morning after pill"), il est fait usage de la méthode "lévonorgestrel seul" qui consiste en deux prises à 12 heures d'intervalle de 0.75 mg de lévonorgestrel dans les 72 heures suivant le rapport. Au-delà des 72 heures qui suivent un rapport, mais dans les 5 jours après, la mise en place d'un dispositif intra-utérin cuivré peut constituer une alternative.

Le lévonorgestrel seul sous forme microdosée, en tant que contraceptif conventionnel nécessite une prise quotidienne sans interruption, à heure fixe, de sorte que l'intervalle entre la prise de 2 comprimés soit toujours de 24 heures.

Les progestatifs peuvent aussi être utilisés dans la mastose polykystique et les mastodynies essentielles. La progestérone est parfois administrée en application locale sous forme de gel dans des mastalgies banales.

Des doses élevées de certains progestatifs non estrogéniques sont parfois utilisées dans le traitement de cancers hormonodépendants par exemple de l'endomètre ou de la prostate.

Les effets indésirables des progestatifs sont moins prononcés que ceux des estrogènes. Peuvent survenir : modifications du métabolisme lipidique et glucidique, nausées, vomissements, diarrhée, diminution de la libido, oedème, gain pondéral, céphalées, fatigue et tendances dépressives. Avec les dérivés à composante androgénique, acné, séborrhée, alopécie et hirsutisme peuvent se manifester. L'ictère cholestatique et l'urticaire sont rares.

Les injections de formes retard ou la prise continue de progestatifs dans le but de supprimer les règles entraînent souvent des pertes de sang irrégulières (spotting) pendant le traitement et des aménorrhées plus ou moins prolongées à l'arrêt du traitement. Les progestatifs ayant conservé des propriétés androgéniques ou antiandrogéniques sont contre-indiqués pendant la grossesse. Les progestatifs à composante estrogénique sont contre-indiqués dans les cancers du sein, des ovaires ou de l'endomètre. La prudence s'impose en cas d'affections hépatiques et chez les femmes ayant des antécédents de thrombo-embolie ou d'hypertension.

DYDROGESTERONE

• DUPHASTON 10 MG Comprimé B/10 SOLVAY PHARMA TA Orale 4.524 DT [E]

PROGESTERONE

- CYCLOGEST 200 MG Suppo. B/15 ACTAVIS UK Limited TA Locale 12.115 DT (E)
- CYCLOGEST 400 MG Suppo. B/15 ACTAVIS UK Limited TA Locale 23.250 DT [E)
- PROGESTERONE RETARD PHARLON 500 MG Solution Injectable B/3/2 ML BAYER SANTE FRANCE Parentérale 8.182 DT [E]
- PROGESTOGEL 50 MG Gel Dermique T/80GR BESINS INTERNATIONAL Locale 4.615 DT [E]
- UTROGESTAN 100 MG Capsule B/30 BESINS INTERNATIONAL TA Orale 9.550 DT [E]
- UTROGESTAN 200 MG Capsule B/15 BESINS INTERNATIONAL TA Orale 10.028 DT [E]

MEGESTROL

• MEGACE 160 MG Comprimé B/30 BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale H [V]

LEVONORGESTREL

- MICROVAL 30 μG Comprimé Enrobé B/3/28 WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE TA Orale 3.734 DT [E]
- NORLEVO 1.5 MG Comprimé B/1 HRA PHARMA Orale 14.397 DT [E]

8.3.5. - Estroprogestatifs

Les associations estroprogestatives sont employées soit comme contraceptifs (et aussi dans certains troubles du cycle), soit comme traitement de substitution ou dans la périménopause.

Les effets indésirables de ces associations sont dans l'ensemble ceux des composants. Un tableau d'ictère par cholestase peut survenir, surtout chez des femmes ayant présenté un ictère ou un prurit gravidique. Les estrogènes accroissent le risque de lithiase biliaire. Les tumeurs bénignes du foie sont rares mais parfois dangereuses en raison de leur vascularisation importante pouvant être responsable d'hémorragies péritonéales. Une réduction de la tolérance glucidique peut survenir mais habituellement sans répercussion clinique. L'effet des associations estroprogestatives sur les lipides plasmatiques diffère selon les substances utilisées, la posologie et la voie d'administration. Certaines épreuves d'exploration thyroïdienne ou surrénale peuvent être perturbées. Une élévation réversible des chiffres tensionnels peut survenir; une hypertension maligne suite à une thrombose d'une artère rénale, est rare.

Les contre-indications sont l'hypertension, des antécédents de toxémie gravidique, certaines affections hépato-biliaires comme hépatite, cirrhose biliaire primitive, lithiase biliaire, des antécédents de cancer du sein ou de l'appareil génital ainsi que les prolactinomes hypophysaires non traités. Le fibromyome utérin, le diabète, les hyperlipidémies et l'épilepsie sont des contre-indications relatives.

8.3.5.1. - Associations à usage contraceptif

Ces associations sont parfois aussi utilisées pour des troubles du cycle.

Parmi les effets indésirables mineurs qui disparaissent parfois spontanément après quelques cycles, sont attribués aux estrogènes : céphalées, irritabilité, fatigue, nausées et vomissements, crampes abdominales, rétention hydrique, tension mammaire, spotting, congestion variqueuse. Sont attribués aux progestatifs : tendances dépressives, dyspareunie, diminution de libido, augmentation de poids, acné, hypoménorrhée. Des aménorrhées de plus de 6 mois après arrêt des contraceptifs sont plus fréquentes lors d'irrégularités préalables du cycle.

Lors de l'utilisation de ces associations chez la femme jeune, il y a une légère augmentation du risque, faible à cet âge, d'accident cérébro-vasculaire et d'infarctus du myocarde. L'augmentation du risque dépend de la dose (surtout de l'estrogène), de l'âge (surtout > 35 ans), de la présence de facteurs de risque cardio-vasculaire et principalement du tabagisme. Le risque de thrombophlébite est accru, quoique de façon moins importante que pendant la grossesse et le post-partum. Ce risque dépend à nouveau de l'âge, de l'obésité, de la présence de varices profondes et d'antécédents personnels ou familiaux de thrombo-embolies. Il est possible que le risque soit accru avec les les contraceptifs contenant un progestatif de la 3ème génération comme le désogestrel. Pour ce qui concerne les problèmes cardio-vasculaires, il faut considérer comme contre-indications absolues des estroprogestatifs: des antécédents d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'accident cérébro-vasculaire, de thrombose veineuse profonde et d'embolie. D'autres contre-indications sont: grossesse, saignements utérins d'origine inconnue, carcinomes hormonodépendants (du sein, de l'endomètre), certaines affections hépatobiliaires telles hépatite, cirrhose biliaire primaire, calculs biliaires. Un

prolactinome hypophysaire, le diabète, une hypertriglycéridémie, des antécédents de toxicose gravidique et l'épilepsie constituent des contre-indications relatives.

La prudence s'impose lorsque des irrégularités du cycle préexistent, dans les cas d'obésité, de mastopathie bénigne (surtout d'hyperplasie épithéliale atypique), de tabagisme, ainsi que chez les femmes présentant des varices et celles dont la fonction hépatique est perturbée. L'arrêt des contraceptifs s'impose 4 semaines avant toute intervention comportant des risques thromboemboliques et une autre méthode contraceptive sera alors utilisée; si l'interruption des contraceptifs n'a pu se faire à temps, des mesures de prévention thrombo-embolique peuvent être indiquées. Des saignements anormaux imposent la recherche d'une éventuelle cause organique, tel un adénocarcinome. Une autre méthode contraceptive doit être envisagée notamment lors d'apparition de diabète ou d'hypertension à l'instauration du traitement.

Des inducteurs enzymatiques tels les barbituriques, la carbamazépine, la griséofulvine, le phénéturide, la phénytoïne, la phénylbutazone, la primidone, la rifampicine et le ritonavir, et peut-être aussi certains antibiotiques peuvent réduire l'effet contraceptif. Des hémorragies intercurrentes ont été rapportées lors de l'utilisation concomitante de millepertuis et de l'association éthinylestradiol - désogestrel.

CYPROTERONE+ETHINYLESTRADIOL

- DIANE 35 2 MG Comprimé Enrobé B/21 BAYER SCHERING PHARMA A G TA Orale 9.396 DT [E]
- ELLEACNELLE Comprimé Drag. B/21 STRAGEN TA Orale 7.310 DT [E]
- ELLEACNELLE Comprimé Drag. B/3x21 STRAGEN TA Orale 19.420 DT [E]

CHLORMADINONE+ETHINYLESTRADIOL

• BELARA Comprimé Pell B/21 GRUNENTHAL S.A TA Orale 9.017 DT [E

LEVONORGESTREL+ETHINYLESTRADIOL

• MICROGYNON 30 μG Comprimé Dragéifié B/3/21 SCHERING AG TA Orale 2.640 DT [E]

GESTODENE+ETHINYLESTRADIOL

- HARMONRET Comprimé Enrobé B/21 PFIZER INTERNATIONAL TA Orale 9.535 DT [E]
- MINESSE Comprimé Pell B/28 (24+4) PFIZER INTERNATIONAL TA Orale 9.535 DT [E]

DROSPIRENONE+ETHINYLESTRADIOL

• JASMINE Comprimé Pelliculé B/21 BAYER SANTE TA Orale 15.295 DT [E]

8.3.5.2. - Associations à usage substitutif

Il faut attirer l'attention sur le fait que les composants de ces associations estroprogestatives à usage substitutif peuvent aussi être prescrits séparément. Lorsque le traitement a pour seul objectif de réduire les symptômes de l'hypoestrogénie comme les bouffées de chaleur ou les problèmes qui résultent de l'atrophie des muqueuses, il suffit généralement de prescrire des doses plus faibles pendant un laps de temps plus court. Chez les femmes hystérectomisées, il n'y a aucune raison d'associer un progestatif à l'estrogène, puisque cet ajout ne se justifie que pour éviter l'apparition d'une hyperplasie et d'un carcinome de l'endomètre liés à la stimulation estrogénique. Ces associations estroprogestatives, inadaptées à la contraception, peuvent être administrées par voie orale. Leur prise en continu est

souvent accompagnée de saignements intermenstruels irréguliers, surtout pendant les premiers mois de traitement et dans la ménopause récente.

ESTRADIOL+DYDROGESTRONE

- CLIMASTON 2 MG/10 MG Comprimé Pelliculé B/14+14 SOLVAY PHARMA TC Orale 9.711 DT IEI
- CLIMASTON 1 MG/10 MG Comprimé Pelliculé B/14+14 SOLVAY PHARMA TC Orale 10.164 DT [E]
- CLIMASTON 1 MG/5 MG Comprimé Pelliculé B/28 SOLVAY PHARMA TC Orale 11.823 DT [E]

8.3.6. - Androgènes et antiandrogènes

La testostérone, androgène naturel, est partiellement biotransformée lors du premier passage hépatique et dès lors, sa biodisponibilité après prise orale est faible. Elle est utilisée par voie parentérale sous forme d'esters à action prolongée. Le gel à application cutanée d'androstanolone évite le premier passage hépatique.

Des troubles hépatiques, qui vont parfois jusqu'à l'ictère cholestatique peuvent survenir. L'usage prolongé de stéroïdes androgènes paraît augmenter le risque de carcinome hépatique. L'action virilisante chez la femme et le sujet prépubertaire est fonction des préparations et de la posologie; elle peut parfois se manifester après la prise de doses très faibles. Chez l'enfant, une soudure prématurée des cartilages de conjugaison peut entraîner un arrêt de la croissance. Les autres effets indésirables sont: augmentation de la libido, atrophie testiculaire ou oligospermie, modification des lipides sanguins, rétention hydrosaline. Une érythrocytose avec risque de complications thromboemboliques peut survenir, surtout chez les personnes à risque (personnes âgées, affections pulmonaires) et en cas de doses supérieures aux doses physiologiques.

Des troubles hépatiques graves, la grossesse et le cancer de la prostate sont des contreindications à l'usage d'androgènes. La prudence s'impose si une rétention hydrosaline présente des risques. Lors d'un traitement prolongé, un contrôle régulier de la prostate s'impose.

8.3.6.1. - Androgènes

Cette préparation est indiquée comme thérapeutique de substitution dans l'hypogonadisme mâle. Son efficacité dans l'impuissance se limite aux cas de déficience androgénique. Les androgènes sont aussi utilisés dans certaines anémies aplastiques.

TESTOSTERONE

- ANDROTARDYL 250 MG Solution Injectable B/1/1 ML SCHERING FRANCE S.A TC Parentérale 12.761 DT [E]
- PANTESTONE 40 MG Capsule FL/60 ORGANON S.A TC Orale 42.058 DT [E]

8.3.6.2. - Antiandrogènes

L'acétate de cyprotérone peut inhiber différentes actions des hormones androgènes. Ses indications sont limitées à certains cas d'hypersexualité et de cancer de la prostate chez l'homme, à l'hyperandrogénisme chez la femme et à la puberté précoce idiopathique des deux sexes.

Dans l'hirsutisme marqué, après exclusion d'une tumeur androgénosécrétante, l'acétate de cyprotérone peut être prescrit en association avec de l'éthinylestradiol. L'association fixe d'acétate de cyprotérone et d'éthinylestradiol n'est indiquée que dans l'acné rebelle et l'alopécie dues à un hyperandrogénisme chez la femme, et n'est pas indiquée dans un but uniquement contraceptif. L'association d'acétate de

cyprotérone et d'estrogène ne peut être prescrite qu'après l'apparition des cycles ovulatoires réguliers et une grossesse débutante doit toujours être exclue.

Les effets indésirables de l'acétate de cyprotérone sont surtout liés à l'inhibition de l'action des androgènes: azoospermie, gynécomastie avec parfois galactorrhée, adynamie, dépression, diminution de la libido, céphalées, bouffées de chaleur.

Les contre-indications sont la **grossesse**, certaines tumeurs malignes, les affections hépatiques aiguës, le diabète difficile à contrôler, des antécédents de thrombo-embolies et une dépression grave.

Le flutamide est utilisé dans le carcinome de la prostate. Il peut donner de la gynécomastie.

Le bicalutamide est indiqué dans le cancer de la prostate métastasé ou localement avancé.

CYPROTERONE

• ANDROCUR 50 MG Comprimé Sécable B/20 BAYER SCHERING PHARMA AG TA Orale 28.103 DT [V]

FLUTAMIDE

• EULEXINE 250 MG Comprimé B/30 SCHERING-PLOUGH TA Orale H [V]

BICALUTAMIDE

• CASODEX 50 MG Comprimé Enrobé B/30 ASTRA ZENECA TA Orale H [V]

8.3.7. - Gonadotrophines et divers

8.3.7.1. - Gonadotrophines

Les gonadotrophines ou hormones gonadotropes comprennent l'hormone folliculostimulante (FSH) et l'hormone lutéinisante (LH). Ces deux glycoprotéines sont sécrétées par l'antéhypophyse dans les deux sexes. L'hormone chorionique gonadotrope (HCG) a la même activité biologique que la LH; elle est sécrétée par le placenta et les tumeurs trophoblastiques. La gonadotrophine humaine postménopausique (HMG) contient des quantités équivalentes de LH et de FSH.

Les préparations de gonadotrophines provenaient d'urines de femmes enceintes (HCG) ou de femmes ménopausées (HMG). Pour obtenir un effet LH suffisant lors de l'utilisation d'HMG, on y ajoute de l'HCG. Après élimination de la LH de l'urine de femmes ménopausées, on obtient une préparation pure de FSH, l'urofollitropine, qui est indiquée pour l'induction de l'ovulation chez des femmes qui ont trop de LH. La FSH biosynthétique, la follitropine α , est également disponible.

Les gonadotrophines peuvent être indiquées chez la femme dans les cas d'infertilité avec anovulation et chez l'homme dans les cas d'oligo-azoospermie liés à une insuffisance hypothalamo-hypophysaire. Chez l'adolescent, les gonadotrophines ne peuvent être employées que dans l'hypogonadisme d'origine hypothalamo-hypophysaire. Leur administration dans l'obésité par polyphagie est à déconseiller. Dans la cryptorchidie, l'administration de gonadotrophine chorionique est parfois tentée pour éviter une éventuelle intervention chirurgicale.

Les gonadotrophines peuvent provoquer des ovulations multiples se compliquant parfois de kystes ovariens et/ou de rupture folliculaire, et augmentent fortement le risque de grossesse multiple. Les

autres effets indésirables sont des réactions allergiques ; chez l'adolescent, une gynécomastie réversible semblable à celle de la puberté masculine peut être observée.

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE

 OVITRELLE 250 μG Poudre pour Préparation Injectable B/1 flacon+s/1 ML SERONO Pharma Schweiz TA Parentérale 22.052 DT ^[E]

FSH

- GONAL-F 75 UI Poudre pour Préparation Injectable B/1 Fl+s/1 ML SERONO PHARMA SUISSE TA Parentérale 34.386 DT [E]
- GONAL-F 450 UI /0.75 ML Solution Injectable B/1 Stylo pré-rempli/0.75ML+7 aig. MERCK SERONO INTERNATIONAL SUISSE TA Parentérale 221.525 DT [E]
- MENOPUR 75 UI Préparation Injectable B/5 FL+ 5s/l ML FERRING Parentérale TA 166.331 DT [E]

LH

• LUVERIS 75 UI PDRE.PREPARATION INJECTABLE B/1 FL+ S/1 ML SERONO Parentérale 41.429 DT [E]

8.3.7.2. - Danazol

Le danazol, dérivé de l'éthistérone, inhibe la sécrétion hypophysaire de LH et FSH. Ses indications sont l'endométriose, certaines affections non cancéreuses du sein telles la maladie fibro-kystique ou l'hyperplasie mammaire juvénile, des cas de puberté précoce iso-sexuelle d'origine centrale et l'oedème angioneurotique. La gynécomastie n'est pas une indication.

Le danazol ne peut être prescrit chez le sujet masculin. Les contre-indications sont: **grossesse**, diabète, affections thyroïdiennes, affections hépatiques aiguës ou antécédents de grossesse avec cholestase, hypertension et insuffisance rénale.

Les effets indésirables sont : éruption, nervosité, nausées, rétention hydrique, virilisme et diminution de la thyroxine plasmatique.

DANAZOL

- DANATROL 200 MG Gélule B/100 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 97.650 DT [E]
- DANATROL 200 MG Gélule B/40 SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 39.625 DT 🖪

8.3.7.3.- Hormone modulant l'action des gonadotrophines

8.3.7.3.1.- Analogues des gonadotrophines

La triptoréline et la goséréline sont des décapeptides de synthèse analogue de la GnRH naturelle entraînant la libération de gonadotrophines.

Les études conduites dans l'espèce humaine comme chez l'animal ont montré qu'après une stimulation initiale, l'administration prolongée de triptoréline entraîne une inhibition de la sécrétion gonadotrope, supprimant par conséquent les fonctions testiculaire et ovarienne. Un autre mécanisme d'action a été évoqué : effet gonadique direct par diminution de la sensibilité des récepteurs périphériques à la GnRH. La triptoréline est utilisée pour le cancer de la prostate et l'infécondité féminine.

La goséréline est indiquée dans le traitement du cancer de la prostate métastasé et la radiothérapie externe du cancer de la prostate localement avancé.

Comme les autres analogues de la LH-RH, elle est respensable d'une augmentation transitoire des douleurs osseuses en début de traitement chez certains patients, devant être traitées de façon symptomatique.

Quelques cas isolés d'obstruction des voies urinaires et de compression médullaire ont été rapportés. Des effets pharmacologiques incluant bouffées de chaleur et sueurs, et baisse de la libido pouvant nécessiter parfois l'arrêt du traitement. Rarement, gynécomastie et sensibilité mammaire ont été observées.

L'administration chronique d'acétate de goséréline entraîne une forte réduction des taux de LH hypophysaire et de la testostérone plasmatique au niveau habituellement observé chez les hommes ayant subi une castration chirurgicale ainsi qu'une diminution de la densité minérale osseuse.

TRIPTORELINE

- DECAPEPTYL LP 3 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+S/2 ML + SER + 2aiguilles BEAUFOUR IPSEN Pharma TA Parentérale H [V]
- DECAPEPTYL LP 11.25 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+S/2 ML + SER + 1 aiguille BEAUFOUR IPSEN Pharma TA Parentérale H [V]
- DECAPEPTYL SC 0.1 MG Solution Injectable B/7+S/1 ML BEAUFOUR IPSEN Pharma TA Parentérale H IVI

GOSERELINE

- ZOLADEX 3.6 MG Implant B/1 IMPLANT ASTRA ZENECA TA Parentérale H [V]
- ZOLADEX 10.8 MG Implant B/1 IMPLANT ASTRA ZENECA TA Parentérale H [V]

8.3.7.3.2.- Antagonistes des gonadotrophines

Le cétrorélix est un antagoniste du facteur de libération de l'hormone lutéinisante (LH-RH). La LH-RH se lie aux récepteurs membranaires des cellules hypophysaires. Le cétrorélix entre en compétition avec la LH-RH endogène au niveau de ses récepteurs. Grâce à ce mode d'action, le cétrorélix contrôle la sécrétion des gonadotrophines (LH et FSH). Il inhibe de façon dose-dépendante la sécrétion de la LH et de la FSH par l'hypophyse. La suppression se produit pratiquement immédiatement et se maintient pendant la poursuite du traitement, sans effet stimulant initial. Chez la femme, le cétrorélix retarde le pic de LH et par conséquent l'ovulation.

Il est indiqué dans la prévention de l'ovulation prématurée chez les patientes incluses dans un protocole de stimulation ovarienne contrôlée, suivie de prélèvement d'ovocytes et de techniques de reproduction assistée. Dans les études cliniques, Cetrotide a été associé à la gonadotrophine de femme ménopausée (HMG). Cependant, l'expérience plus réduite acquise avec la FSH recombinante suggère une efficacité équivalente.

CETRORELIX

- CETROTIDE 3 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+SER/3 ML SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentérale 188.771 DT [E]
- CETROTIDE 0.25 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+SER/1 ML SERONO EUROPE LIMITED UK TA Parentérale 55.155 DT [E]

8.4. - MEDICAMENTS ANTIDIABETIQUES

Ce chapitre reprend les préparations qui sont utilisées dans le traitement du diabète sucré:

- l'insuline
- les sulfamidés hypoglycémiants
- les biguanides
- les inhibiteurs des α-glucosidases.

Dans de nombreux cas de diabète de type 2 (non insulinodépendant), un régime adéquat, une activité physique satisfaisante et une éventuelle perte de poids permettent d'obtenir un bon contrôle de la glycémie. Chez les malades non-obèses et sans carence insulinique absolue, la prescription de sulfamidés hypoglycémiants est justifiée après échec des mesures diététiques adéquates. Les biguanides sont réservés en principe aux patients adultes obèses non insulinodépendants. Chez les patients atteints d'un diabète de type 1, l'insulinothérapie s'impose. L'insuline et les hypoglycémiants oraux sont parfois associés. Un inhibiteur des α-glucosidases peut être ajouté aux autres antidiabétiques.

Un contrôle rigoureux de la glycémie diminue le risque de néphropathie, de rétinopathie et de neuropathie aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2.

L'insuline et les sulfamidés hypoglycémiants peuvent entraîner une hypoglycémie lorsque des doses trop élevées sont employées, lors d'un apport glucidique insuffisant, ou lors d'un effort physique inhabituel. L'hypoglycémie due aux médicaments antidiabétiques peut être favorisée par l'utilisation concomitante de β-bloquants et peut-être d'IECA. De plus, les β-bloquants diminuent les symptômes subjectifs de l'hypoglycémie et rendent ainsi son diagnostic plus difficile. D'autres médicaments augmentent le risque d'hypoglycémie due aux sulfamidés hypoglycémiants. La répétition de malaises hypoglycémiques, et surtout le coma hypoglycémique, peuvent être responsables de complications cardio-vasculaires et neurologiques graves.

8.4.1. – Insulines et analogues

L'insulinothérapie est sans nul doute indiquée dans le diabète de type 1. Elle est également indiquée en cas de diabète de type 2 après échec d'autres moyens thérapeutiques, lors d'infections graves, dans des conditions de stress tels les traumatismes, les interventions chirurgicales, lors de la grossesse ainsi qu'en cas de coma acido-cétosique; dans les complications dégénératives (rétinopathies hémorragiques, neuropathies et néphropathies), l'insulinothérapie peut être indiquée si un bon contrôle de la glycémie ne peut être obtenu par d'autres moyens.

Les effets indésirables de l'insuline sont métaboliques, immunologiques et locaux. Les hypoglycémies insuliniques doivent être évitées dans la mesure du possible notamment par une information appropriée du malade. Lors du traitement de l'acido-cétose par de l'insuline, on doit s'attendre à une hypokaliémie. L'insulinothérapie peut entraîner la formation d'anticorps circulants qui neutralisent une partie de l'insuline injectée. Des réactions allergiques cutanées de type hypersensibilité retardée peuvent survenir au début du traitement mais persistent rarement. Des lipodystrophies se développent parfois aux points d'injection surtout si la technique d'injection est inadéquate: non seulement elles sont inesthétiques mais elles peuvent contrecarrer la résorption de l'insuline.

En Tunisie, les préparations d'insuline contiennent 100 U.I. d'insuline par ML. Elles se présentent sous forme de flacons à utiliser avec une seringue. Les préparations disponibles diffèrent aussi quant à leur pureté, leur pH et leur durée d'action. Cette dernière est prolongée en recourant tantôt à des artifices de cristallisation, tantôt à l'adjonction de zinc ou à la fixation sur une protéine telle la protamine. Ces

préparations sont classées en fonction de la rapidité et de la durée d'action. La durée d'action varie aussi selon l'état de la fonction rénale, les modalités d'injection et l'activité musculaire du membre dans lequel l'injection est pratiquée.

Lorsqu'il s'agit d'une suspension, il faut s'assurer que la préparation est homogène au moment où on extrait une quantité d'insuline.

Le choix de la préparation, la quantité d'insuline à injecter et la fréquence des injections doivent être déterminés individuellement et dépendent de nombreux facteurs tels la gravité du diabète, le poids corporel, le régime alimentaire, l'activité physique, la présence d'une autre affection ou une grossesse.

Les doses seront adaptées, si possible, sur base des résultats d'un contrôle glycémique.

8.4.1.1. - Insulines à action rapide

Ce sont des solutions limpides d'insuline cristallisée à faible teneur en zinc et dépourvue de protamine. Elles peuvent être injectées par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse.

Lors d'injection sous-cutanée, l'effet hypoglycémiant commence après environ 15 minutes, est maximal après 1 à 3 heures et persiste pendant environ 6 à 8 heures. Pour rééquilibrer un diabète gravement décompensé, une injection toutes les 6 heures est nécessaire.

La durée d'action après injection intraveineuse est d'environ 1 heure; cette voie est surtout utilisée dans l'acido-cétose et à titre diagnostique.

INSULINE HUMAINE

- INSULINE ACTRAPID HM 100 UI/ML Solution Injectable FL/10 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 3.968 DT [V]
- INSULINE HUMAINE INSULINE ACTRAPID HM PENFILL 100 UI/ML Suspension Injectable B/5/3 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 43.266 DT [V]
- NOVORAPID FLEXPEN 100 UI/ML Solution Injectable B/5 stylos /3ml NOVO NORDISK TC 80.726 DT [V]

8.4.1.2. - Insulines à durée d'action intermédiaire

Il s'agit de suspensions d'insuline à pH neutre. Ces préparations ne peuvent pas être administrées par voie intraveineuse. L'action hypoglycémiante de ces insulines se manifeste 1 à 2 heures après l'injection sous-cutanée et persiste pendant 10 à 18 heures.

Elles sont habituellement utilisées en association avec une insuline à action rapide pour couvrir la période qui suit l'injection; l'injection doit se faire dans les 5 minutes après le mélange.

INSULINE HUMAINE

- INSULATARD HM NPH 100 UI/ML Suspension Injectable FL/10 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 3.968 DT IVI
- INSULINE INSULATARD HM NPH PENFILL 100 UI/ML Suspension Injectable B/5/3 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 43.266 DT [V]
- INSULINE MIXTARD 30 HM 100 UI/ML Suspension Injectable FL/10 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 3.968 DT [V]
- INSULINE MIXTARD 30 HM PENFILL 100 UI/ML Suspension Injectable B/5/3 ML NOVO NORDISK TC Parentérale 43.266 DT [V]

8.4.1.3. - Insulines à durée d'action prolongée

L'insuline glargine est un analogue de l'insuline à durée d'action prolongée. Elle doit être administrée une fois par jour à n'importe quel moment de la journée mais au même moment chaque jour. Des études de clamp euglycémique menées sur chez des sujets sains et des patients atteints de diabète de type 1 ont montré que l'effet de l'insuline glargine sous-cutanée apparaissait plus lentement que celui de l'insuline NPH humaine (suspension d'insuline isophane), que cet effet était régulier, sans pics, et que sa durée d'action était prolongée. Cet effet plus prolongé de l'insuline glargine est directement lié au fait que la résorption de cette insuline est plus lente En conséquence, une seule administration par jour suffit.

INSULINE GLARGINE

- LANTUS 100 UI/ML Solution Injectable B/5 Cartouches/3ml SANOFI-AVENTIS PHARMA Deutschland GmbH TC Parentérale 137.392 DT [V]
- LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML Solution Injectable B/5 Stylos préremplis SANOFI-AVENTIS PHARMA Deutschland GmbH TC Parentérale 144.519 DT [V]

INSULINE GLULISINE

 APIDRA SOLOSTAR 100 UI/ML Solution Injectable B/5 Stylos préremplis SANOFI-AVENTIS PHARMA Deutschland GmbH TC Parentérale 88.229 DT [V]

INSULINE DETEMIR

 LEVEMIR FLEXPEN 100 UI/ML Solution Injectable B/ 5 Stylos injecteurs/3 ML NOVO NORDISK TC Parenterale 148.026 DT IVI

INSULINE ASPARTE

 NOVOMIX 30 EXPEN 100 UI/ML Solution Injectable B/ 5 Stylos injecteurs/3 ML NOVO NORDISK TC Parenterale 79.829 DT IVI

8.4.1.4. - Associations

Il s'agit d'associations en proportion fixe d'une insuline à action rapide en solution et d'une insuline à durée d'action intermédiaire en suspension, permettant d'obtenir un début d'action rapide et un effet prolongé. Ces préparations ne peuvent pas être administrées par voie intraveineuse. Pour certains diabétiques, une seule injection journalière suffit mais le plus souvent deux voire trois injections quotidiennes seront nécessaires. L'action hypoglycémiante de la plupart de ces insulines à action intermédiaire commence 30 minutes environ après l'injection sous-cutanée et persiste pendant 10 à 16 heures.

8.4.2. - Sulfamidés hypoglycémiants

Les sulfamidés exercent essentiellement leur action hypoglycémiante en stimulant la sécrétion insulinique résiduelle. Les sulfamidés hypoglycémiants peuvent être essayés en cas d'échec des mesures diététiques chez des patients atteints d'un diabète de type 2, surtout s'ils ne sont pas obèses. Il est généralement conseillé d'absorber ces médicaments 20 à 30 minutes avant le repas pour améliorer la réponse précoce de l'insulinosécrétion et mieux contrôler l'hyperglycémie postprandiale.

Il est impérieux de commencer par des doses faibles, surtout chez le patient âgé, et d'augmenter progressivement celles-ci si l'équilibre glucidique n'est pas atteint en une à deux semaines. Quand, après

le premier mois de traitement, les résultats ne sont pas satisfaisants, on associera souvent un hypoglycémiant oral d'une autre classe ou on passera à l'insuline.

Les sulfamidés hypoglycémiants sont contre-indiqués dans le diabète de type 1 et, en cas de diabète de type 2 fortement déséquilibré, au cours de la grossesse, pendant une maladie infectieuse ou lors d'une intervention chirurgicale.

En cas d'insuffisance rénale, certains de ces produits peuvent s'accumuler dans l'organisme avec danger d'accident hypoglycémique. L'hypoglycémie survient surtout chez les malades âgés ou ayant une fonction rénale déficiente, et peut entraı̂ner des lésions cérébrales irréversibles. Une intoxication alcoolique favorise l'hypoglycémie. Les sulfamidés antibactériens, les β -bloquants, les antiinflammatoires non stéroïdiens, l'acide acétylsalicylique et les coumariniques peuvent renforcer l'effet hypoglycémiant.

Les effets indésirables d'ordre digestif sont généralement mineurs. Les problèmes muco-cutanés sont les mêmes que ceux que l'on rencontre avec les sulfamidés antibactériens; une allergie croisée existe. Une photosensibilisation a été rapportée. Les atteintes hépatiques (ictère cholestatique) et sanguines (thrombopénie, leucopénie, agranulocytose) sont rares.

GLIBENCLAMIDE

- DAONIL 5 MG Comprimé Sécable B/100 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 15.515 DT [E]
- DAONIL 5 MG Comprimé Sécable B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 3.605 DT [E]
- DIABENYL 5 MG Comprimé Sécable B/100 DAR ESSAYDALI TA Orale 8.862 DT [E]
- DIABENYL 5 MG Comprimé Sécable B/20 DAR ESSAYDALI TA Orale 2.049 DT [E]
- GLIBENCLAMIDE 2.5 MG Comprimé B/60 SIPHAT TA Orale 1.615 DT [E]
- GLIBENCLAMIDE 5 MG Comprimé Sécable B/60 SIPHAT TA Orale 2.430 DT [E]
- HEMI-DAONIL 2.5 MG Comprimé Sécable B/60 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 6.230 DT [E]
- MI-DIABENIL 2.5 MG Comprimé B/60 DAR ESSAYDALI TA Orale 3.560 DT [E]

GLICLAZIDE

- DIABENORM 80 MG Comprimé Sécables B/20 DAR ESSAYDALI TA Orale 3.225 DT [E]
- DIABENORM 80 MG Comprimé Sécables B/60 DAR ESSAYDALI TA Orale 8.920 DT [E]
- DIAMEZID 30 MG Comprimé Pelliculé à Libération Modifiée B/30 OPALIA PHARMA TA Orale 7.985 DT [E]
- DIAMICRON LM 30 MG Comprimé à Libération Modifiée B/30 SAIPH TA Orale 11.130 DT [E]

GLIMEPIRIDE

- AMAREL 1 MG Comprimé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 10.635 DT [E]
- AMAREL 2 MG Comprimé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 16.335 DT [E]
- AMAREL 3 MG Comprimé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 19.030 DT [E]
- AMAREL 4 MG Comprimé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 21.970 DT [E]
- AMAREL 6 MG Comprimé B/30 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 24.165 DT [E]
- DIABIREL 1 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 6.200 DT [E]
- DIABIREL 2 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 10.200 DT [E]
- DIABIREL 3 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 12.500 DT [E]
- DIABIREL 4 MG Comprimé Sécable B/30 IBN AL BAYTAR TA Orale 14.300 DT [E]
- GLIMEPIRIDE WINTHROP 1 MG Comprimé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 6.000 DT [E]
- GLIMEPIRIDE WINTHROP 2 MG Comprimé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 10.000 DT [E]
- GLIMEPIRIDE WINTHROP 3 MG Comprimé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 12.000 DT I^{EI}
- GLIMEPIRIDE WINTHROP 4 MG Comprimé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 14.000 DT [E]

- GLIMEREL 2 MG Comprimé Sécable B/30 SIPHAT TA Orale 10.000 DT [E]
- GLIMID 1 MG Comprimé B/30 ADWYA TA Orale 6.800 DT [E]
- GLIMID 2 MG Comprimé B/30 ADWYA TA Orale 10.700 DT [E]
- GLIMID 3 MG Comprimé B/30 ADWYA TA Orale 12.600 DT [E]
- GLIMID 4 MG Comprimé B/30 ADWYA TA Orale 14.600 DT [E]
- GLIMID 6 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TA Orale 17.000 DT [E]
- GLITRA 1 MG Comprimé B/30 SAIPH TA Orale 6.583 DT [E]
- GLITRA 2 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 10.765 DT [E]
- GLITRA 3 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 13.970 DT [E]
- GLITRA 4 MG Comprimé Sécable B/30 SAIPH TA Orale 16.000 DT [E]
- IRYS 1 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 6.000 DT EI
- IRYS 1 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 10.600 DT [E]
- IRYS 2 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 9.980 DT [E]
- IRYS 2 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 18.400 DT [E]
- IRYS 3 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 12.000 DT [E]
- IRYS 3 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 21.500 DT [E]
- IRYS 4 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/30 MEDIS TA Orale 14.000 DT [E]
- IRYS 4 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/60 MEDIS TA Orale 25.400 DT [E]
- MONOREL 1 MG Comprimé Sécable B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 6.585 DT [E]
- MONOREL 2 MG Comprimé Sécable B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 10.765 DT [E]
- MONOREL 3 MG Comprimé Sécable B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 13.970 DT [E]
- MONOREL 4 MG Comprimé Sécable B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 16.030 DT [E]

GLIPIZIDE

• SUCRAZIDE 5 MG Comprimé Sécable B/30 DAR ALDAWA TA Orale 2.039 DT [E]

GLIQUIDONE

• GLURENOR 30 MG Comprimé Enrobé B/40 GUIDOTTI TA Orale 5.613 DT_[E]

8.4.3. - Biguanides

La metformine ne peut abaisser la glycémie en dessous des taux normaux sauf en cas de restriction calorique importante. En effet, elle ne stimule pas la sécrétion insulinique endogène mais favorise plutôt l'action de l'insuline. Contrairement à l'insuline et aux sulfamidés, la metformine freine le gain pondéral. Son indication principale est le diabète de type 2 de l'individu obèse sans carence insulinique absolue et chez qui un régime diététique s'avère insuffisant. Son association à des sulfamidés hypoglycémiants peut être tentée chez les diabétiques mal équilibrés par l'un ou l'autre de ces médicaments et avant un passage à l'insuline. La metformine est aussi parfois associée à une insulinothérapie.

L'acidose lactique est une complication rare, mais souvent fatale. Elle survient surtout avec des posologies élevées, chez des malades âgés ou atteints d'insuffisance rénale; il faut être attentif en cas d'utilisation concomitante d'AINS. Parmi les effets indésirables, on relève: anorexie, nausées, diarrhée ou vomissements; la prise du médicament pendant le repas améliorerait la tolérance gastro-intestinale. Lors d'un traitement prolongé, une déficience en vitamine B₁₂ et en acide folique peut survenir.

La metformine est contre-indiquée au cours de la grossesse, chez les éthyliques, les malades atteints d'insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique, en cas d'infection ou d'intervention chirurgicale et durant les 48 heures précédant un examen radiographique nécessitant l'injection de produits de contraste iodés.

METFORMINE

- DIAFORMINE 850 MG Comprimé Pelliculé B/30 DAR ESSAYDALI TA Orale 2.200 DT [E]
- FORMIDIAB 850 MG Comprimé Pelliculé B/60 SIPHAT TA Orale 3.800 DT [E]
- GLUCOPHAGE 850 MG Comprimé Enrobé B/60 ADWYA TA Orale 5.480 DT [E]
- GLUCOPHAGE 1000 MG Comprimé Pelliculé B/60 ADWYA TA Orale 6.420 DT [E]
- METFORAL 850 MG Comprimé Enrobé B/30 SAIPH TA Orale 2.380 DT [E]
- METFORMINE WINTHROP 1000 MG Comprimé Pelliculé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 2.570 DT [E]
- METFORMINE WINTHROP 850 MG Comprimé Pelliculé B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 2.000 DT [E]

8.4.4. – Associations:

GLIMEPIRIDE+METFORMINE

- AMARYL M 2 MG/500MG Comprimé Pelliculé B/30 HANDOK TA Orale 15.695 DT [E]
- GLUCOVANCE 500 MG/5MG Comprimé Pelliculé B/30 MERCK SANTE TA Orale 7.565 DT [E]

8.4.5. - Inhibiteurs des alpha-glucosidases

L'inhibition des alpha-glucosidases par *l'acarbose* au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle ralentit la résorption des hydrates de carbone, ce qui provoque une diminution de l'hyperglycémie postprandiale. L'acarbose est surtout indiqué dans le diabète de type 2; il est parfois utilisé dans le diabète de type 1 en association à l'insuline, ou pour le traitement des hypoglycémies réactionnelles. Les effets indésirables sont surtout des troubles gastro-intestinaux avec diarrhée, flatulence, douleurs abdominales, météorisme.

ACARBOSE

- GLUCOR 100 MG Comprimé B/90 BAYER FRANCE TA Orale 32.579 DT E
- GLUCOR 50 MG Comprimé B/90 BAYER FRANCE TA Orale 23.930 DT [E]

8.4.6. - Autres antidiabétiques

Le répaglinide est un nouvel insulinosécrétagogue oral à action rapide. Le répaglinide abaisse fortement la glycémie en stimulant la sécrétion d'insuline par le pancréas, un effet qui dépend du bon fonctionnement des cellules ß des îlots pancréatiques.

Le répaglidine est indiqué en monothérapie ou en association avec la metformine dans le traitement du diabète de type 2.

La pioglitazone est indiquée en monothérapie ou en association orale avec la métformine ou un sulfamide hypoglycémiant dans le traitement du patient diabétique de type 2. Elle agit probablement par l'intermédiaire de la réduction de l'insulinorésistance.

REPAGLINIDE

- NOVONORM 1 MG Comprimé B/30 NOVO NORDISK TA Orale 13.671 DT [E]
- NOVONORM 0.5 MG Comprimé B/30 NOVO NORDISK TA Orale 11.877 DT [E]
- NOVONORM 2 MG Comprimé B/30 NOVO NORDISK TA Orale 16.576 DT [E]

8.4.7. - Médicaments de l'hypoglycemie

GLUCAGON

- GLUCAGEN 1 MG/1UI Poudre pour Préparation Injectable B/10 Fl de lyoph.+10 FL de sol NOVO NORDISK TA Parentérale (le flacon) [V]
- GLUCAGEN HYPOKIT 1MG Poudre pour Préparation Injectable FL+Ser/1 ML NOVO NORDISK TA Parentérale [V]

8.5. - AUTRES MEDICAMENTS DU SYSTEME HORMONAL

8.5.1. - Erythropoïétine et analogue

L'érythropoïétine biosynthétique (r-HuEPO) est identique à l'érythropoïétine humaine. Elle est utilisée dans le traitement de l'anémie due à l'insuffisance rénale chronique.

Hypertension et thrombose sont possibles.

En raison de sa plus grande teneur glucidique, la darbepoetin alfa a une demi-vie terminale plus longue que celle de la r-HuEPO et, par conséquent, une plus grande activité in vivo.

De rares cas de réactions allergiques potentiellement graves comprenant dyspnée, rash cutané et urticaire ont été rapportés avec la darbepoetin alfa.

ERYTHROPOIETINE HUMAINE

HEMAX 2000 UI Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/2 ML BIO SIDUS S.A TA Parentérale H IEI

8.5.2. - Hormones hypophysaires et hypothalamiques

L'hormone adrénocorticotrope est reprise au chapitre Hormones cortico-surrénales et hormone corticotrope et les gonadotrophines et l'oxytocine au chapitre Hormones sexuelles.

8.5.2.1. - Hormone antidiurétique

La desmopressine est utilisée en cas d'insuffisance en hormone antidiurétique (ADH ou vasopressine). Elle s'utilise occasionnellement dans l'énurésie nocturne chez les enfants de plus de 7-8 ans après exclusion de toute atteinte organique et en prenant en considération les effets indésirables potentiels graves (par ex. hyponatrémie grave avec convulsions). La desmopressine possède également des propriétés hémostatiques.

Contrairement à la vasopressine, la desmopressine n'exerce pratiquement plus d'action hypertensive et est quasi dépourvue de risques allergiques. Toutefois, une certaine vasoconstriction peut se manifester et la prudence s'impose de ce fait en cas d'hypertension grave, de grossesse et de troubles coronariens. Un surdosage peut provoquer une hémodilution et une hyponatrémie.

DESMOPRESSINE

- MINIRIN 4 μG Solution Injectable B/10/1 ML FERRING S.A.S TC Parentérale H [E]
- MINIRIN 10 μG Spray Nasal FL/2.5 ML FERRING S.A.S TC Locale 31.987 DT [E]
- MINIRIN 0.1 MG Solution pour Administration Endonasale FL/2.5 ML FERRING S.A.S TC Locale [E]
- MINIRIN 0.2 MG comp.b/15 FERRING S.A.S TC 41.799DT [E]
- MINIRINMELT 60 μg Lyophilisat Or. B/30 FERRING S.A.S TC 43.200 DT [E]

8.5.2.2. - Hormone de croissance

L'hormone de croissance ou somatropine est utilisée en cas de retard de croissance, dû à une sécrétion déficiente ou à un syndrome de Turner. Elle est aussi proposée chez des adultes souffrant d'un déficit important en cette hormone. Des oedèmes, des douleurs articulaires et une augmentation de la glycémie ont été observés, surtout avec des doses élevées.

SOMATROPINE

- GENOTONORM 1.3MG (4 UI) Poudre pour Préparation Injectable FL+S/1 ML PFIZER S.A Belgique TA Parentérale H ^[E]
- HHT 4 UI Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+S/1 ML BIO SIDUS TA Parentérale H [E]

8.5.2.3. - Somatostatine et analogues

La somatostatine est un tetradécapeptide employé dans le traitement de fistules du pancréas et de l'intestin et dans celui des hypersécrétions occasionnées par des tumeurs endocrines du tractus gastro-intestinal. En inhibant les sécrétions des îlots de Langerhans, elle peut provoquer une diminution de la glycémie avec ensuite une hyperglycémie.

L'octréotide est un polypeptide synthétique ayant des effets similaires à ceux de la somatostatine. Il est indiqué pour le traitement des tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques et de l'acromégalie.

Ce médicament a de nombreux effets indésirables et son emploi exige une supervision toute particulière.

OCTREOTIDE

- SANDOSTATINE 50 μG Solution Injectable B/6/1ML NOVARTIS PHARMA S.A TA Parentérale H [E]
- SANDOSTATINE 100 μG Solution Injectable B/6/1ML NOVARTIS PHARMA S.A TA Parentérale H [E]

9. - ANTI-INFECTIEUX

Les groupes suivants sont repris:

- o antibactériens
- o antimycosiques
- o antiparasitaires
- o antiviraux.

Les antiseptiques intestinaux ont été repris avec les Médicaments agissant sur le système gastro-intestinal.

9.1. - ANTIBACTERIENS

Dans bon nombre de maladies infectieuses d'origine bactérienne, la chimiothérapie antibactérienne est indiquée. Toutefois, il faut éviter d'instaurer systématiquement un tel traitement à la moindre suspicion d'infection, p.ex. lorsqu'il s'agit d'atteintes du système respiratoire, telles que des pharyngites et trachéobronchites, qui sont souvent causées par des virus et régressent le plus souvent spontanément. En effet, la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques existants est inquiétante, en raison de l'utilisation irrationnelle des antibiotiques.

Un traitement prophylactique avec des antibiotiques ne se justifie pas, à quelques exceptions près: lors de certaines interventions chirurgicales, dans la prophylaxie de l'endocardite bactérienne chez les malades à risque (par exemple lors d'interventions dentaires), et en cas de contact avec des patients atteints d'une méningite à méningocoque.

En pratique, pour le choix de l'agent antibactérien, on ne peut que rarement s'appuyer sur l'identification du germe causal et sur l'antibiogramme. En l'absence de ces données, c'est une erreur d'utiliser une substance à spectre aussi large que possible ou une association d'agents antiinfectieux. Il convient au contraire de donner la préférence à un antibiotique à spectre étroit et d'éviter les associations sauf si l'association permet de contrecarrer l'apparition d'une résistance, par exemple dans les infections à mycobactéries ou à H.pylori.

L'ajustement individuel de la posologie des médicaments antibactériens s'impose dans certains cas. Des doses plus élevées peuvent être nécessaires lorsqu'il s'agit d'infections au niveau d'organes difficilement accessibles ou causées par des germes moins sensibles. Dans les infections des voies urinaires inférieures, à l'exception des prostatites, les doses seront par contre moins élevées. Les doses à administrer aux enfants seront réduites sans qu'il soit cependant possible de dégager des règles générales; c'est pourquoi la posologie infantile sera aussi mentionnée lorsque des préparations à usage pédiatrique existent. En cas d'insuffisance rénale, il est indispensable d'adapter la posologie des agents antibactériens qui sont éliminés par cette voie. Cet ajustement est particulièrement important lorsque les doses thérapeutiques et toxiques sont très proches, par exemple pour les aminosides.

CLASSIFICATION DES MICROORGANISMES RENCONTRES EN PATHOLOGIE HUMAINE

Cocci Gram+

- o <u>Staphylococcus aureus</u> (producteur de β-lactamase ou non-producteur de β-lactamase)
- o <u>Staphylococcus epidermidis</u>
- o Staphylococcus saprophyticus
- o <u>Streptococcus pyogenes</u> (groupe A, β-hémolytique) et groupes C et G

- <u>Streptococcus groupe B</u>
- o <u>Streptococccus</u> (groupe viridans)
- o <u>Streptococcus bovis</u> (groupe D)
- o <u>Peptostreptococcus</u> (streptocoque anaérobie)
- o <u>Streptococcus pneumoniae</u> (pneumocoque)
- o <u>Enterococcus species</u>

Cocci Gram-

- o <u>Neisseria gonorrhoeae</u> (gonocoque)
- o Neisseria meningitidis (méningocoque)
- o Moraxella catarrhalis

Bacilles Gram+

- o Aérobie
 - o Bacillus anthracis
 - o <u>Corynebacterium diphtheriae</u>
 - o <u>Listeria monocytogenes</u>
- Anaérobie
 - o <u>Clostridium difficile</u> (colite pseudomembraneuse)
 - o <u>Clostridium perfringens</u> (welchii)
 - o <u>Clostridium tetani</u>

Bacilles Gram-

- Entérobactéries
 - o <u>Citrobacter</u>
 - o <u>Enterobacter</u>
 - o <u>Escherichia coli</u>
 - o <u>Helicobacter pylori</u>
 - o <u>Klebsiella pneumoniae</u>
 - o Proteus mirabilis (indole négatif)
 - <u>Proteus</u> indole positif, y compris <u>Providencia rettgeri, Morganella morganii, Proteus vulgaris et</u> <u>Providencia stuartii</u>
 - o Salmonella typhi
 - o <u>Autres salmonellae</u>
 - o <u>Serratia</u>
 - o <u>Shigella</u>
 - o <u>Yersinia enterocolitica</u>
- Autres bacilles Gram
 - o <u>Acinetobacter</u>
 - o <u>Bacteroides fragilis</u> et <u>non-fragilis</u>
 - o <u>Bordetella pertussis</u> (coqueluche)
 - o <u>Brucella</u> (brucellose)
 - o <u>Calymmatobacterium granulomatis</u>
 - o <u>Campylobacter jejuni</u>
 - o Francisella tularensis (tularémie)
 - o <u>Fusobactéries</u>
 - o Gardnerella vaginalis
 - o <u>Haemophilus ducreyi</u> (chancre mou)

- o <u>Haemophilus influenzae</u>
- o <u>Legionella pneumophila</u>
- o Leptotrichia buccalis (angine de Vincent)
- o <u>Prevotella</u>
- o <u>Porphyromonas</u>
- o <u>Pseudomonas aeruginosa</u>
- o <u>Vibrio cholerae</u>

Bacilles acido-résistants

- o Mycobacterium tuberculosis
- o Mycobacteries atypiques
- o <u>Mycobacterium leprae</u>

Actinomycètes

- o <u>Actinomyces israeli</u>
- o <u>Nocardia asteroides</u>

Chlamydia

- o Chlamydia pneumoniae
- o Chlamydia psittaci (psittacosis, ornithosis)
- o Chlamydia trachomatis

Champignons et levures

- 0 <u>Aspergillus</u>
- o <u>Blastomyces dermatidis</u>
- o Candida albicans (monilia)
- o <u>Coccidioides</u>
- o <u>Cryptococcus neoformans</u>
- o <u>Dermatophytes (tinea)</u>
- o <u>Histoplasma capsulatum</u>
- o <u>Mucorales</u>
- o <u>Sporotrichum</u>
- o <u>Torulopsis</u>

Mycoplasmes

- o Mycoplasma hominis
- o Mycoplasma pneumoniae
- o <u>Ureaplasma urealyticum</u>

Spirochètes

- o <u>Borrelia burgdorferi</u> (mal. de Lyme)
- o <u>Borrelia recurrentis</u> (fièvre récurrente)
- o <u>Leptospira</u>
- o <u>Treponema pallidum</u> (syphilis)

Les effets indésirables propres à chaque antibactérien ou à certains groupes d'antibactériens sont mentionnés aux rubriques respectives. En général, toutes ces substances sont susceptibles de provoquer une modification de la flore saprophyte; des infections mycosiques peuvent aussi survenir. Toutefois, pour certains antibactériens, les effets indésirables gastro-intestinaux ne peuvent pas être attribués seulement au développement exagéré de certains germes.

9.1.1. - Antibiotiques bêta-lactamines

9.1.1.1. - Pénicillines

Les pénicillines possèdent, tout comme les céphalosporines, un cycle β -lactame. Elles sont relativement atoxiques mais peuvent cependant provoquer des manifestations allergiques (y compris un choc anaphylactique), de la diarrhée et faciliter une infection à candida. 10 à 20% des patients présentant une hypersensibilité à la pénicilline sont aussi allergiques aux céphalosporines.

Les pénicillines sont acidosensibles ou acidorésistantes, ce qui influence leur degré de résorption lors de prise orale. La prise d'aliments diminue la biodisponibilité des pénicillines non estérifiées et de l'oxacilline. Les pénicillines sont principalement éliminées par voie rénale, en partie par sécrétion tubulaire active.

Les différentes pénicillines semi-synthétiques possèdent en général le spectre antimicrobien de la pénicilline naturelle; les pénicillines sont soit sensibles, soit résistantes aux β -lactamases. Les amino-, carboxy-, amidino- et acyluréidopénicillines ont un spectre plus large.

Dans de nombreuses infections, les pénicillines restent les antibiotiques de premier choix.

9.1.1.1.1. - Pénicillines sensibles aux bêta-lactamases

Ce groupe comprend la pénicilline G et la pénicilline V. Ces pénicillines sont très actives sur les streptocoques, à l'exception de certaines souches de *Streptococcus pneumoniae* devenues résistantes et du *Streptococcus faecalis* (entérocoque) vis-à-vis duquel elles n'ont qu'une action bactériostatique, sur certains staphylocoques non-producteurs de β-lactamases, sur les bacilles Gram+, les clostridies, les spirochètes tel le *Treponema pallidum*, les *Neisseria* tels que les méningocoques et certaines souches de gonocoques, et *l'Actinomyces israeli*. Elles ne sont que modérément actives sur l'*Haemophilus influenzae*. Elles ne sont pas actives sur le *Bacteroides fragilis*.

La résistance que manifestent notamment diverses souches de staphylocoques est le plus souvent liée à la production d'une β -lactamase (pénicillinase) qui ouvre le cycle β -lactame, et fait ainsi disparaître l'activité antibactérienne.

La pénicilline G ou benzylpénicilline est utilisée uniquement par voie parentérale car elle est détruite dans l'estomac. Elle est rapidement éliminée. Toutefois, il existe une préparation injectable par voie intramusculaire dont la résorption est lente et s'étale sur 2 à 4 semaines (benzathine benzylpénicilline); cette préparation n'est que rarement utilisée.

La pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) est une pénicilline acidorésistante. Elle peut être donnée par voie orale mais sa résorption est incomplète. Elle est surtout utile dans des infections pharyngées à streptocoques β -hémolytiques du groupe A.

BENZATHINE BENZYLPENICILLINE

- EXTENCILLINE 2.400 MU Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/8 ML AVENTIS TA Parentérale 2.643 DT [E]
- TARDIPEN 0.6 MUI Poudre pour Préparation Injectable B/1fl +S/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.250 DT [E]
- TARDIPEN 1.2 MUI Poudre pour Préparation Injectable B/1fl +S/4 ML UNIMED TA Parentérale 1.390 DT [E]

BENZYLPENICILLINE

- PENICILLINE G SODIQUE 5 MUI Poudre pour Préparation Injectable B/50 Flacons sans solvants ANTIBIOTICE S.A TA Parentérale H [E]
- PENICILLINE G UNIMED 1 MUI Poudre pour Préparation Injectable B/1Fl+sol/5ML UNIMED TA Parentérale 0.660 DT [E]

PHENOXYMETHYLPENICILLINE

- ORACILLINE 1 MU Comprimé B/12 ADWYA TA Orale 3.870 DT [E]
- OSPEN 1 MUI 1 MU Comprimé Pelliculé B/12 SAIPH TA Orale 3.780 DT [E]
- OSPEN 400 MU Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 3.310 DT [E]

9.1.1.1.2. - Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases

Les pénicillines résistantes aux β -lactamases (oxacilline et flucloxacilline) ont un spectre antibactérien comparable à celui de la pénicilline G. Elles sont un peu moins actives sur les germes pénicillinosensibles mais beaucoup plus actives sur les staphylocoques producteurs de β -lactamases. Les infections dues à ces derniers germes sont dès lors leur indication préférentielle. Elles sont acidorésistantes. Une hépatite cholestatique a été observée surtout avec la flucloxacilline.

FLUCLOXACILLINE

- FLOXAPEN 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 5.460 DT [E]
- FLOXAPEN 500 MG Gélule B/24 ADWYA TA Orale 11.900 DT [E]
- FLUXA 500 MG Gélule B/24 MEDICEF TA Orale 9.880 DT [E]

OXACILLINE

- OXACIL IM IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/5 ML UNIMED TA Parentérale 1.450 DT [E]
- OXACILLINE WINTHROP 500 MG Gélule B/12 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.900 DT [E]
- OXACILLINE WINTHROP 500 MG Gélule B/24 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 7.100 DT [E]
- OXAGRAM 500 MG Gélule B/24 MEDICEF TA Orale 7.560 DT [E]
- OXAPEN 500 MG Gélule B/24 SAIPH TA Orale 9.295 DT [E]
- OXAPEN 500 MG Gélule B/12 SAIPH TA Orale 5.400 DT [E]

9.1.1.1.3. - Aminopénicillines

Les aminopénicillines sont quelque peu moins actives sur la plupart des germes Gram+ que la pénicilline G mais plus actives sur *Streptococcus faecalis* (entérocoque). Les aminopénicillines sont très sensibles aux β-lactamases et ne sont donc pas actives sur les staphylocoques qui en sécrètent. Elles sont surtout actives sur les souches d'Haemophilus influenzae non productrices de β-lactamases, *Helicobacter pylori, Escherichia coli, Proteus mirabilis, salmonella, shigella, listeria* et sur le méningocoque. Beaucoup de souches d'*Haemophilus influenzae* et d'*Escherichia coli*, devenues sécrétrices de β-lactamases, sont résistantes.

Toutes les aminopénicillines ont le même spectre antibactérien mais leur résorption après prise orale diffère. L'ampicilline n'est résorbée qu'à raison de 25 à 40% et ce pourcentage diminue encore avec la dose; son utilisation per os ne se justifie plus. C'est pour cette raison qu'il n'existe plus de spécialités à base d'ampicilline per os sur le marché. L'amoxicilline est résorbée à raison d'environ 80%.

Par voie orale, les doses élevées d'aminopénicillines provoquent des troubles gastriques et, surtout avec les dérivés moins bien résorbés, de la diarrhée. Les patients allergiques aux autres pénicillines le sont aussi aux aminopénicillines, l'inverse n'étant pas nécessairement vrai. En outre, toutes les aminopénicillines peuvent provoquer un rash cutané maculopapuleux. En cas de mononucléose infectieuse et de leucémie lymphoïde aiguë, le rash cutané est beaucoup plus fréquent.

AMOXICILLINE

- AMOXAL 500 MG Comprimé dispersible B/24 MEDICEF TA Orale 6.680 DT [E]
- AMOXAL 1 GR Comprimé dispersible B/14 MEDICEF TA Orale 7.665 DT [E]
- AMOXIL 0.5 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL/+S/5 ML UNIMED TA Parentérale 1.300 DT [E]
- AMOXIL 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL/+S/5 ML UNIMED TA Parentérale 1.600 DT [E]
- AMOXICILLINE WINTHROP 500 MG Géllule B/12 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 3.376 DT [E]
- AMOXICILLINE WINTHROP 500 MG Géllule B/24 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.900 DT [E]
- AMOXICILLINE WINTHROP 500 MG/5ML Poudre Pour Suspension Orale Fl/60ML WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 4.200 DT [E]
- AMOXICILLINE WINTHROP 250 MG/5ML Poudre Pour Suspension Orale Fl/60ML WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 1.950 DT [E]
- CLAMOXYL 125 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 2.105 DT [E]
- CLAMOXYL 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 2.920 DT [E]
- CLAMOXYL 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 5.830 DT [E]
- CLAMOXYL 500 MG Gélule B/12 ADWYA TA Orale 4.221 DT [E]
- CLAMOXYL DISPERSIBLE 1 GR Comprimé Soluble B/12 ADWYA TA Orale 9.345 DT [E]
- CLAMOXYL DISPERSIBLE 500 MG Comprimé Soluble B/12 ADWYA TA Orale 5.100 DT [E]
- NOVAMOX 500 MG Comprimé dispersible B/24 ADWYA TA Orale 7.000 DT [E]
- NOVAMOX 1GR Comprimé Dispersible B/12 ADWYA TA Orale 6.500 DT [E]
- NOVAMOX 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 2.150 DT [E]
- NOVAMOX 500 MG Comprimé Dispersible B/12 ADWYA TA Orale 3.700 DT [E]
- NOVAMOX 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 4.370 DT [E]
- PENAMOX 250 MG/5ML Poudre pour Suspension Orale FL/100 ML MEDICEF TA Orale 3.150 DT [E]
- PENAMOX 500 MG Gélule B/24 MEDICEF TA Orale 5.460 DT [E]
- PENAMOX 500 MG Poudre Pour Suspension Orale FL/100 ML MEDICEF TA Orale 6.090 DT [E]
- PENAMOX 1 GR Comprimé Pelliculé Sécable B/12 MEDICEF TA Orale 5.460 DT [E]
- SAIFOXYL 125 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 1.660 DT [E]
- SAIFOXYL 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 2.175 DT [E]
- SAIFOXYL 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 4.660 DT [E]
- SAIFOXYL 250 MG Gélule B/12 SAIPH TA Orale [E]
- SAIFOXYL 500 MG Comprimé Pelliculé B/12 SAIPH TA Orale 4.040 DT [E]
- SAIFOXYL 500 MG Comprimé Pelliculé B/24 SAIPH TA Orale 5.485 DT [E]
- SAIFOXYL 500 MG Comprimé Sécable Dispersible B/24 SAIPH TA Orale 6.500 DT [E]
- SAIFOXYL 1000 MG Comprimé Pelliculé B/12 SAIPH TA Orale 5.660 DT [E]
- SAIFOXYL 1GR Comprimé Dispersible B/14 SAIPH TA Orale 8.270 DT [E]

AMPICILLINE

- AMPICIL 0.5 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/5 ML UNIMED TA Parentérale 0.755 DT [E]
- AMPICIL 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1+S/5 ML UNIMED TA Parentérale 1.090 DT [E]

9.1.1.1.4. - Acyluréidopénicilline

Le spectre antibactérien de la pipéracilline s'étend à de nombreux germes Gram- y compris pseudomonas, entérobacter, klebsiella et serratia et à une partie des souches de bactéroïdes dont le Bacteroides fragilis. La pipéracilline ne peut être administrée que par voie parentérale. La dose doit être réduite en cas d'insuffisance rénale.

PIPERACILLINE

- PIPERAL 1GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 Fl + Solv/5ML UNIMED TA Parentérale H^[E]
- PIPERAL 2GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 Fl + Solv/10ML UNIMED TA Parentérale H^[E]

9.1.1.1.5. - Autres pénicillines

Le Pivmecillinam est un bioprécurseur du mecillinam, antibiotique actif apparenté chimiquement à la famille des bêtalactamines

Le mecillinam est bactéricide et agit par blocage de la synthèse de la paroi cellulaire. Son mode d'action particulier explique son spectre antibactérien : le mecillinam agit surtout sur les organismes Gram - de la famille des entérobactéries.

PIVMECILLINAM

• SELEXID 200 MG Comprimé Enrobé B/12 LEO TA Orale 7.310 DT [E]

9.1.1.2. - Céphalosporines

Les céphalosporines possèdent comme les pénicillines un cycle β -lactame et leur mécanisme d'action est identique.

La plupart des céphalosporines du premier et du deuxième groupe passent difficilement la barrière hémato-encéphalique et ne peuvent donc pas être utilisées dans les méningites. Les céphalosporines sont éliminées par les reins; en cas d'insuffisance rénale prononcée, la posologie doit être adaptée.

Des réactions allergiques (y compris un choc anaphylactique) sont possibles, et 10 à 20% des patients allergiques à la pénicilline le seront également aux céphalosporines. Des altérations hématologiques et très rarement hépatiques ont été décrites. Une atteinte rénale est rare et se manifeste plus vite en cas d'utilisation concomitante d'aminosides ou de diurétiques de l'anse.

9.1.1.2.1. - Premier groupe

Les céphalosporines du premier groupe sont actives sur les germes Gram+, mais beaucoup moins que la pénicilline G. Elles sont actives sur les staphylocoques sécréteurs de β-lactamases mais ne le sont pas sur ceux qui sont méticillino-résistants. Pour ce qui est des bacilles Gram-, elles sont parfois actives sur des *Escherichia coli* résistants aux aminopénicillines, et le sont en général sur les *klebsiella*, vis-à-vis desquels les aminopénicillines sont inactives. Elles sont nettement moins actives contre l'*Haemophilus influenzae* que les aminopénicillines et les céphalosporines des 2^{ème} et 3^{ème} groupes. La céfazoline est fort utilisée en prophylaxie lors d'interventions chirurgicales.

Le céfadroxil, est quasi entièrement résorbé après administration orale.

CEFADROXIL

- CEDROX 250 MG Suspension Buvable FL/60 ML MEDICEF TA Orale 3.570 DT [E]
- CEDROX 500 MG Suspension Buvable FL/60 ML MEDICEF TA Orale 6.290 DT [E]
- CEDROX 500 MG Gélule B/12 MEDICEF TA Orale 5.775 DT [E]
- ORACEFAL 125 MG/5 ML Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SAID (IPS) TA Orale 3.420 DT ^[E]
- ORACEFAL 250 MG/5 ML Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SAID (IPS) TA Orale 5.955 DT [E]
- ORACEFAL 500 MG Gélule B/12 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SAID (IPS) TA Orale 8.253 DT [E]
- ORACEFAL 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SAID (IPS) TA Orale 9.700 DT [E]
- ORACEFAL DISPERSIBLE 1 GR Comprimé Dispersible B/6 BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale 8.699 DT [E]
- SAIFORAL 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 5.150 DT [E]
- SAIFORAL 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 7.460 DT EJ
- SAIFORAL 500 MG Gélule B/12 SAIPH TA Orale 6.694 DT [E]
- SAIFORAL 500 MG Gélule B/24 SAIPH TA Orale 10.985 DT [E]

CEFALEXINE

- CEFRIN 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/100 ML JULPHAR TA Orale 3.405 DT [E]
- KEFORAL 250 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML SAIPH TA Orale 4.730 DT [E]
- KEFORAL 500 MG Gélule B/12 SAIPH TA Orale 7.560 DT [E]

CEFAZOLINE

- CEFAZOL IM/IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL + S/5 ML UNIMED TA Parentérale 2.500 DT [E]
- CEFAZOL IM 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1Fl + S/5 ML UNIMED TA Parentérale 2.700 DT [E]

9.1.1.2.2. - Deuxième groupe

Ces céphalosporines sont en général moins actives que celles du premier groupe sur les coques Gram+ et ont un spectre d'activité plus étendu sur les bacilles Gram-, les *pseudomonas* étant toutefois toujours résistants. Elles sont actives sur *Haemophilus influenzae* y compris les souches sécrétrices de β-lactamases, mais elles ne sont pas indiquées dans des infections graves telles les épiglottites et méningites causées par ce germe. La céfuroxime est plus active que le céfaclor contre *Haemophilus influenzae* et *Moraxella catarrhalis*.

CEFUROXIME

- ZINOX 250 MG Comprimé pelli. B/14 SAIPH TA Orale 15.500 DT [E]
- ZINNAT 125 MG Comprimé Enrobé B/14 GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale 11.423 DT [E]
- ZINNAT 250 MG Comprimé Enrobé B/14 GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale 19.745 DT [E]
- ZINNAT 125 MG/5ML Poudre pour Suspension Orale FL/70 ML GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale 13.425 DT [E]
- ZINNAT IM/IV 250 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL GSK FRANCE TA Parentérale 6.473 DT [E]
- ZINNAT IM/IV 750 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL GSK FRANCE TA Parentérale 14.194 DT [E]
- U-CEF 250 MG Comprimé Pelliculé Fl/14 MEDICEF TA Orale 15.120 DT [E]
- U-CEF 500 MG Comprimé Pelliculé Fl/14 MEDICEF TA Orale 26.120 DT [E]

9.1.1.2.3. - Troisième groupe

Les céphalosporines de ce groupe sont en général nettement moins actives contre les coques Gram+ mais le céfotaxime, et la ceftriaxone peuvent être actifs sur des souches de *Streptococcus pneumoniae* résistantes à la pénicilline. L'action des céphalosporines de ce groupe s'étend à la plupart des entérobactéries y compris les *Serratia*, ainsi qu'aux *Pseudomonas Aeruginosa* pour la ceftazidime. Toutefois, des souches résistantes d'*Entérobacter* et de *Serratia* peuvent apparaître.

La céfotaxime, la ceftazidime et la ceftriaxone atteignent des taux suffisants dans le liquide céphalorachidien pour présenter un intérêt dans le traitement de la méningite à *Haemophilus influenzae*. La ceftriaxone a une demi-vie plus longue.

Les céphalosporines du troisième groupe ne sont indiquées que pour des infections graves. L'administration intraveineuse se fait en injection lente ou en perfusion. Des doses plus élevées sont souvent utilisées en cas d'infections très graves. Les doses doivent être réduites en cas d'insuffisance rénale.

CEFIXIME

- FALOXIM 200 MG Gélule B/16 SAIPH TA Orale 21.230 DT [E]
- FALOXIM 100 MG/5 ML PDRE/SUSP ORALE FL/60 ML SAIPH TA Orale 11.920 DT [E]
- MEGACEF 200 MG Gélule B/16 MEDICEF TA Orale 20.390 DT 🖭
- MEGACEF ENFANTS 100 MG/5 ML Poudre pour Solution Orale FL/60 ML MEDICEF TA Orale 13.420 DT [E]
- MEGACEF NOURRISSONS 40 MG/5 ML Poudre pour Solution Orale FL/60 ML MEDICEF TA Orale 7.665 DT [E]
- OROKEN 200 MG Comprimé Pelliculé B/8 AVENTIS TA Orale 16.245 DT [E]
- OROKEN NOURRISSONS 40 MG/5 ML Poudre pour Solution Orale FL/40 ML SANOFI-AVENTIS TUNISIE TA Orale 7.470 DT [E]
- OROKEN ENFANTS 100 MG/5 ML Poudre pour Solution Orale FL/40 ML SANOFI-AVENTIS TUNISIE TA Orale 13.420 DT [E]

CEFOTAXIME

- CEFOTIM IM IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL + Solvant /4 ML UNIMED TA Parentérale 9.500 DT [E]
- CEFOTIM IM 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL + Solvant/4 ML UNIMED TA Parentérale 9.500 DT [E]
- CEFOTIM IM IV 0.5 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL + Solvant/2 ML UNIMED TA Parentérale 5.000 DT [E]

CEFPODOXIME

- CEFODOX 100 MG Comprimé B/10 PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 14.880 DT [E]
- CEFODOX 200 MG Comprimé B/10 PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 20.895 DT [E]
- CEFODOX 40 MG/5ML Granules pour Suspension Buvable FL/100ML PHARMA INTERNATIONAL TA Orale 14.210 DT ^[E]
- ORELOX 100 MG Comprimé B/10 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 18.555 DT [E]
- ORELOX 100 MG Comprimé Pelliculé B/20 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 32.425
- ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 MG/5ML Granules pour Suspension Buvable FL/100ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 15.753 DT [E]
- ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 MG/5 ML Granules pour Suspension Buvable FL/50 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Orale 9.231 DT [E]

CEFTAZIDIME

- CEFTAZIM IM IV 0.5GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL+ solvant UNIMED TA Parentérale H [E]
- CEFTAZIM IM IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL+ solvant UNIMED TA Parentérale H [E]

CEFTRIAXONE

- CEFAXONE IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL + Solvant /10 ML UNIMED TA Parentérale H [E]
- CEFAXONE IM 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL + Solvant /4 ML UNIMED TA Parentérale 8.500 DT [E]
- CEFAXONE IM IV SC 250 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL + Solvant /5 ML UNIMED TA Parentérale 3.200 DT [E]
- CEFAXONE IM IV SC 0.5 G Poudre pour Préparation Injectable B/1FL + Solvant /5 ML UNIMED TA Parentérale 4.700 DT [E]

9.1.1.3. - Carbapénèmes

L'imipénem est un antibiotique à large spectre. Il est utilisé dans des infections polymicrobiennes avec présence possible d'un agent pathogène anaérobie tel que Bacteroides fragilis, et dans des infections à germes fréquemment résistants tels que Pseudomonas Aeruginosa, Entérobacter et Serratia. L'imipénem ne convient pas pour le traitement des méningites. Les carbapénèmes augmente le risque d'infections par des levures.

IMIPENEM+CILASTATINE

 SYNERGIC IV 500 MG/500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon UNIMED TA Parentérale H [E]

9.1.1.4. - Bêta-lactame + inhibiteur des bêta-lactamases

L'association d'une β-lactame à une substance inhibant les β-lactamases permet d'étendre le spectre antibactérien à des germes résistants aux aminopénicillines tels Klebsiella Pneumoniae, Moraxella Catarrhalis, certains staphylocoques producteurs de β-lactamases, certaines souches d'Haemophilus Influenzae et de Neisseria Gonorrhoeae. Ces associations ne sont indiquées que si la présence de germes résistants à une aminopénicilline est avérée ou suspectée.

L'incidence de diarrhée et autres troubles gastro-intestinaux est élevée. Des hépatites, le plus souvent cholestatiques, ont été observées; elles sont probablement dues à l'acide clavulanique.

Pour les infections pharyngées à streptocoques A β -hémolytiques, la pénicilline V reste le médicament de premier choix; pour les infections à Streptococcus pneumoniae résistants à la pénicilline - dans lesquelles un inhibiteur des β -lactamases n'augmente pas la sensibilité - certaines céphalosporines de la troisième génération sont parfois indiquées; pour les infections à staphylocoques méticillinosensibles, les pénicillines résistantes aux β -lactamases restent indiquées.

AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE

- AMOXI-CLAV 1G/125 MG Poudre pour Suspension Orale B/12 Sachets-doses WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 15.100 DT [E]
- AMOXI-CLAV WINTHROP enf.100MG/12.5MG Poudre pour Suspension Orale Fl/60ml + pip.doseuse WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 7.850 DT [E]

- AMOXI-CLAV WINTHROP nourr.100MG/12.5MG Poudre pour Suspension Orale Fl/30ml + pip.doseuse WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 5.650 DT [E]
- AUGMENTIN (8/1) ADULTE 500 MG/62.5 MG Comprimé Pelliculé B/16 ADWYA TA Orale 12.000 DT [E]
- AUGMENTIN (8/1) ADULTE 500 MG/62.5 MG Comprimé Pelliculé B/24 ADWYA TA Orale 17.900 DT [E]
- AUGMENTIN (8/1) ADULTE 500 MG/62.5 MG Poudre pour Suspension Orale B/12 Sachets Doses ADWYA TA Orale 10.800 DT [E]
- AUGMENTIN (8/1)ADULTE 500 MG/62.5 MG Poudre pour Suspension Orale B/24 Sachets Doses ADWYA TA Orale 20.400 DT [E]
- AUGMENTIN ADULTE 1 gr/125 MG Poudre pour Suspension Orale B/12 Sachets Doses ADWYA TA Orale 18.205 DT ^[E]
- AUGMENTIN 100 MG/12.5MG/ML Poudre pour Suspension Orale FL/30ML + pipette ADWYA TA Orale 7.125 DT [E]
- AUGMENTIN 100 MG/12.5MG/ML Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML + séringue doseuse ADWYA TA Orale 11.800 DT [E]
- CLAVOR 100 MG/12.5MG/ML Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML+ pipette SAIPH TA Orale 8.310 DT [E]
- CLAVOR 500 (1/8) 500 MG/62.5 MG Comprimé Pelliculé B/16 SAIPH TA Orale 10.415 [E]
- CLAVOR 500 (1/8) 500 MG/62.5MG Comprimé Pelliculé B/24 SAIPH TA Orale 15.645 DT [E]
- CLAVOR 1G/125 MG (1/8) Poudre p. Suspension Orale B/12 sachets SAIPH TA Orale 15.960 DT [E]
- CLAVOR 1G/125 MG (1/8) Poudre p. Suspension Orale B/24 sachets SAIPH TA Orale 30.420 DT [E]
- CLAVOR 500 MG/62.5 MG (1/8) Poudre p. Suspension Orale B/24 sachets SAIPH TA Orale 16.760 DT [E]
- NOVACLAV 500 MG/62.5 MG Comprimé Pelliculé B/16 ADWYA TA Orale 9.900 [E]
- NOVACLAV 500 MG/62.5 MG Comprimé Pelliculé B/24 ADWYA TA Orale 14.700 [E]
- NOVACLAV enf 500 MG/62.5 MG Poudre pour Suspension Orale B/12 Sachets ADWYA TA Orale 7.700 DT [E]
- NOVACLAV ad 1G/125 MG Poudre pour Suspension Orale B/12 Sachets ADWYA TA Orale 15.150 DT [E]
- NOVACLAV enf. 100MG/12.5MG/ML Poudre pour Suspension Orale Fl/60ml + ser.doseuse ADWYA TA Orale 7.900 DT [E]
- NOVACLAV nourr. 100MG/12.5MG/ML Poudre pour Suspension Orale Fl/30ml + ser.doseuse ADWYA TA Orale 5.700 DT [E]
- VAAMOX IV enfant et nourrisson 500 MG/50 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon UNIMED TA Parentérale 2.700 DT [E]
- VAAMOX IV enfant et nourrisson 500 MG/50 MG Poudre pour Préparation Injectable B/10 Flacons UNIMED TA Parentérale [E]
- VAAMOX IV adulte 1 G /200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/10 Flacons UNIMED TA Parentérale H^[E]
- VAAMOX IV adulte 1 G/200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon UNIMED TA Parentérale 5.000 DT [E]

PIPERACILLINE+TAZOBACTAM

- PRIZMA 4 G/500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL sans solvant HIKMA Pharmaceuticals TA Parentérale H [E]
- TAZOCILLINE 4 G/500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL sans solvant WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE TA Parentérale H [E]
- TAZOCILLINE 2 G/250 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL sans solvant WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE TA Parentérale H [E]

9.1.2. - Aminosides

Les aminosides sont actifs sur les germes Gram- aérobies, sur certains coques Gram+ (staphylocoques pénicillino- ou méticillino-résistants, *Streptococcus Viridans* et entérocoques) et sur certains bacilles acidorésistants. Cependant, depuis l'apparition de substances moins toxiques et plus efficaces, ils ne sont qu'exceptionnellement utilisés en monothérapie.

Les aminosides sont utilisés en association à une pénicilline ou à une céphalosporine lors d'infections graves dues soit aux entérobactéries (*Escherichia Coli, Klebsiella, Proteus* y compris les indole-positifs et *Serratia*), soit à *Pseudomonas Aeruginosa*, et dans certains cas d'endocardite par des coques Gram+.

Les aminosides sont peu ou pas résorbés par l'intestin; dans les infections systémiques, ils devront être injectés. Ils pénètrent difficilement dans la bile et dans le liquide céphalorachidien mais traversent bien le placenta. Ils sont peu ou pas métabolisés et sont éliminés par filtration glomérulaire.

La dose thérapeutique et la dose toxique sont très proches. Les aminosides peuvent aggraver des troubles de la conduction neuromusculaire et provoquer une parésie en cas d'administration en bolus, mais les principaux effets indésirables sont l'ototoxicité et la néphrotoxicité. En raison de ces effets toxiques, les aminosides doivent être évités pendant la grossesse. Chez les malades atteints d'insuffisance rénale et chez les patients âgés, l'excrétion des aminosides est retardée et le risque de toxicité est encore plus élevé. La nécrose tubulaire due à un aminoside provoque une nouvelle diminution de l'excrétion et ainsi une nouvelle augmentation des taux plasmatiques de l'antibiotique. La toxicité apparaît parfois très tardivement. Toute atteinte de la fonction rénale exige une réduction de la posologie, de préférence par une diminution de la fréquence des administrations, éventuellement par une diminution de chaque dose. L'unanimité n'est pas faite sur les différences éventuelles de néphrotoxicité des différents aminosides. Pour plusieurs aminosides, il a été prouvé que la néphrotoxicité est moindre pour une même efficacité lors de l'administration de la dose journalière en une fois, pour autant que la fonction rénale soit normale.

En cas d'insuffisance rénale et dans les cas graves, les concentrations plasmatiques doivent être déterminées. Ceci implique qu'un traitement aux aminosides ne peut souvent être réalisé qu'en milieu hospitalier.

STREPTOMYCINE

• STREPTOMYCINE PANPHARMA 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/50 Flacons PANPHARMA TA Parentérale H [E]

GENTAMICINE

- GENTA 10 MG Solution Injectable B/5/1 ML MEDIS TA Parentérale 4.135 DT IEI
- GENTA 20 MG Solution Injectable B/5/2 ML MEDIS TA Parentérale 4.597 DT [E]
- GENTA 40 MG Solution Injectable B/5/2 ML MEDIS TA Parentérale 5.109 DT [E]
- GENTA 80 MG Solution Injectable B/5/2 ML MEDIS TA Parentérale 8.245 DT [E]
- GENTA 160 MG Solution Injectable B/1/2 ML MEDIS TA Parentérale 3.100 DT [E]
- GENTA 80 MG Solution Injectable B/1/2 ML MEDIS TA Parentérale 1.650 DT [E]
- UNIGENTA 10 MG Solution Injectable B/2/1 ML UNIMED TA Parentérale 1.400 DT [E]
- UNIGENTA 20 MG Solution Injectable B/2/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.595 DT [E]
- UNIGENTA 40 MG Solution Injectable B/2/2 ML UNIMED TA Parentérale 1.750 DT [E]
- UNIGENTA 80 MG Solution Injectable B/2/2 ML UNIMED TA Parentérale 3.070 DT [E]
- UNIGENTA 160 MG Solution Injectable B/2/2 ML UNIMED TA Parentérale 5.800 DT [E]

AMIKACINE

• MIACIN 500 MG Solution Injectable B/6/2 ML HIKMA Pharmaceuticals TA Parentérale H [E]

NETILMICINE

• NETROMICINE 100 MG Solution Injectable B/1FL/1 ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 5.550 DT [E]

- NETROMICINE 50 MG/2 ML Solution Injectable B/1FL/2 ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 3.102 DT [E]
- NETROMICINE 150 MG/1.5 ML Solution Injectable B/1FL /1.5 ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 7.589 DT [E]
- NETROMICINE 25 MG/1 ML Solution Injectable B/1FL/1 ML SCHERING-PLOUGH TA Parentérale 1.763 DT [E]

9.1.3. - Macrolides

Le spectre antibactérien des macrolides couvre de nombreux coques Gram+ aérobies et anaérobies, les Neisseria, Bordetella Pertussis, Legionella Pneumophila, Mycoplasma Pneumoniae, les Chlamydia et *Campylobacter Jejuni*. Un certain nombre de souches de streptocoques A β-hémolytiques, et de nombreuses souches de *Streptococcus Pneumoniae* et de staphylocoques sont résistantes. La sensibilité d'*Haemophilus Influenzae* aux macrolides est variable. Il existe une résistance croisée importante entre les différents macrolides.

Ils ont une place dans le traitement des infections dues aux *Bordetella Pertussis*, *Chlamydia*, *Legionella* et *Mycoplasma*. Les macrolides peuvent aussi être utilisés dans certaines infections causées par des germes Gram+, par exemple des Streptocoques β hémolytiques du groupe A, en cas de contre-indication aux pénicillines. Ce ne sont pas des médicaments de premier choix dans les infections à *Haemophilus Influenzae* et *Moraxella Catarrhalis*. Ils ne sont pas indiqués dans les infections à pneumocoques en raison d'une résistance importante.

9.1.3.1. - Erythromycine

L'érythromycine n'est pas acido-résistante et sa résorption après prise orale est irrégulière et influencée par la prise d'aliments. Elle peut provoquer des malaises gastriques et rarement des réactions allergiques. Des altérations réversibles des tests fonctionnels hépatiques et plus rarement des hépatites cholestatiques sont décrites. Une ototoxicité est décrite lors de l'utilisation de doses élevées. Des effets centraux sont possibles.

L'administration d'érythromycine inhibe le catabolisme hépatique notamment de la théophylline, de la carbamazépine, de la ciclosporine, du cisapride, de la terfénadine ainsi que de l'ergotamine et de certains autres dérivés de l'ergot. L'association de l'érythromycine avec le cisapride peut déclencher des torsades de pointes parfois fatales. Une injection intraveineuse trop rapide d'érythromycine peut elle aussi allonger l'intervalle QT et entraîner des torsades de pointes. L'association d'érythromycine à l'ergotamine ou à certains autres dérivés de l'ergot peut entraîner plus facilement une vasoconstriction et de la gangrène. Chez les femmes sous contraceptifs estroprogestatifs, l'érythromycine peut provoquer un ictère et du prurit.

Posologie per os

adulte: 1 à 2 g p.j. en 2 à 4 prises

enfant: 30 à 50 MG/kg/j. en 4 prises

ERYTHROMYCINE

- ABBOTICINE 200 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 2.908 DT [E]
- ERYTHROCINE IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon ABBOTT TA Parentérale H [E]
- ERYTHROCINE 500 MG Poudre pour Suspension Orale FL/60 ML ADWYA TA Orale 4.583 DT [E]
- ERYTHRO 500 MG Comprimé Enrobé B/16
 SIPHAT TA Orale 4.990 DT [E]
- ERYTHRO 250 MG Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT TA Orale 3.235 DT [E]

9.1.3.2. - Autres macrolides

La spiramycine et les macrolides plus récents, l'azithromycine, la clarithromycine, la roxithromycine ont un spectre antibactérien similaire à celui de l'érythromycine. In vitro, la clarithromycine et l'azithromycine sont plus actives que les autres macrolides vis-à-vis de l'Haemophilus Influenzae. La demi-vie plus longue de certains de ces macrolides permet une administration moins fréquente: deux prises journalières pour la clarithromycine, la midécamycine et la roxithromycine; une seule prise journalière pour l'azithromycine

Une seule prise d'un gramme d'azithromycine est efficace dans les infections uro-génitales à *Chlamydia Trachomatis*. La clarithromycine à dose élevée, seule ou en association, a une place dans le traitement des infections à mycobactéries atypiques chez les sidéens et fait partie des schémas thérapeutiques pour le traitement des ulcères gastro-duodénaux liés à la présence d'*Helicobacter Pylori* (voir *Médicaments de la pathologie gastrique et duodénale*). La spiramycine peut être utile dans le traitement de certains cas de toxoplasmose, en particulier pendant la grossesse.

Les effets indésirables de ces macrolides sont du même ordre que ceux de l'érythromycine. Les troubles gastro-intestinaux paraissent moins importants. Les macrolides qui ont une longue demi-vie peuvent entraîner des réactions allergiques prolongées. Le risque d'interaction avec d'autres médicaments paraît moindre que pour l'érythromycine. La prudence s'impose toutefois lors de la prise concomitante de macrolides plus récents avec des médicaments tels l'ergotamine et autres dérivés de l'ergot et le cisapride qui peuvent donner lieu avec l'érythromycine à des interactions potentiellement dangereuses. L'innocuité pendant la grossesse des macrolides plus récents n'est pas établie.

Avec la télithromycine: outre l'hépatotoxicité, aggravation de la myasthénie gravis, troubles de l'accomodation, allongement possible de l'intervalle QT.

METRONIDAZOLE+SPIRAMYCINE

- BIOGYL 1.5 MUI/250 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 SAIPH TA Orale 5.670 DT [E]
- BIOGYL 1.5 MUI/250 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/20 SAIPH TA Orale 9.450 DT [E]
- BIRODOGYL 1,5 MUI/250 MG Comprimé Pelliculé B/10 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 6.930 DT [E]
- BI-SPIRAZOL Comprimé Pelliculé B/10 ADWYA TA Orale 5.500 DT [E]
- BI-SPIRAZOL Comprimé Pelliculé B/20 ADWYA TA Orale 9.900 DT [E]
- BI-SPIROGYL 1.5 MUI/250 MG Comprimé Pelliculé B/10 SIPHAT TA Orale 5.550 DT [E]
- BI-SPIROGYL 1.5 MUI/250 MG Comprimé Pelliculé B/20 SIPHAT TA Orale 8.800 DT [E]
- OGYL 750 MU/125 MG Comprimé Pelliculé B/20 SAIPH TA Orale 4.725 DT [E]
- RODOGYL 750 MU/125 MG Comprimé Pelliculé B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 5.800 DT [E]
- SPIRAZOL 0.75MUI/125MG Comprimé Pelliculé B/20 ADWYA TA Orale 4.100 DT [E]
- SPIROGYL 750 MU/125 MG Comprimé Pelliculé B/20 SIPHAT TA Orale 4.120 DT [E]

SPIRAMYCINE

- ROVAMYCINE 1.5 MU Comprimé Pelliculé Sécable B/16 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 6.740 DT [E]
- ROVAMYCINE 3 MU Comprimé Pelliculé B/10 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 8.850 DT [E]
- SPIRA 3 MUI 3 MU Comprimé Pelliculé B/10 SIPHAT TA Orale 6.500 DT [E]
- SPIRA 1.5 MUI 1.500 MU Comprimé Pelliculé B/16 SIPHAT TA Orale 4.950 DT [E]
- SPIROX 3 MUI Comprimé Pelliculé B/10 ADWYA TA Orale 7.200 DT [E]

MIDECAMYCINE

- MIOCAMEN 600 MG Comprimé Sécable B/12 MENARINI IND.FARMACEUTICHE RIUNITE SRL TA ORALE 11.712 DT [E]
- MIOCAMEN 250 MG Poudre Pour Suspension Orale FL/30GR/120 ML MENARINI IND. FARMLACEUTIQUE RIUNITE SRL TA Orale 10.638 DT [E]

AZITHROMYCINE

- AZITHROCINE 250 MG Gélule B/6 SIPHAT TA Orale 8.000 DT [E]
- AZIX 500 MG Comprimé Pelliculé B/3 PHARMAGHREB TA Orale 9.920 DT IEI
- AZRO 500 MG Comprimé Pelliculé B/3 TERIAK TA Orale 10.500 DT [E]
- AZRO 900 40 MG/1 ML Poudre pour Suspension Orale FL/22.5 ML TERIAK TA Orale 8.315 DT [E]
- AZRO 600 40 MG/1 ML Poudre pour Suspension Orale FL/15 ML TERIAK TA Orale 5.670 DT [E]
- ZITHROMAX 900 MG 40 MG/ML Poudre pour Suspension Orale FL/22.5 ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 12.870 DT [E]
- ZITHROMAX 600 MG 40 MG/ML Poudre pour Suspension Orale FL/15 ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 8.810 DT [E]
- ZITHROMAX UNO 500 MG Comprimé Sécable B/2 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 14.285 DT [E]
- ZITHROMAX 500 MG Comprimé Sécable B/3 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 17.865 DT [E]
- ZOMAX 250 MG Gélule B/6 IBN AL BAYTAR TA Orale 8.000 DT [E]
- ZOMAX 500 MG Comprimé Pelliculé B/3 IBN AL BAYTAR TA Orale 8.000 DT [E]

CLARITHROMYCINE

- CLAMYCINE 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 GALPHARMA TA Orale 26.000 DT [E]
- CLAMYCINE 250 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 GALPHARMA TA Orale 13.800 DT [E]
- CLARID 50 MG /ML Granulés pour Suspension Buvable FL/60 ML + Seringue Doseuse ADWYA TA Orale 16.800 DT [E]
- CLARID 25 MG /ML Granulés pour Suspension Buvable FL/60 ML + Seringue Doseuse ADWYA TA Orale 9.800 DT [E]
- CLARID 500 MG Comprimé Pelliculé B/14 ADWYA TA Orale 28.500 DT [E]
- CLARID 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 ADWYA TA Orale 12.800 DT [E]
- CLARID 250 MG Comprimé Pelliculé B/14 ADWYA TA Orale 14.300 DT [E]
- CLARITHRO 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 SIPHAT TA Orale 11.000 DT [E]
- KLARIBAC 250 MG Comprimé Enrobé B/14 APM TA Orale 16.378 DT [E]
- KLARIBAC 500 MG Comprimé Enrobé B/14 APM TA Orale 28.530 DT [E]
- KLAROMIN 250 MG Comprimé Pelliculé B/14 TERIAK TA Orale 13.800 DT [E]
- KLAROMIN 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 TERIAK TA Orale 27.250 DT [E]
- ZECLAR 25 MG /ML Poudre pour Suspension Buvable FL/60 ML + Pipette Doseuse SAIPH TA Orale 10.300 DT ^[E]
- ZECLAR 50 MG /ML Granulés pour Suspension Buvable FL/60 ML + Pipette Doseuse SAIPH TA Orale 17.000 DT [E]
- ZECLAR 500 MG Comprimé Pelliculé B/14 SAIPH TA Orale 33.000 DT [E]
- ZECLAR 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 SAIPH TA Orale 13.200 DT [E]
- ZECLAR 250 MG Comprimé Pelliculé B/14 SAIPH TA Orale 14.900 DT [E]
- XYLAR 500 MG Comprimé Pelliculé B/14 IBN AL BAYTAR TA Orale 25.410 DT [E]
- XYLAR 250 MG Comprimé Pelliculé B/14 IBN AL BAYTAR TA Orale 13.315 DT [E]
- XYLAR 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 IBN AL BAYTAR TA Orale 10.800 DT [E]

ROXITHROMYCINE

- ROMAC 100 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/12 SAIPH TA Orale 7.120 DT [E]
- ROMAC 150 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/12 SAIPH TA Orale 9.690 DT [E]

- ROXIMAX 150 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/12 PHARMAGHREB TA Orale 8.900 DT [E]
- ROXIMAX 150 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/16 PHARMAGHREB TA Orale 10.870 DT [E]
- ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 MG Comprimé Pelliculé B/12 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 9.690 DT [E]
- RULID 100 MG Comprimé Pelliculé B/12 SANOFI AVENTIS PHARMA TA Orale 10.465 DT [E]
- RULID 150 MG Comprimé Enrobé B/12 SANOFI AVENTIS PHARMA TA Orale 13.880 DT [E]

9.1.4. - Clindamycine et lincomycine

La lincomycine et son dérivé semi-synthétique la clindamycine ont vis-à-vis des coques Gram+ le même spectre d'activité que les macrolides. Elles sont très actives sur les anaérobies y compris les bactéroïdes. Elles sont moins actives sur les Neisseria, l'Haemophilus Influenzae et le Mycoplasma. Elles n'agissent pas sur les Chlamydia et elles n'ont pratiquement pas d'activité vis-à-vis des bacilles Gram- aérobies. La clindamycine est beaucoup plus active et mieux résorbée que la lincomycine et elle doit lui être préférée. La clindamycine est surtout utilisée en cas d'abcès pulmonaire ou d'infections abdomino-pelviennes par germes anaérobies.

Les principaux effets indésirables sont: troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements et surtout diarrhée. La colite pseudomembraneuse par prolifération de *Clostridium Difficile* est surtout à craindre. Cette atteinte, qui peut survenir après un traitement par de nombreux antibiotiques notamment avec des aminopénicillines et des céphalosporines, se manifeste toutefois plus souvent avec la lincomycine et la clindamycine et ce, même lors d'administration parentérale.

CLINDAMYCINE

DALACINE 600 MG Solution Injectable B/1/4 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [E]

LINCOMYCINE

 LINCOCINE 600 MG Solution Injectable B/1/2 ML PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Parentérale 1.575 DT [E]

9.1.5. - Quinolones

Les quinolones sont actives contre la plupart des germes Gram-, principalement les entérobactéries (en particulier Campylobacter Jejuni et Salmonella Typhi), d'autres bacilles Gram- (tels que Haemophilus Influenzae, Legionella et Pseudomonas), des coques Gram- (Neisseria Gonorrhoeae, Neisseria Meningitidis) ainsi que certains staphylocoques. Les quinolones ont aussi une certaine activité contre des germes atypiques tels que Mycoplasma Pneumoniae et Chlamydia Pneumoniae. Le nombre de germes résistants, en particulier de Pseudomonas Aeruginosa et de staphylocoques, augmente. Le contact de germes avec de faibles concentrations entraîne rapidement une résistance. Il existe une résistance croisée entre les diverses quinolones. Il existe un antagonisme bactériologique entre ces substances d'une part, les tétracyclines et la nitrofurantoïne d'autre part.

Les concentrations plasmatiques et tissulaires des quinolones actuelles sont plus élevées par rapport à celles des premières quinolones qui n'étaient indiquées que dans les infections urinaires. A l'exception de la *norfloxacine* qui n'est indiquée que dans les infections par des germes sensibles au niveau du système uro-génital, les indications des autres quinolones sont les suivantes.

• Infections par des germes sensibles au niveau du système uro-génital, y compris les infections à gonocoques.

- Infections intestinales par des entérobactéries, surtout si elles sont accompagnées de symptômes généraux.
- Certaines infections respiratoires, en particulier celles dues à des bacilles Gram- sensibles tels Pseudomonas Aeruginosa et Legionella.
- Comme alternative dans les infections à *Mycoplasma Pneumoniae* et *Chlamydia* lorsque les médicaments de premier choix ne peuvent pas être utilisés.

Les quinolones ne sont pas indiquées dans les infections par streptocoques (y compris *Streptococcus Pneumoniae*). Les quinolones en une prise (500 mg de ciprofloxacine ou 400 mg d'ofloxacine) ont une place en prophylaxie chez les adultes ayant été en contact avec un patient atteint d'une méningite à méningocoques. Il est important de limiter autant que possible l'utilisation des quinolones, afin de ralentir l'augmentation de la résistance.

Les effets indésirables des quinolones sont principalement des troubles gastro-intestinaux et des manifestations allergiques (rarement de type anaphylactique). Des arthralgies, des tendinites et des ruptures du tendon d'Achille, parfois aussi une photosensibilisation et des troubles du système nerveux central (surtout des vertiges et rarement des convulsions) ont été rapportés. La toxicité hématologique et les hépatites sont rares. Les quinolones sont contre-indiquées en cas de grossesse et d'allaitement et doivent, dans la mesure du possible, être évitées en-dessous de 18 ans: en effet, une atteinte du cartilage articulaire a été observée lors de l'administration chez l'animal pendant la période de croissance. Une augmentation des taux sériques de théophylline et de ciclosporine a été signalée lors de la prise concomitante de certaines quinolones. Un renforcement de l'effet de la warfarine a été décrit avec certaines quinolones. La résorption de la ciprofloxacine et de la norfloxacine est diminuée lors de la prise simultanée de nourriture, surtout s'il s'agit de produits lactés, et d'aluminium, de calcium, de fer ou de magnésium.

ACIDE NALIDIXIQUE

• NALIDIX 500 MG Comprimé B/56 DAR ALDAWA TA Orale 9.377 DT [E]

CIPROFLOXACINE

- CIPROLON 500 MG Comprimé Sécable B/10 IBN AL BAYTAR TA Orale 9.950 DT [E]
- CIPROLON 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 IBN AL BAYTAR TA Orale 11.250 DT [E]
- CIPROLON 750 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 IBN AL BAYTAR TA Orale 14.950 DT [E]
- CIPRO 500 MG Comprimé Enrobé B/14 MEDIS TA Orale 11.280 DT [E]
- CIPRO 750 MG Comprimé Enrobé B/14 MEDIS TA Orale 16.860 DT [E]
- CIPRO 200 MG/100 ML Solution Injectable FL/100 ML pour Perfusion MEDIS TA Parentérale 8.344 DT [E]
- SIFLOKS 500 MG Comprimé B/14 TERIAK TA Orale 13.870 DT [E]
- SIFLOKS 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 TERIAK TA Orale 19.500 DT [E]
- SIFLOKS 750 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 TERIAK TA Orale 17.000 DT [E]
- SIFLOKS 750 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/28 TERIAK TA Orale 23.900 DT [E]
- BACTALL 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 SAIPH TA Orale 7.750 DT IEI
- BACTALL 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 SAIPH TA Orale 9.900 DT [E]
- CIFLOXET 200 MG/100ML Solution Injectable Fl/100 ML DORCAS TA Parentérale H [E]

ENOXACINE

ENOXOR 200 MG omprimé Pelliculé B/10 PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Orale 9.704 DT [E]

LEVOFLOXACINE

LEVOCINE 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/5 DAR ESSAYDALI TA Orale 23.520 DT [E]

- LEVOCINE 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 DAR ESSAYDALI TA Orale 39.150 DT [E]
- LEVOFLOX 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/5 MEDIS TA Orale 23.500 DT [E]
- LEVOFLOX 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 MEDIS TA Orale 38.980 DT [E]
- LEVOFLOX 5 MG/ML Solution pour perfusion FL/100 ML MEDIS TA Parentérale H 50.119 DT [E]
- LEVOFLOXACINE WINTHROP 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/5 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 23.500 DT [E]
- LOVIK 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/5 SAIPH TA Orale 22.920 DT [E]
- LOVIK 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 SAIPH TA Orale 38.820 DT [E]
- TAVACET 5 MG/ML Solution Injectable FL/100 ML DORCAS TA Parentérale H [E]
- TAVAFLOX 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 TERIAK TA Orale 36.840 DT [E]
- TAVAFLOX 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/5 TERIAK TA Orale 21.750 DT [E]
- TAVANIC 500 MG Comprimé Pelliculé B/5 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 27.960 DT [E]
- TAVANIC 500 MG Comprimé Pelliculé B/10 SANOFI-AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 43.000 DT [E]

NORFLOXACINE

NORACIN 400 MG Comprimé Pelliculé B/14 SAIPH TA Orale 10.985 DT [E]

OFLOXACINE

- GAMOFLO 200 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 PHARMAGHREB TA Orale 16.920 DT [E]
- GAMOFLO 200 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/14 PHARMAGHREB TA Orale 19.820 DT [E]
- MONOFLOCET 200 MG Comprimé Pelliculé B/2 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 5.000 DT EI
- OFLOCET 200 MG Comprimé Pelliculé B/10 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 27.240 DT [E]
- OFLOCET 200 MG Comprimé Pelliculé B/14 SANOFI AVENTIS PHARMA TUNISIE TA Orale 33.000 DT [E]
- OFLODIS 200 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/20 GALPHARMA TA Orale 24.920 DT [E]
- OFLODIS 200 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/10 GALPHARMA TA Orale 16.500 DT [E]
- OFLOXACINE WINTHROP 200 MG Comprimé Pelliculé B/10 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 16.920 DT [E]

9.1.6. - Sulfamides antibactériens

Le spectre des sulfamides couvre des bactéries Gram+ et Gram-, de même que les chlamydia. De nombreuses souches de ces espèces sont cependant devenues résistantes et l'emploi de sulfamides est dépassé, surtout dans les infections systémiques.

Les sulfamides peuvent provoquer des réactions allergiques avec rash cutané, altérations sanguines et maladie sérique. Une atteinte hépatique ou rénale est peu fréquente. Des syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell dont certains avec issue fatale ont été décrits.

Les associations d'un sulfamide et de triméthoprime n'ont plus que de rares indications, telle la pneumonie à Pneumocystis carinii. Ces associations sont également efficaces dans les infections respiratoires par moraxella et Haemophilus influenzae, mais le risque d'effets indésirables est plus élevé par rapport aux autres médicaments antibactériens. Outre les effets indésirables des sulfamides, il y a risque d'anémie macrocytaire liée à une carence en acide folinique. Les effets indésirables sont encore plus fréquents chez les patients atteints de SIDA. Cependant, le co-trimoxazole joue un rôle important dans la prévention de la pneumonie à Pneumocystis carinii chez ces patients. **Vu l'inhibition de la synthèse de l'acide folinique, un effet tératogène n'est pas à exclure.** Les infections banales des voies urinaires et du système respiratoire ne sont pas des indications.

COTRIMOXAZOLE

- BACTEKOD 240 MG/5 ML Suspension Buvable FL/100 ML SIMED TA Orale 3.210 DT [E]
- BACTRIM 480 MG Comprimé Sécable B/20 TERIAK TA Orale 3.860 DT [E]
- BACTRIM FORTE 960 MG Comprimé Sécable B/10 TERIAK TA Orale 4.300 DT [E]
- BACTRIM NOURRISSONS ET ENFANTS 240 MG/5 ML Suspension Buvable FL/100 ML TERIAK TA Orale 3.530 DT [E]
- COTRIMOX 480 Comprimé b/20 SAIPH TA Orale 2.865 DT [E]
- SULFATRIM 240 MG/5 ML Suspension Buvable FL/100 ML GALPHARMA TA Orale 2.750 DT [E]
- SULFATRIM 480 MG Comprimé Sécable B/20 GALPHARMA TA Orale 2.500 DT [E]

9.1.7. - Tétracyclines

Les tétracyclines sont actives sur des germes Gram+ et Gram- mais avec des taux de résistance très variables. Le spectre couvre aussi les tréponèmes, les borrelia, divers anaérobies mais aussi les rickettsies, *Mycoplasma Pneumoniae* et les *Chlamydia*. De nombreux streptocoques étant résistants, les tétracyclines ne sont pas indiquées dans des angines ou autres infections à streptocoques β-hémolytiques du groupe A, ni dans des pneumonies à pneumocoques. Les *Pseudomonas*, la plupart des *Proteus*, les *Serratia* et le *Mycobacterium Tuberculosis* sont résistants. Dans le traitement du paludisme, la doxycycline et la quinine sont parfois utilisées ensemble.

La résorption de la tétracycline est très variable et fortement influencée par la prise simultanée de nourriture (notamment le lait et les produits lactés) ou de sels de calcium, de magnésium, de fer ou d'aluminium. La résorption de la doxycycline est pratiquement complète sauf en présence de sels de fer. Les tétracyclines sont éliminées par filtration glomérulaire.

Les tétracyclines pénètrent dans les os et les dents au cours de leur croissance, ce qui peut provoquer un ralentissement réversible de la croissance osseuse, une coloration irréversible des dents et éventuellement un risque accru de caries. L'emploi de tétracyclines durant la grossesse et chez les enfants de moins de 8 ans doit être évité.

Les tétracyclines, à l'exception de la doxycycline peuvent aggraver une altération rénale préexistante. Des troubles hépatiques ont été décrits, surtout en présence d'insuffisance rénale et chez des femmes enceintes, et en particulier lors d'injection intraveineuse. En outre, les tétracyclines peuvent provoquer des malaises gastriques, nausées et diarrhées, qui se produisent moins fréquemment avec la doxycycline mieux résorbée. Des ulcères oesophagiens peuvent survenir, surtout après prise incorrecte de doxycycline (par exemple en position couchée, sans boisson). Toutes les tétracyclines peuvent provoquer une photosensibilisation.

Les tétracyclines sont parfois utilisées à une posologie faible pendant plusieurs semaines dans le traitement de certains types d'acné, surtout après échec d'un traitement topique.

DOXYCYCLINE

- DOXY 200 MG Comprimé Sécable B/10 GALPHARMA TA Orale 6.000 DT [E]
- DOXY 100 MG Comprimé Sécable B/20 GALPHARMA TA Orale 6.000 DT [E]
- MONOCLINE 200 MG Comprimé B/10 ADWYA TA Orale 8.350 DT [E]
- TETRADOX 100 MG Comprimé B/10 IBN AL BAYTAR TA Orale 3.760 DT [E]
- TETRADOX 200 MG Comprimé Sécable B/10 IBN AL BAYTAR TA Orale 6.385 DT [E]
- VIBRAMYCINE N 100 MG Comprimé Sécable B/10 PFIZER Pharmaceuticals Tunisie TA Orale 4.810 DT [E]
- VIBRA 200 MG Comprimé Sécable B/8 PFIZER Pharmaceuticals Tunisie TA Orale 7.490 DT [E]

OXYTETRACYCLINE

• OXYTETRACYCLINE 250 MG Comprimé Enrobé B/20 SIPHAT TA Orale 1.940 DT [E]

TETRACYCLINE

• METACYCLINE 250 MG Comprimé Dragéifié B/20 SIPHAT TA Orale 2.085 DT [E]

METHYLENECYCLINE

• PHYSIOMYCINE 300 MG Gélule B/16 DEXO Laboratoires Pharmaceutiques TA Orale 8.361 DT [E]

BROMHEXINE+TETRACYCLINE

• BRONCHOCINE Comprimé Pelliculé B/20 SIPHAT TA Orale 2.200 DT [E]

9.1.8. - Rifamycines

Les rifamycines sont actives sur le Mycobacterium Tuberculosis, les coques Gram+ (à l'exception des entérocoques) et les Neisseria, Chlamydia, Legionella et Brucella. Elles sont modérément actives sur les bactéries Gram-.

Les rifamycines sont surtout éliminées par voie biliaire.

La rifamycine est souvent utilisée lors d'infections des voies biliaires. La rifampicine est réservée en principe au traitement de la tuberculose et est reprise avec les Antituberculeux.

Les rifamycines, à dose élevée, peuvent provoquer des troubles hépatiques. Leur effet inducteur sur les enzymes microsomales peut entraîner de nombreuses interactions avec d'autres médicaments et peut notamment rendre incertaine la contraception hormonale.

RIFAMYCINE

• RIFOCINE 250 MG Solution Injectable B/1/3 ML LEPETIT TA Parentérale 2.186 DT [E]

9.1.9. - Antibiotiques divers

9.1.9.1. - Acide fusidique

L'acide fusidique agit sur les germes Gram+ et les *Neisseria*. Sa seule indication est le traitement des infections à staphylocoques multirésistants. Vu le risque d'une apparition rapide de souches résistantes, l'acide fusidique ne peut être utilisé qu'en association par exemple à l'érythromycine, à la clindamycine ou à la rifampicine.

ACIDE FUSIDIQUE

- AFUSIDIQUE 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 OPALIA PHARMA TA Orale 18.500 DT [E]
- FUCIDINE 250 MG Comprimé Pelliculé B/10 LEO TA Orale 18.500 DT [E]
- FUCIDINE 500 MG Poudre pour Preparation Injectable B/1 + Solvant/10 ML LEO TA Parentérale H [E]
- FUCIDINE 250 MG Suspension Buvable FL/90 ML LEO TA Orale 22.389 DT [E]

9.1.9.2. - Glycopeptides

Les glycopeptides *teicoplanine et vancomycine* sont actifs sur des germes Gram+, surtout les staphylocoques et streptocoques, ainsi que sur le Clostridium difficile. De la résistance, en particulier d'entérocoques et de staphylocoques, a été rapportée.

La teicoplanine et la vancomycine ne sont indiquées que dans le traitement d'infections graves lorsque les β-lactames ne peuvent être utilisées ou lorsque ces infections sont dues à des coques Gram+, en particuler des staphylocoques résistants, des entérocoques et *Streptococcus Viridans* (pas en cas de méningite), ainsi que dans la prévention des endocardites bactériennes chez des malades à risque élevé.

Les glycopeptides sont éliminés principalement par les reins. Sensation de chaleur, prurit et nausées peuvent se manifester au moment de l'injection. Des réactions allergiques, de la néphrotoxicité et de l'ototoxicité peuvent survenir. La teicoplanine semble mieux supportée. Des thrombophlébites sont possibles au site d'injection.

VANCOMYCINE

• VANCO 500 MG Poudre pour Preparation Injectable B/1 Flacon MEDIS TA Parentérale H [E]

TEICOPLANINE

- TARGOCID 200 MG Poudre pour Preparation Injectable FL + Solvant/3.2 ML MERREL SA TA Parentérale H [E]
- TARGOCID 400 MG Poudre pour Preparation Injectable FL + Solvant/3.2 ML MERREL SA TA Parentérale H [E]
- TEICO 200 MG Poudre pour Preparation Injectable FL + Solvant/3.2 ML MEDIS TA Parentérale H [E]
- TEICO 400 MG Poudre pour Preparation Injectable FL + Solvant/3.2 ML MEDIS TA Parentérale H [E]

9.1.9.3. - Fosfomycine

La fosfomycine est active sur des staphylocoques et certains bacilles Gram-. La sélection de mutants résistants est rapide.

FOSFOMYCINE

- FOSFOCINE 4 GR Poudre pour Preparation Injectable B/1+Solvant /20 ML SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Parentérale H [E]
- FOSFOCINE 1 GR Poudre pour Preparation Injectable B/1+Solvant /10 ML SANOFI- AVENTIS FRANCE TA Parentérale H [E]
- MONURYLad.3 G Granules/ susp.buv.b/1 sachet ZAMBON (LAPHAL) TA 18.285 DT [E]

9.1.9.4. - Thiamphénicol

Le spectre du thiamphénicol, comparable à celui du chloramphénicol, englobe des germes Gram+ et Gram-, en particulier des *Salmonella* ainsi que des *Rickettsies*. En raison du **risque de toxicité médullaire**, son utilisation doit être limitée à des infections graves à germes résistants aux autres antibiotiques.

THIAMPHENICOL

- THIOBACTIN 500 MG Comprimé Enrobé B/24 MAPHAR MAROC TA Orale 11.844 DT [E]
- THIOPHENICOL 750 MG Poudre pour Preparation Injectable B/1FL + Solvant/5 ML SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale 1.856 DT [E]

9.1.9.5. - Polymyxines

La colistine est un antibiotique polypeptidique qui peut être responsable d'insuffisance rénale avec des doses importantes supérieures à 10 M UI par 24 heures, habituellement réversible à l'arrêt du traitement.

 COLIMYCINE 1000.000 UI 1 MU Poudre pour Preparation Injectable B/1 FL + Solvant AVENTIS TA Parentérale H [E]

9.1.9.6. - Pristinamycine

La pristinamycine appartient au groupe des synergistines, actives generalement sur les staphylocoques (St.aureus, St.epidermidis), streptocoques, corynbacterium, meningocoques. Elle est indiquée dans le traitement des infections dues aux germes définis comme sensibles, principalement dans leurs manifestations: ORL et stomatologiques, broncho-pulmonaires, génitales (en particulier prostatiques), cutanées, osseuses et articulaires, lorsque ces infections requioèrent une antibiothérapie orale et à l'exclusion des localisations méningées.

PRISTINAMYCINE

• PYOSTACINE 500 MG Comprimés Pélliculés Sécables B/16 AVENTIS TA Orale 15.358 DT [E]

9.1.10. - Antiseptiques urinaires

Tous les agents anti-infectieux qui sont éliminés sous forme active dans les urines peuvent être utilisés dans le traitement des infections des voies urinaires. A cette fin, des doses faibles peuvent généralement être administrées car les concentrations urinaires sont beaucoup plus élevées que celles que l'on obtient dans le sérum et les tissus. Toutefois, dans les infections chroniques et récidivantes, dans la pyélonéphrite et dans les infections urinaires survenant chez l'homme et souvent associées à une prostatite, les doses classiques de médicaments antiinfectieux sont nécessaires et parfois pendant un temps assez long.

Les médicaments repris ici sont exclusivement réservés aux infections des voies urinaires non compliquées. En raison de leur pénétration insuffisante dans les tissus aux doses préconisées, ils ne constituent pas un traitement de choix en cas de prostatite et de pyélonéphrite. Certaines quinolones sont également utilisées exclusivement dans les infections des voies urinaires inférieures; elles sont reprises avec les autres quinolones.

9.1.10.1. - Nitrofuranes

Les nitrofuranes ont un large spectre d'activité tant sur les germes Gram+ que Gram-, et même sur les anaérobies. Le plus sensible est l'Escherichia Coli; les Klebsiella et les enterobacter sont moins sensibles et le Proteus Mirabilis l'est encore moins. Le Pseudomonas Aeruginosa est presque toujours résistant. Les nitrofurannes sont plus actifs en milieu acide (pH < 5,5).

La résistance ne se manifeste que lentement; les nitrofurannes peuvent donc être utilisés pour un traitement à long terme en cas d'infections récidivantes des voies urinaires inférieures. Ce traitement d'entretien peut se faire par l'administration d'une faible dose le soir pendant plusieurs mois. Les nitrofurannes sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale, car dans ces circonstances, ils sont inefficaces (concentration urinaire insuffisante) et dangereux vu leur toxicité systémique, surtout la

neuropathie périphérique. La nitroxoline estdécosillée pendant la grossesse et doit être évitée en cas d'allaitement.

Les effets indésirables les plus fréquents sont: nausées, vomissements et manifestations allergiques; une fibrose pulmonaire et un ictère cholestatique ont été rapportés au cours de traitements prolongés.

NITROFURANTOINE

FURADANTINE 50 MG Gélule B/21 MERCK LIPHA SANTE S.A.S TA Orale 3.169 DT [E]

9.1.10.2. - Nitroxoline

9.1.11. - Antituberculeux

Le traitement de la tuberculose repose sur l'administration quotidienne durant plusieurs mois d'agents tuberculostatiques. Afin d'éviter le développement d'une résistance durant la phase d'instauration du traitement alors que le nombre de bactéries dans les foyers infectieux est très élevé, on recourt le plus souvent à trois voire à quatre principes actifs différents. L'isoniazide et la rifampicine constituent généralement les médicaments de base auxquels peuvent venir s'adjoindre soit le pyrazinamide, soit l'éthambutolet parfois les deux. Dès que la population bactérienne a suffisamment régressé (ce qui est le plus souvent le cas après deux à trois mois) on en revient à la seule association isoniazide - rifampicine.

La totalité de la dose journalière de ces quatre agents antituberculeux sera prise en une fois, le matin avant le petit déjeuner.

9.1.11.1. - Isoniazide

L'isoniazide est presque toujours bien supporté lorsqu'il est administré en monothérapie, comme le montrent les cures prophylactiques données aux enfants après le virage de la réaction à la tuberculine. Les réactions d'hypersensibilité sont très rares. Une neuropathie périphérique, consistant surtout en une paresthésie des jambes et des pieds survient chez 1 à 2% des patients, principalement chez les patients âgés ou à hautes doses. L'administration de pyridoxine (vitamine B₆) à la dose de 20-40 mg par jour prévient ou atténue cet effet indésirable. L'isoniazide peut provoquer des troubles asymptomatiques presque toujours transitoires de la fonction hépatique. Une hépatite grave est rare mais le risque d'une toxicité hépatique augmente avec l'âge, et est accru en cas de prise simultanée de rifampicine.

La dose journalière d'isoniazide est de 5 mg/kg, soit environ 300 mg pour un adulte.

ISONIAZIDE

• ISONIAZIDE 100 MG Comprimé B/100 PHARMA-SCIENCE orale TA 6.075 DT [E]

9.1.11.2. - Rifampicine

La rifampicine doit être réservée au traitement de la tuberculose, en principe en association avec d'autres antituberculeux. Exceptionnellement, elle peut aussi être utilisée dans le traitement des infections à staphylocoques, à *Legionella*, à *Brucella* ou à d'autres germes résistants à divers antibiotiques. Elle a également une place chez l'enfant dans la prophylaxie après contact avec un patient atteint d'une méningite à méningocoque.

Elle est éliminée principalement par le foie et dans une faible proportion par les reins; elle colore l'urine en rouge. L'administration quotidienne de rifampicine est le plus souvent bien tolérée. Au début du traitement, on observe chez 10 à 20% des patients une augmentation des transaminases et de la bilirubinémie, qui disparaît après quelques semaines même lorsque le traitement est poursuivi. La rifampicine peut cependant, dans de rares cas, induire une hépatotoxicité grave; la prise simultanée d'isoniazide accroît le risque d'hépatotoxicité.

Lors de prises intermittentes ou irrégulières de rifampicine, des réactions d'hypersensibilité peuvent se manifester avec fièvre, céphalées, myalgies, malaises (syndrome grippal) qui, exceptionnellement, peuvent être associées à une thrombopénie et une insuffisance rénale.

La rifampicine est un inducteur des enzymes hépatiques et accélère de ce fait la biotransformation de nombreux autres médicaments: anticoagulants oraux, antiépileptiques, contraceptifs, hypoglycémiants oraux, corticostéroïdes.

La dose quotidienne de rifampicine est d'environ 10 mg/kg, généralement 600 mg pour un adulte. Pour les enfants, la dose quotidienne peut être augmentée jusqu'à 20 mg/kg.

Les spécialités à base de Rifampicine sont acquises par commande ferme.

9.1.11.3. - Pyrazinamide

Le pyrazinamide n'est utilisé qu'en association à l'isoniazide et à la rifampicine durant la phase d'attaque du traitement. L'effet indésirable principal est l'augmentation de l'uricémie s'accompagnant chez certains patients d'arthralgies; cet effet disparaît à l'arrêt du traitement. Le pyrazinamide est contre-indiqué chez les patients avec des antécédents de goutte ainsi qu'en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

La dose journalière de pyrazinamide est de 30 mg/kg, la dose maximale chez l'adulte est de 2g.

9.1.11.4. - Ethambutol

L'éthambutol est utilisé au début du traitement en association avec l'isoniazide et la rifampicine dans le but de prévenir l'apparition d'une résistance à ces deux antituberculeux de premier choix dans les foyers fortement infectés. L'effet indésirable principal de l'éthambutol est l'apparition d'une névrite rétrobulbaire avec perte de la perception du rouge-vert, diminution de l'acuité visuelle, scotomes centraux et réduction du champ visuel. Ces manifestations sont en général réversibles en réduisant la dose ou en interrompant le traitement.

La dose journalière usuelle d'éthambutol est de 15 mg/kg en une prise. A une telle posologie, le risque oculaire est faible.

L'ethambutol est disponible sur commande ferme.

9.2. - ANTIMYCOSIQUES

Les antimycosiques sont actifs contre les infections mycosiques superficielles et profondes. Celles-ci sont provoquées par les dermatophytes ou les levures. Elles sont fréquentes et favorisées par l'emploi d'antibiotiques et surtout des traitements à effet immunosuppresseur (cytostatiques, corticostéroïdes).

9.2.1. - Polyènes

Les polyènes sont actifs contre les levures (*Cryptococcus Neoformans, Candida, Torulopsis*), et certains autres champignons (p.ex. *Aspergillus, Blastomyces, Histoplasma*). Ils ne sont pas résorbés par voie orale. La présentation per os est ainsi utilisée pour traiter les mycoses digestives.

Pour atteindre les localisations systémiques, il est nécessaire d'utiliser la voie IV.

L'administration de *l'amphotéricine B* se fait sous forme de perfusion intraveineuse et la dose est progressivement augmentée. Au moment de l'administration, surtout si elle est trop rapide, des frissons, de la fièvre, des nausées et vomissements peuvent se manifester. Une thrombophlébite est possible au site d'injection. Des dyscrasies sanguines, une neuropathie périphérique, des convulsions et une nécrose aiguë du foie ont également été observées. Le principal effet indésirable est la néphrotoxicité qui est fonction de la dose totale et qui peut être contrecarrée par l'administration de chlorure de sodium. Etant donné sa toxicité, l'amphotéricine B ne doit être utilisée que dans des infections graves et généralisées dues à des champignons ou à des levures sensibles. En cas de perfusion trop rapide de doses élevées chez des patients présentant une hypokaliémie et une insuffisance rénale, des arythmies ventriculaires (torsades de pointes) ont été décrites.

AMPHOTERICINE B

- FUNGIZONE 100 MG/ML Suspension Buvable Fl/40ML BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale 4.125 DT^[1]
- FUNGIZONE 50 MG Poudre pour Preparation Injectable B/1 FL Sans Solvant BRISTOL MYERS SQUIBB TA Parentérale H [E]

9.2.2. - Griséofulvine

Active seulement contre les dermatophytes.

GRISEOFULVINE

- GRISEOFULVINE 125 MG Comprimé B/30 SIPHAT TA Orale 1.500 DT [E]
- GRISEOFULVINE 250 MG Comprimé Enrobé B/30 SIPHAT TA Orale 3.010 DT [E]

9.2.3. - Dérivés azoliques

Les imidazoles (miconazole et kétoconazole) et les triazoles (fluconazole, itraconazole et voriconazole) sont actifs contre les dermatophytes et autres champignons.

Le *fluconazole* est indiqué dans le traitement des cryptococcoses neuro-ménigées (efficacité comprarable à celle de l'amphotéricine B); dans les candidoses oro-pharyngées, oesophagiennes, urinaires, vulvovaginales et systémiques (notamment chez les immuno-déprimés) et de la stomatite à candida rebelles aux traitements locaux.

Le choix de la voie d'administration du fluconazole dépend de l'état clinique du patient, la dose étant identique par voie orale ou en perfusion IV.

L'itraconazole est indiqué principalement dans l'aspergillose broncho-pulmonaire et pulmonaire nécrosante y compris chez l'immuno-déprimé, l'aspergillose invasive chez l'immuno-déprimé et l'aspergillome inopérable; et dans les mycoses rares à germe sensible.

Les effets indésirables du fluconazole et de l'itraconazole sont principalement des troubles gastrointestinaux, une éruption cutanée (le plus souvent eczématiforme, parfois de l'urticaire), des céphalées, et une augmentation du taux sérique des enzymes hépatiques rarement associée à des manifestations cliniques.

Le voriconazole n'est indiqué que pour le traitement d'infections systémiques graves à aspergillus, scedosporium ou fusarium, ainsi que dans les candidoses invasives graves résistantes au fluconazole.

Les effets indésirables fréquents du voriconazole sont : fièvre, céphalées, troubles digestifs, élévation des enzymes hépatiques, œdème périphérique, troubles hématologiques, troubles visuels, thrombophlébite au site d'injection.

Le kétoconazole est utile pour le traitement par voie orale de certaines mycoses systémiques sans atteinte méningée, de la candidose muco-cutanée, des onychomycoses chroniques à candida et du pityriasis versicolor. Il ne doit être utilisé dans des infections récidivantes à candida du tube digestif ou du vagin qu'en cas d'échec des traitements classiques. Ses principaux effets indésirables sont: troubles gastro-intestinaux, céphalées, prurit et allergie cutanée, mais surtout des atteintes hépatiques parfois graves. Une diminution des taux sériques de testostérone et de cortisol a été rapportée.

Les dérivés azoliques, surtout le kétoconazole, peuvent inhiber le métabolisme de certains médicaments. L'inhibition du catabolisme du cisapride peut engendrer des torsades de pointes parfois fatales.

FLUCONAZOLE

- DIFLU4 150 MG Gélule B/4 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 39.160 DT [E]
- DIFLUCAN 150 MG Gélule B/1 PFIZER PHARMACEUTICALS TUNISIE TA Orale 11.420 DT [E]
- DIFLUZOL 150 MG Gélule B/1 DAR ESSAYDALI TA Orale 10.605 DT [E]
- DIFLUZOL 150 MG Gélule B/2 DAR ESSAYDALI TA Orale 13.600 DT [E]
- DIFLUZOL 150 MG Gélule B/4 DAR ESSAYDALI TA Orale 26.000 DT [E]
- DIFLUZOL 50 MG Gélule B/7 DAR ESSAYDALI TA Orale 21.920 DT [E]
- FLUCAND 150 MG Gélule B/1 IBN AL BAYTAR TA Orale 9.900 DT [E]
- FLUCAND 150 MG Gélule B/2 IBN AL BAYTAR TA Orale 12.750 DT [E]
- FLUCAND 150 MG Gélule B/4 IBN AL BAYTAR TA Orale 25.000 DT [E]
- FLUCAZOLE 150 MG Gélule B/1 PHARMAGHREB TA Orale 10.000 DT [E]
- FLUCAZOLE 150 MG Gélule B/2 PHARMAGHREB TA Orale 13.000 DT [E]
- FLUCAZOLE 150 MG Gélule B/4 PHARMAGHREB TA Orale 24.990 DT [E]
- FLUCAZOLE 100 MG Gélule B/7 PHARMAGHREB TA Orale 39.900 DT [E]
- FLUCAZOLE 50 MG Gélule B/7 PHARMAGHREB TA Orale 23.950 DT [E]
- FLUCONAZOLE WINTHROP 150MG Gélule B/2WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 12.120 DT [E]
- FLUCONAZOLE WINTHROP 150MG Gélule B/4WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 20.880 DT [E]
- FLUKAS 150 MG Gélule B/1 MEDIS TA Orale 8.480 DT [E]
- FLUKAS 150 MG Gélule B/2 MEDIS TA Orale 12.120 DT [E]
- FLUKAS 150 MG Gélule B/4 MEDIS TA Orale 20.880 DT [E]
- FLUKAS 100 2 MG/ML Solution Injectable FL/50 ML MEDIS TA Parentérale H [E]
- FLUKAS 200 2 MG/ML Solution Injectable FL/100 ML MEDIS TA Parentérale H [E]
- FUNZOL 150 MG Gélule B/1 SAIPH TA Orale 9.000 DT [E]
- FUNZOL 150 MG Gélule B/2 SAIPH TA Orale 13.900 DT [E]
- FUNZOL 150 MG Gélule B/4 SAIPH TA Orale 27.000 DT [E]
- TRIFLUCAN 100 MG Gélule B/60 PFIZER S.A TA Orale H [E]

VORICONAZOLE

- VFEND 200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon PFIZER Ltd TA Orale H [E]
- VFEND 200 MG Comprimé Pelliculé B/14 PFIZER Ltd TA Orale [E]
- VFEND 50 MG Comprimé Pelliculé B/28 PFIZER Ltd TA Orale [E]
- VFEND 40 MG/ML Poudre pour Préparation Injectable Fl/45GR PFIZER Ltd TA Orale H [E]

ITRACONAZOLE

- ITRA GYN 100 MG Gélule B/4 OPALIA PHARMA TA Orale 20.000 DT^[E]
- ITRA SKIN 100 MG Gélule B/28 OPALIA PHARMA TA Orale 74.600DT [E]
- ITRACONAZOL-CIMEX 100MG Gélule B/4 ACINO PHARMA TA Orale 16.095 DT [E]
- ITRACONAZOL-CIMEX 100MG Gélule B/15 ACINO PHARMA TA Orale 41.855 DT [E]
- ITRACONAZOL-CIMEX 100MG Gélule B/30 ACINO PHARMA TA Orale 80.490 DT [E]

9.2.4. - Terbinafine

La terbinafine peut être indiquée par voie orale dans certaines mycoses cutanées graves et dans les onychomycoses (en particulier, celles par dermatophytes), exception faite de certaines candidoses. Les effets indésirables sont principalement de la dysgueusie, des troubles gastro-intestinaux, un rash, un urticaire, et, rarement, une élévation des taux plasmatiques des enzymes hépatiques, avec parfois des atteintes hépatiques graves. Quelques cas de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés.

TERBINAFINE

- LAMISIL 250 MG Comprimé Sécable B/14 TERIAK TC Orale 49.655 DT [E]
- LAMISIL 250 MG Comprimé Sécable B/28 TERIAK TC Orale 79.485 DT [E]
- TALLIS 250 MG Comprimé B/14 OPALIA PHARMA TC Orale 33.370 DT [E]
- TALLIS 250 MG Comprimé B/42 OPALIA PHARMA TC Orale 64.300 DT [E]
- MYCOPHIL 250 MG Comprimé Sécable B/20 GALPHARMA TC Orale 34.080 DT [E]
- MYCOPHIL 250 MG Comprimé Sécable B/30 GALPHARMA TC Orale 49.900DT [E]
- ONYCAL 250 MG Comprimé Sécable B/14 PHARMAGHREB TC Orale 24.000 DT [E]
- ONYCAL 250 MG Comprimé Sécable B/28 PHARMAGHREB TC Orale 47.460 DT [E]
- TERBINAFINE WINTHROP 250 MG Comprimé Sécable B/30 WINTHROP PHARMA TUNISIE TC Orale 45.900 DT [E]
- TERBISIL 250 MG Comprimé Sécable B/14 SIPHAT TC Orale 29.150 DT [E]
- TERBISIL 250 MG Comprimé Sécable B/30 SIPHAT TC Orale 49.500 DT [E]
- TERCYD 250 MG Comprimé Sécable B/15 ADWYA TC Orale 29.000 DT [E]
- TERCYD 250 MG Comprimé Sécable B/30 ADWYA TC Orale 57.300 DT [E]

9.3. - ANTIPARASITAIRES

9.3.1. - Antihelminthiques

Le mébendazole est bien toléré et possède un large spectre d'activité. Il est utilisé dans les infestations par les vers ronds tels Ascaris lumbricoides et Enterobius vermicularis. Les infestations par Ankylostoma duodenale, Necator americanus et Trichuris trichiura peuvent aussi être traitées par le mébendazole mais il est conseillé d'effectuer un contrôle à la fin du traitement pour s'assurer de l'éradication des vers. Des doses élevées de mébendazole ont une certaine activité dans les infestations par vers plats (Taenia). Le mébendazole est contre-indiqué pendant le premier trimestre de la grossesse en raison d'une suspicion de tératogénicité.

En cas d'oxyurose (*Enterobius vermicularis*), aucun médicament n'étant capable de détruire les oeufs qui sont localisés en dehors du corps, par exemple sous les ongles, un second comprimé à 100 mg de mébendazole est préconisé après deux semaines. De plus, le traitement de l'entourage immédiat s'impose pour éviter une réinfestation.

Les effets indésirables des anthelminthiques sont en général bénins et se limitent généralement à de légers malaises gastro-intestinaux.

ALBENDAZOLE

- Z ZOLE 4 G/100 ML Suspension Buvable Fl/10 ML OPALIA PHARMA TC Orale 3.865 DT [E]
- Z ZOLE 400 MG Comprimé Pelliculé Sécable B/1 OPALIA PHARMA TC Orale 3.160 DT [E]

MEBENDAZOLE

VERMOX 100/5 ML Suspension Buvable FL/30 ML PHARMAGHREB TC Orale 3.255 DT [E]

PYRANTEL

- HELMINTOX 250 MG Comprimé Sécable B/3 INNOTECH INTERNATIONAL Orale 2.674 DT [E]
- HELMINTOX 125MG/ML Suspension Buvable Fl/15 ML INNOTECH INTERNATIONAL Orale 2.418 DT [E]

9.3.2. - Antimalariques

Alors que les accès de paludisme provoqués par les Plasmodium vivax, ovale et malariae sont en général bénins et que ces parasites sont en général sensibles à la chloroquine, les accès par Plasmodium falciparum peuvent être mortels et des souches de ce plasmodium résistantes à divers médicaments antimalariques sont de plus en plus souvent décrites. Seules les grandes lignes de la prévention et du traitement du paludisme sont évoquées ici. La posologie du traitement n'est pas mentionnée.

La **prévention** consiste d'abord à prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer le contact avec les anophèles. Celles-ci semblent très efficaces notamment chez les jeunes enfants. Signalons dans ce contexte que les anophèles ne sont actifs qu'entre le coucher et le lever du soleil.

La chloroquine protège contre les accès de fièvre dus aux Plasmodium vivax, P. ovale et P. malariae, mais elle ne peut plus être utilisée seule contre le Plasmodium falciparum, sauf dans les rares pays où il n'y a pas encore de résistance connue. La chloroquine n'empêche cependant pas la contamination par Plasmodium vivax ou ovale, et elle n'agit pas non plus sur les hypnozoïtes (formes hépatiques dormantes) responsables d'accès ultérieurs. La dose est de 300 mg par semaine. Cette dose doit être prise en une seule fois à jour fixe. Pour les enfants, la dose est de 5 mg par kg et par semaine. Le plus souvent, la prophylaxie est entamée une semaine avant le départ, afin de dépister d'éventuels effets indésirables. La prise doit être poursuivie jusqu'à un mois après le retour. Dans les régions où des souches résistantes à la chloroquine sont décrites, l'association du proguanil à la chloroquine ou la prise d'un autre antimalarique est impérieuse. Aux doses utilisées pour la prévention de la malaria, la chloroquine provoque des effets indésirables tels que plaintes gastro-intestinales, prurit, céphalées, troubles de l'accommodation. Elle n'est pas indiquée chez les épileptiques. La chloroquine est aussi utilisée dans le traitement du lupus érythémateux disséminé et de certaines affections inflammatoires.

Le proguanil est exclusivement utilisé en complément à la chloroquine dans la prophylaxie de la malaria (sauf si la chloroquine est contre-indiquée). La posologie adulte est de 200 mg par jour à partir d'une semaine avant le départ et à poursuivre jusqu'à un mois après le retour. A cette dose il n'y a

généralement pas d'effets indésirables, mis à part de légers troubles gastro-intestinaux; éruption cutanée, perte de cheveux et aphtes buccaux ont été rarement observés. Pour les enfants, la dose journalière est d'environ 3 à 4 mg par kg. La résistance au proguanil est répandue en Asie du Sud-Est, et est croissante en Afrique, notamment de l'Est.

Dans certaines circonstances, la doxycycline peut également être indiquée dans la prophylaxie de la malaria.

Dans le **traitement** de la crise malarique, la *chloroquine* ne sera utilisée en monothérapie que lorsque l'infection est causée par des souches de *Plasmodium Vivax*, *Ovale* ou *Malariae* (en cas de *P. Vivax* ou *Ovale*, elle sera toujours suivie par la primaquine afin d'éliminer les formes hépatiques dormantes et d'éviter les rechutes ultérieures), ou lorqu'il s'agit d'une souche de *Plasmodium Falciparum* dans une des rares régions où il n'y a certainement pas de chloroquinorésistance. Tous les autres cas d'infections par le *Plasmodium Falciparum* (il existe en effet un risque réel de résistance à la chloroquine) doivent être traitées par la *quinine* à laquelle on ajoute de la *doxycycline*. En raison du risque accru d'effets indésirables aux doses thérapeutiques.

CHLOROQUINE

• NIVAQUINE 100 MG Comprimé Sécable B/100 SANOFI AVENTIS Orale H [E]

9.3.3. - Autres antiprotozoaires

9.3.3.1. - Dérivés de l'imidazole

Le métronidazole, est utilisé comme antiprotozoaires, notamment contre Trichomonas Vaginalis, Entamoeba Histolytica et Giardia Intestinalis (Lamblia). Le métronidazole est également actif contre les germes anaérobies stricts; le métronidazole est en outre efficace sur Gardnerella Vaginalis. Le métronidazole est également utilisé, en association avec un antibiotique et un inhibiteur de la sécrétion acide gastrique, dans des ulcères gastro-duodénaux avec présence d'Helicobacter Pylori (Médicaments de la pathologie gastrique et duodénale).

Les effets indésirables de ces dérivés de l'imidazole comportent nausées, céphalées et vertiges. Quelques cas de neuropathie périphérique ont été signalés après un traitement de longue durée. Ils exercent un effet de type disulfirame en cas de prise d'alcool. Ils pourraient être tératogènes et mutagènes.

METRONIDAZOLE

- FLAGYL 250 MG Comprimé B/20 WINTHROP PHARMA TUNISIE TA Orale 2.925 DT [E]
- METRONIDAZOLE 4% Suspension Buvable FL/120 ML OPALIA PHARMA TA Orale 3.715 DT [E]
- METRONIDAZOLE BRAUN 0.5% Solution Injectable Poche/100 ML B.BRAUN MEDICAL TA Parentérale H [E]
- PROTOGYL 250 MG Comprimé Pelliculé B/20 SAIPH TA Orale 2.650 DT [E]

9.3.3.2. - Autres : Antimoniate de méglumine

L'antimoniate de méglumine a une activité leishmanicide utilisé dans le traitement de la leishmaniose viscérale (Kala-azar) et de la leishmaniose cutanée (sauf Leishmania Aethiopica résistante).

En raison de la présence des sulfites, ce produit peut éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type anaphylactique.

Les altérations de l'ECG sont fonction de la dose et généralement réversibles ; le plus souvent, une inversion des ondes T et un allongement de l'intervalle QT précèdent l'apparition d'une arythmie grave.

ANTIMONIATE DE MEGLUMINE

• GLUCANTIME 1.500 GR Solution Injectable B/5/5 ML AVENTIS Parentérale 19.885 DT [E]

9.4. - ANTIVIRAUX

9.4.1. - Médicaments contre les virus herpétiques

L'aciclovir est actif contre les virus Herpès Simplex de type I et II, et contre le virus Varicella-Zoster.

Dans le zona, ils pourraient raccourcir la phase douloureuse aiguë et diminuer le risque de névralgie post-herpétique s'ils sont administrés dès les premiers symptômes. On ne sait pas exactement s'il s'agit, dans ces circonstances, de réelles indications. Ce traitement est surtout recommandé chez les personnes âgées et chez les immunodéprimés; dans ce cas, l'aciclovir est souvent administré par voie intraveineuse. Ces médicaments sont aussi utilisés dans la varicelle chez des patients à risque élevé, c'est-à-dire chez les adolescents et les adultes, ainsi que chez les immunodéprimés.

Dans l'herpès labialis, l'administration par voie générale ne se justifie pas sauf en cas de récidives et chez les immunodéprimés. Dans l'herpès génital avec des récidives fréquentes, ils sont utilisés aussi bien à titre curatif que préventif.

Des troubles gastro-intestinaux et du système nerveux central sont décrits, ainsi qu'une détérioration de la fonction rénale. En cas d'administration intraveineuse, des réactions locales peuvent survenir au site d'injection; celles-ci peuvent être graves en cas d'administration extravasculaire.

Le valaciclovir est l'ester de la L-valine et de l'aciclovir qui est l'antiviral actif.

ACICLOVIR

- ACICLOVIR 200 MG Comprimé B/30 OPALIA PHARMA TA Orale 39.550 DT [E]
- ACICLOVIR OPALIA 8 % Suspension Buvable FL/125 ML OPALIA PHARMA TA Orale 48.070 DT [E]
- MEVIROX 500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 Flacon Sans Solvant MEDIS TA Parentérale 16.343 DT [E]
- ZOVIRAX 200 MG Comprimé B/25 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale 43.866 DT [E]

VALACICLOVIR

- ZELITREX 500 MG Comprimé Enrobé B/10 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale 42.063 DT [E]
- ZELITREX 500 MG Comprimé Enrobé B/42 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale 167.890 DT [E]

9.4.2. - Médicaments antiviraux pour l'Hépatite C

La ribavirine est indiquée en association avec les interférons alpha 2a et 2b de l'hépatite C chronique.

RIBAVIRINE

- REBETOL 200 MG Gélule B/84 SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TA Orale H [E]
- REBETOL 200 MG Gélule B/140 SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TA Orale H [E]
- COPEGUS 200 MG Comprimé B/168 ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD SUISSE TA Orale H [E]

9.4.3. - Médicaments antirétroviraux

Les médicaments antirétroviraux sont soit des inhibiteurs de la transcriptase réverse (analogues nucléosidiques ou analogues non nucléosidiques), soit des inhibiteurs de la protéase. Des résistances ont été rapportées avec les différentes classes. Actuellement, en fonction du stade clinique, de la charge virale et du taux plasmatique de lymphocytes CD 4 , le traitement comprend deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse, associés à un inhibiteur de la protéase ou à un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase réverse ("trithérapie"). Les schémas thérapeutiques doivent être adaptés en fonction des éventuels traitements antérieurs qui ont pu induire une résistance. Une observance thérapeutique rigoureuse est indispensable pour limiter le risque de résistance. Ces associations diminuent la fréquence et la gravité des infections opportunistes ainsi que la nécessité d'hospitaliser; leur effet à long terme n'est pas encore connu. Un traitement prophylactique à adapter en fonction du risque de contamination est recommandé en cas d'exposition professionnelle au VIH.

9.4.3.1. - Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse

Administré à la femme enceinte infectée par le VIH, la zidovudine diminue fortement le risque de contamination foetale.

La lamivudine peut être aussi utilisée chez des patients atteints d'une hépatite B chronique active.

L'abacavir est un puissant inhibiteur sélectif, actif sur le VIH-1 et VIH-2, y compris sur des souches VIH-1 ayant une sensibilité réduite à la zidovudine, la lamivudine, la zalcitabine, la didanosine ou la névirapine.

Les effets indésirables des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase réverse sont principalement : troubles gastro-intestinaux, hépatotoxicité (D4T), pancréatite (D4T), anémie (AZT), neuropathie périphérique (D4T) et myopathie (AZT).

LAMIVUDINE

- EPIVIR 10 MG/ML Suspension Buvable FL/240 ML GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale H [E]
- EPIVIR 150 MG Comprimé Pelliculé FL/60 GLAXO WELLCOME UK LIMITED TA Orale H [E]
- ZEFFIX 100 MG Comprimé Pelliculé B/28 GLAXO GROUP Ltd TA Orale H [E]

ZIDOVUDINE

• RETROVIR 100 MG Gélule B/100 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale H [E]

DIDANOSINE

• VIDEX 100 MG Gélule B/60 BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale H [E]

9.4.3.2. - Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase réverse

L'efavirenz est un INNTI du VIH-1. L'efavirenz se lie directement à la transcriptase inverse du VIH-1 et n'inhibe pas de manière significative la transcriptase inverse du VIH-2, ni les ADN polymérases alpha, ß, gamma ou delta cellulaires.

EFAVIRENZ

• STOCRIN 200 MG Gélule FL/90 MSD LIMITED ENGLAND TA Orale [E]

9.4.3.4. - Association d'antiretroviraux

Le ritonavir inhibe le métabolisme du lopinavir et augmente donc les concentrations plasmatiques du lopinavir. La CE50 antivirale in vitro du lopinavir est environ 10 fois inférieure à celle du ritonavir. L'activité antivirale de Kaletra est, par conséquent, due au lopinavir qui est un antiprotease.

RITONAVIR+LOPINAVIR

• KALETRA Capsule Molle FL/180 ABBOTT LABORATORIES S.A (Pty) Ltd TA Orale H [E]

10. - IMMUNITE

10.1. - VACCINS ET IMMUNOGLOBULINES

10.1.1. - Vaccins

Les vaccins sont administrés pour obtenir une immunisation active: le contact de l'antigène présent dans le vaccin provoque une réponse immunitaire humorale (pouvant être évaluée par la mesure du taux d'anticorps) et une réponse immunitaire cellulaire (pas d'évaluation possible en routine). L'antigène administré est soit un agent pathogène (virus ou bactérie) vivant affaibli, soit un organisme tué ou des constituants de celui-ci.

Une allergie à un des constituants d'un vaccin peut être une contre-indication. Toute vaccination par des virus ou des bactéries vivants atténués est contre-indiquée pendant la grossesse chez les patients atteints d'une déficience immunitaire (hypo - ou agammaglobulinémie, leucémie ou lymphome) ou immunodéprimés (traitement par des immunosuppresseurs, des corticostéroïdes à doses élevées ou par radiothérapie), et chez les patients atteints d'une tuberculose active non traitée ou du SIDA. En cas d'épidémie, on peut cependant être amené à vacciner lorsqu'il s'agit d'un germe particulièrement dangereux pour la femme enceinte non immune; le vaccin contre la rubéole et le vaccin contre la varicelle ne peuvent jamais être administrés pendant la grossesse.

les principaux effets indésirables sont, parfois : une fièvre, un érythème douloureux ou une induration au site d'injection, pouvant persister quelques jours.

Lorsque des vaccins ne peuvent pas être mélangés, ils peuvent toutefois être administrés au même moment, mais en des sites distincts. Les vaccins à base de virus vivants peuvent être administrés soit au même moment, soit à un intervalle de 4 semaines.

Lorsque des immunoglobulines ont été administrées au cours des trois derniers mois, la vaccination peut être moins efficace, et il est souvent préférable de reporter la vaccination ou de revacciner ultérieurement.

Les vaccins injectables sont en principe injectés par voie intramusculaire ou sous-cutanée, mais le vaccin contre la tuberculose est administré par voie intradermique. Les vaccins contenant de l'aluminium, tels ceux contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite A et l'hépatite B doivent être administrés par voie intramusculaire.

10.1.1.1.- Vaccins antiviraux

Les vaccins antiviraux sont constitués soit de virus vivants moins virulents (atténués) ou de virus inactivés, soit d'antigènes extraits de virus ou obtenus par génie génétique.

La durée de l'immunité après administration d'un vaccin est variable; le degré de l'immunité peut souvent être évalué par la détermination du taux d'anticorps. Après vaccination avec des virus atténués, tout contact avec le virus naturel peut stimuler la formation ultérieure d'anticorps.

10.1.1.1.1. - Vaccin contre la poliomyélite

Le vaccin injectable contient des poliovirus inactivés mais le vaccin oral est à base de virus vivants atténués.

La primo-vaccination contre la poliomyélite se fait de préférence par le vaccin combiné hexavalent polidiphtérie-tétanos-coqueluche-Hib-hépatite B.

VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE

• IMOVAX POLIO Suspension Injectable B/1 Serg/0.5 ml SANOFI PASTEUR SA Parentérale H [E]

10.1.1.1.2. - Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons

Ce vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons contient des virus vivants atténués.

La vaccination contre la rougeole peut être utile dans les 72 heures après un contact avec une personne contaminée. Ensuite, seules des immunoglobulines peuvent avoir encore un effet, mais elles doivent être administrées dans les six jours suivant le contact; dans ce cas, la vaccination sera postposée de 3 mois.

La grossesse ou la possibilité d'une grossesse dans les 4 semaines suivant la vaccination en ce qui concerne la rubéole est une contre indication.

VACCIN ANTIROUGEOLE

• ROUVAX Poudre pour Préparation Injectable FL+SER/0.5 ML PASTEUR MERIEUX Parentérale H [V]

VACCIN ANTIRUBEOLE

• RUDIVAX Poudre pour Préparation Injectable FL+SER/0.5 ML PASTEUR MERIEUX Parentérale H [V]

VACCIN R+O+RU

• PRIORIX Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+SER/0.5 ML+2 Aiguilles GSK Parentérale H [I]

10.1.1.1.3. - Vaccin contre l'influenza

Le vaccin contre l'influenza contient les deux glycoprotéines membranaires des virus influenza A et influenza B : l'hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). On désigne les souches par un sigle reprenant les caractères antigéniques des protéines, leur origine géographique et leur date d'isolement.

Chez l'homme, on connaît pour l'influenza A trois sous-types principaux d'antigène H (H1 à H3) et deux sous-types d'antigène N (N1, N2). Les variations subies par les antigènes H et/ou N sont soit radicales (shift), soit plus fréquemment mineures (drift).

La composition des vaccins est régulièrement adaptée conformément aux prescriptions de l'Organisation Mondiale de la Santé.

VACCIN ANTIGRIPPE

- VAXIGRIP Solution Injectable B/1 SER/0.5 ML SANOFI PASTEUR SA Parentérale 12.852 DT [I]
- INFLUVAC Suspension Injectable SER/0.5 ML ABBOTT PRODUCTS Parentérale 12.620 DT [I]
- FLUARIX Suspension Injectable B/1 SER/0.5 ML GALAXOSMITHKLINE BIOLOGICAL SA Parentérale 12.620 DT [I]

10.1.1.1.4. - Vaccin contre l'hépatite A

Le vaccin contre l'hépatite A est constitué de virus inactivés. L'immunité acquise après l'administration de deux doses persisterait pendant au moins 20 ans, peut-être même toute la vie. Ce vaccin est indiqué pour l'immunisation active contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite A. Le vaccin ne

protège pas contre l'infection provoquée par les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'hépatite E ou par d'autres agents pathogènes connus du foie.

VACCIN CONTRE DE L'HEPATITE A

- HAVRIX 1440 Adulte 1440 Unités ELISA Suspension Injectable B/1 SER/1 dose/1 ML GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A Parentérale H [I]
- HAVRIX 720 Pédiatrique Suspension Injectable B/1 SER/1 dose/1 ML GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A Parentérale H [I]

10.1.1.1.5. - Vaccin contre l'hépatite B

Ce vaccin est constitué de l'antigène HBs obtenu par génie génétique. En raison de la morbidité et de la mortalité associées à l'hépatite B, la vaccination systématique est recommandée chez les nourrissons et les adolescents. Pour la vaccination de base, il est préférable d'utiliser le vaccin hexavalent. On admet que la vaccination offre une protection à vie contre la maladie et le portage chronique lorsqu'un taux d'anticorps d'au moins 10 UI/l est atteint.

La vaccination est surtout recommandée pour tous les sujets exposés, à risque élevé de contamination par le virus de l'hépatite B.

VACCIN CONTRE L'HEPATITE B

- HEBERBIOVAC HB 10 µG Solution Injectable FL/0.5 ML CIGB Parentérale 1.833 DT [V]
- HEBERBIOVAC HB 20 µG Solution Injectable FL/1ML CIGB Parentérale 3.495 DT [V]
- HEPAVAX-GENE 10 μG Solution Injectable B/1/0.5 ML BERNA BIOTECH LIMITED Parentérale 3.236 DT [V]
- HEPAVAX-GENE 20 μG Solution Injectable B/1/1ML BERNA BIOTECH LIMITED Parentérale 4.126 DT [V]
- SHANVAC B 10 μG Solution Injectable B/1/0.5 ML SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED Parentérale 1.157 DT [V]
- SHANVAC B 20 μG Solution Injectable B/1/0.5 ML SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED Parentérale 1.957 DT [V]

10.1.1.1.6. - Vaccin contre la rage

Le vaccin contient le virus inactivé. Le vaccin antirabique est indiqué soit pour la vaccination de préexposition (avant risque possible d'exposition à la rage) soit pour le traitement de postexposition (après exposition connue ou possible à la rage).

Les recommandations nationales et/ou de l'OMS concernant la prévention de la rage doivent être prises en compte.

VACCIN ANTIRABIQUE

• RABIPUR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+ amp sol + ser/2ML NOVARTIS H [E]

10.1.1.1.7. - Vaccin contre la varicelle

Ce vaccin est constitué de virus vivants atténués. Il est utilisé dans l'immunisation active pour la prévention de la varicelle chez les sujets âgés de 12 mois et plus.

La grossesse ou la possibilité d'une grossesse dans les 12 semaines suivant la vaccination est une contre-indication.

10.1.1.1.8. - Vaccin anti-rotavirus

• ROTARIX Solution Buvable B/1Fl + Ser de solvant GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICAL S.A Orale 72.176 DT ^[E]

10.1.1.1.9. - Vaccin anti-papillomavirus

 CERVARIX 20μG/20μG Suspension injectable Ser.pré-remp. B/1/0.5ML GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICAL S.A TA Parentérale 88.234 DT ^[E]

10.1.1.2.- Vaccins antibactériens

10.1.1.2.1. - Vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et les infections à Hib

Les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et les infections à Hib sont discutés séparément, même lorsqu'il n'existe pas de vaccin monovalent.

Vaccin contre le tétanos

Le vaccin contre le tétanos est constitué d'anatoxine tétanique inactivée.

Vaccin contre la diphtérie

Le vaccin contre la diphtérie est constitué d'anatoxine diphtérique inactivée. Ce vaccin n'est disponible qu'en association. A partir de 12 ans, on utilise, afin de réduire le risque de réactions généralisées, un vaccin contre la diphtérie avec une quantité réduite en anatoxine diphtérique (au moins 2 UI d'anatoxine diphtérique au lieu d'au moins 30 UI d'anatoxine diphtérique).

Vaccin contre la coqueluche

Il existe deux types de vaccin contre la coqueluche: le vaccin classique cellulaire, constitué d'une suspension de bactéries inactivées, et le vaccin acellulaire, constitué d'antigènes spécifiques du *Bordetella Pertussis*.

Vaccin contre l'Heamophillus influenzae type b

Ce vaccin est préparé à partir d'un polysaccharide capsulaire de l'*Haemophilus Influenzae* type b conjugué à une protéine. La vaccination est préconisée pour la prévention des infections graves provoquées par l'*Haemophilus Influenzae* type b, principalement les méningites et les épiglottites.

VACCIN HIB

• QUIMI-HIB 10µg Poudre pour Préparation Injectable FL + SER/0.5 ML CIGB CUBA Parentérale H [I]

Vaccins polyvalents

Le vaccin hexavalent est le premier choix pour la primo-vaccination des nourrissons contre le tétanos(T), la diphtérie(D), la coqueluche(C), l'Hib, la polio et l'hépatite B.

Les vaccins avec une quantité réduite en anatoxine diphtérique sont indiqués pour la primo-vaccination et les injections de rappel à partir de l'âge de 12 ans.

Le vaccin tétanos-diphtérie ou le vaccin tétanos-diphtérie-polio peut être utilisé chez les nourrissons chez qui la vaccination contre la coqueluche est contre-indiquée. Ces vaccins ont une quantité réduite en anatoxine diphtérique de sorte que la protection contre la diphtérie peut être incomplète.

VACCIN D+P+T

• DT POLIO Suspension Injectable SER/0.5 ML PASTEUR MERIEUX Parentérale [E]

VACCIN D+T+C

 VACCIN DTP (DTC) ADSORBE Suspension Injectable B/50FL/5 ML/10 Doses SERUM INSTITUTE OF INDIA Parentérale H [E]

VACCIN D+T+C+P

TETRAXIM Solution Injectable SER/0.5 ML PASTEUR MERIEUX Parentérale 34.387 DT [V]

VACCIN D+T+C+P+HIB

- * INFANRIX IPV-HIB Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL + SER/0.5 ML Dose GLAXO SMITH KLINE Biologicals S.A Parentérale 53.657 DT [V]
- PENTAXIM Suspension Injectable B/1FL+ Ser/0.5 ML PASTEUR MERIEUX Parentérale 53.264 DT [V]

10.1.1.2.2. - Vaccin contre les infections à méningocoques

Vaccin contre les infections à méningocoques du sérogroupe AC

Le vaccin monovalent, préparé par conjugaison du polysaccharide antigénique du méningocoque C et d'une protéine porteuse, induit une bonne réponse immunitaire, même chez les très jeunes enfants. La durée de protection exacte n'est pas encore connue et le schéma de vaccination dépend de l'âge.

La méningite à méningocoque du groupe A est très endémique dans les régions sous-sahariennes.

Vaccin contre les infections à méningocoques les sérogroupes A, C, W et Y.

Le vaccin à base de polysaccharides capsulaires des méningocoques des sérogroupes A, C, W et Y a une durée de protection limitée (pas plus de 3 à 5 ans) et n'a qu'un faible pouvoir immunogène chez les personnes immunodéprimées et chez les jeunes enfants.

 MENCEVAX ACWY Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+S/0.5ML Glaxo Smith KLine Biologicals S.A Parentérale H [I]

10.1.1.2.3. - Vaccin contre les infections à pneumocoques

Il s'agit d'un vaccin polysaccharidique contre 23 types de pneumocoques administré à partir de l'âge de 2 ans.

VACCIN ANTI- PNEUMOCOCCIQUE

- PNEUMO 23 SuspensionInjectable SER/0.5 ML SANOFI PASTEUR SA TA Parentérale H [1]
- PREVENAR 13 Suspension Injectable B/1FL/0.5ML WYETH LEDERLE VACCINES TA Parentérale H [I]
- SYNFLORIX Suspension Injectable B/1Dose GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS SA TA Parentérale HIII

10.1.1.2.4. - Vaccin contre la tuberculose : B.C.G

Ce vaccin contient des bactéries vivantes atténuées. Le vaccin offre une protection d'environ 50% pendant 10 à 15 ans. La grossesse est une contre-indication principale.

MYCOBACTERIUM BOVIS

 B.C.G VACCINE SSI Poudre pour Préparation Injectable FL/10 DOS + S/1 ML STATENS SERUM INSTITUT Parentérale 22.059 DT [V]

10.1.1.2.5. - Vaccin contre la fièvre thyphoïde

Malgré la faible incidence de cette maladie et les possibilités de traitement, la vaccination reste indiquée avant un séjour de plus de 3 semaines (même dans de bonnes conditions) dans une région où la maladie est restée endémique (surtout l'Afrique du Nord et du Nord-Ouest, l'Inde et le Pérou).

La protection apparaît à partir de la troisième semaine après la vaccination, persiste au moins 3 ans et elle n'est pas complète.

VACCIN CONTRE LA FIEVRE THYPHOIDE

 TYPHERIX 25 μG Solution Injectable SER/0.5 ML GLAXO SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A Parentérale 15.434 DT ^[I]

10.1.2. - Immunoglobulines

Les préparations d'immunoglobulines contiennent surtout des IgG, anticorps les plus réactifs; s'y retrouvent aussi des IgA, des IgM et d'autres protéines plasmatiques en petites quantités.

Les immunoglobulines humaines spécifiques, appelées aussi hyperimmunes, sont préparées à partir du plasma de convalescents ou de sujets récemment immunisés par vaccination.

L'effet protecteur des immunoglobulines ne dure jamais plus longtemps que quelques mois, parfois quelques semaines seulement.

Les immunoglobulines peuvent être à l'origine de réactions anaphylactoïdes: rares, surtout chez des malades atteints de déficiences immunitaires.

10.1.2.1. - Immunoglobulines polyvalentes

Les immunoglobulines humaines polyvalentes, appelées aussi immunoglobulines standard, contiennent divers anticorps antiviraux et antibactériens en quantités variables, ainsi que des antitoxines tétaniques et diphtériques.

Ces immunoglobulines polyvalentes sont indiquée dans le traitement de substitution; tel que l'agammaglobulinémies, et hypogammaglobulinémies sévères ou encore dans le cadre d'un traitement immunomodulateur; Purpura thrombopénique idiopathique et syndrome de kawasaki.

IMMUNOGLOBULINE HUMAINE POLYVALENTE

- INTRATECT 2.5GR Pdre p Prép Inj FL + S/50 ML + set de transfert BIOTEST Phar TA Parentérale H [E]
- KIOVIC 2.5GR/25ML Sol. P. Perf BAXTER TA Parentérale H [E]
- TEGELINE 5GR Poudre P. Prep. Injectable FL + S/100 ML + set de transfert LFB TA Parentérale H [E]

10.1.2.2. - Immunoglobulines spécifiques

10.1.2.2.1. - Immunoglobulines spécifiques contre l'hépatite B

Ces immunoglobulines sont efficaces si elles sont administrées dans les premières heures ou les premiers jours après un contact avec l'antigène HBs. Le vaccin peut être administré en même temps en un site distinct.

Elles sont inutiles chez ceux qui possèdent l'antigène HBs ou des anticorps contre l'hépatite B.

IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI HBS

- IMMUNO HBS IM KEDRION 540UI/ML Sol Inje FL/3 ML TA Parentérale H [E]
- IMMUNO HBS IM KEDRION 180UI/ML Sol Inje FL/1 ML TA Parentérale H [E]

10.1.2.2.2. - Immunoglobulines spécifiques contre le tétanos

Ce sont des immunoglobulines G spécifiques contre la toxine de *Clostridium Tetani* qui présentent les mêmes caractéristiques que les anticorps physiologiques spécifiques du tétanos.

Les immunoglobulines humaines antitetanique sont indiquées dans la prophylaxie du tétanos en cas de plaie souillée chez les sujets dont la vaccination est incomplète, trop ancienne ou inconnue et dans le traitement du tétanos déclaré.

L'efficacité de l'élimination et (ou) de l'inactivation virale reste cependant limitée vis-à-vis de certains virus non enveloppés particulièrement résistants.

IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTITETANIQUE

• TETAGAM P 250 UI SOL INJECTABLE B/1 SER/1ML CSL BEHRING TA Parentérale 27.629 DT [E]

10.1.2.2.3. - Immunoglobulines anti-D

Ces immunoglobulines sont extraites du sang de femmes Rhésus (Rh) négatives immunisées. Elles sont utilisées pour prévenir l'allo-immunisation foetomaternelle Rh(D) chez les femmes Rh(D)-négatif ainsi que le traitement des sujets Rh(D)-négatif après transfusions incompatibles de sang Rh(D)-positif ou d'autres produits contenant des hématies Rh(D)-positif.

L'administration intramusculaire d'immunoglobulines anti-D peut provoquer l'apparition d'une douleur et d'une sensibilité locales au point d'injection.

Une hyperthermie, un malaise, des céphalées, des réactions cutanées et des frissons peuvent occasionnellement se produire.

IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI RHO

WINRHO SDF 300 μG Poudre pour Préparation Injectable FL + S/8.5 ML CANGENE Parentérale H [E]

10.2. - IMMUNOMODULATEURS ET IMMUNOSUPPRESSEURS

10.2.1. - Immunomodulateurs

Les interférons appartiennent au groupe des cytokines et ont des propriétés antivirales, antiprolifératives, antiangiogéniques et immunomodulatrices.

Les *interférons* β -1b et β -1a réduisent la fréquence et la gravité des poussées chez certains patients atteints de sclérose en plaques avec alternance de poussées et de rémissions ; aucun effet sur le degré de l'handicap à long terme n'a été établi.

INTERFERON BETA-1A

- AVONEX 6 MUI Poudre pour Préparation Injectable B/4 Fl + SER/1 ML BIOGEN Idec Ltd TA Parentérale H [E]
- REBIF 22 μG 6 MUI Solution Injectable B/12 SER/0.5 ML SERONO EUROPE TA Parentérale H [E]
- REBIF 44 μG 12 MUI Solution Injectable B/12 SERONO EUROPE TA Parentérale H [E]
- REBIF 22 μG 6 MUI Solution Injectable B/4 Cartouches /1.5 ML SERONO EUROPE TA Parentérale H [E]
- REBIF 44 μG 12 MUI Solution Injectable B/4 Cartouches/1.5ML SERONO EUROPE TA Parentérale H [E]

PEGINTERFERON ALPHA 2B

- VIRAFERONPEG 120 μG/0.5 ML Poudre pour Préparation Injectable B/1Stylo pré-rempli SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TA Parentérale H [V]
- VIRAFERONPEG 100 μG /0.5ML Poudre pour Préparation Injectable B/1 Stylo pré-rempli SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TA Parentérale H [V]
- VIRAFERONPEG 80 μG /0.5ML Poudre pour Préparation Injectable B/1 Stylo pré-rempli SCHERING-PLOUGH EUROPE BELGIQUE TA Parentérale H [V]

PEGINTERFERON ALFA 2A

- PEGASYS 180 μ G /ML Solution Injectable B/1FL/1ML ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD SUISSE TA Parentérale H $^{[V]}$
- PEGASYS 135 μG /ML Solution Injectable B/1FL/1ML ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD SUISSE TA Parentérale H [V]

10.2.2. - Immunosuppresseurs

Les immunosuppresseurs sont utilisés dans les maladies auto-immunes, l'arthrite rhumatoïde, le syndrome néphrotique, les glomérulonéphrites chroniques et les transplantations d'organe. Les corticostéroïdes et la plupart des agents antitumoraux ont une action immunosuppressive. Les effets indésirables de la plupart des antitumoraux sont trop prononcés pour permettre leur emploi comme immunosuppresseurs.

La ciclosporine, un polypeptide, est utilisée pour la prévention et le traitement des phénomènes de rejet du greffon, et exceptionnellement, dans certaines maladies auto-immunes telles le psoriasis et l'arthrite rhumatoïde. Des effets indésirables graves tels l'hypertension artérirlle et l'atteinte rénale sont possibles; ce risque est accru en cas d'association à d'autres médicaments néphrotoxiques. La ciclosporine présente des interactions avec de nombreux médicaments. Les substances qui inhibent le métabolisme de la ciclosporine tels les antimycosiques azoliques (fluconazole, itraconazole, miconazole et kétoconazole), le cisapride, les macrolides clarithromycine et érythromycine, et le jus de pamplemousse font augmenter ses concentrations sanguines. Les substances qui accélèrent son métabolisme telles la phénytoïne, la rifampicine et le millepertuis peuvent faire diminuer ses concentrations sanguines. Le contrôle régulier des taux sanguins s'impose.

Le *tacrolimus* est utilisé pour la prévention et le traitement des épisodes de rejet aigu lors de transplantation d'organes. Les effets indésirables du tacrolimus sont l'hypertension artérielle, la néphrotoxicité, l'hépatotoxicité et le diabète.

CICLOSPORINE

- EQUORAL 100 MG/ML Solution Buvable FL/50 ML IVAX-CR a.s TA Orale H [V]
- EQUORAL 100 MG Capsule Molle B/50 IVAX-CR a.s TA Orale H [V]
- EQUORAL 50 MG Capsule Molle B/50 IVAX-CR a.s TA Orale H [V]
- EQUORAL 25 MG Capsule Molle B/50 IVAX-CR a.s TA Orale H [V]
- SANDIMMUM 50 MG Solution Injectable B/10/1 ML NOVARTIS PHARMA S.A.S TA Prentérale H [V]
- SANDIMMUM 250 MG Solution Injectable B/10/5 ML NOVARTIS PHARMA S.A.S TA Prentérale H IVI

MYCOPHENOLATE

• MMF 500 MG Comprimés Pellicules B/56 MEDIS TA Orale 164.220 DT [V]

TACROLIMUS

- PROGRAF 1 MG Gélule B/100 HIKMA PHARMACEUTICALS TA Orale H [V]
- PROGRAF 5 MG Gélule B/100 HIKMA PHARMACEUTICALS TA Orale H [V]

10.3. - ALLERGENES

Les allergènes sont indiqués pour les allergies de type I de la classification de Gell et Coombs, se manifestant notamment par rhinite, conjonctivite, rhinoconjonctivite, asthme, de caractère saisonnier ou perannuel. L'objectif de l'immunothérapie spécifique est, lorsque les facteurs étiologiques ont été clairement identifiés, de prévenir les conséquences cliniques de la rencontre de l'organisme sensibilisé avec l'allergène considéré.

ALLERGENES

- STALORAL 10.100.300 IR/ML Gouttes Buvables C/3 FL/10 ML(10 ou 100 ou 300 IR) STALLERGENES S.A. Orale [C]
- STALORAL 300 IR/ML Gouttes Buvables C/1 FL/10 ML (300IR) STALLERGENES S.A. Orale [C]

EXTRAITS ALLERGENIQUES

ALUSTAL 0.01 à 10 IR ou IC/ML Suspension Injectable FL/5 ML STALLERGENES S.A. Parentérale [C]

11. - TUMEURS

Ce chapitre reprend:

- les agents alkylants
- les antimétabolites
- les intercalants
- les poisons du fuseau
- les stabilisants du fuseau
- divers anticancéreux

En addenda, figurent les facteurs hématopoïétiques ainsi que les cytoprotecteurs. Les hormones et antihormones utilisées comme antinéoplasiques sont décrites dans le chapitre *Hormones sexuelles et autres médicaments du système hormonal.*

Les médicaments antitumoraux peuvent être responsables d'effets indésirables graves. La dépression de la moelle osseuse favorise des infections graves et provoque une thrombopénie; des contrôles sanguins réguliers sont donc nécessaires. La destruction des cellules néoplasiques peut entraîner une hyperuricémie que l'allopurinol permet éventuellement de corriger. Nausées, vomissements et diarrhée sont fréquents. L'alopécie est d'apparition fréquente. La chimiothérapie est dangereuse pour l'embryon et le fœtus; au cours du traitement une méthode de contraception efficace sera préconisée chez les femmes en âge de procréer. Avec les agents alkylants, une atteinte parfois irréversible de la fonction ovarienne ou de la spermatogenèse est souvent observée; chez l'homme, elle conduit dans de nombreux cas à la stérilité. Plusieurs de ces médicaments sont très irritants localement et peuvent provoquer des nécroses lors d'injection paraveineuse. Les principaux effets indésirables propres à chaque groupe ou à chacun de ces médicaments sont mentionnés aux rubriques respectives.

L'emploi des médicaments antitumoraux relève du spécialiste. Les indications, la posologie et le mode d'emploi de ces médicaments ne sont donc pas repris ici.

11.1. - AGENTS ALKYLANTS

Ces substances possèdent des groupements alkyles hautement réactifs qui se lient à certaines biomolécules et en particulier à l'ADN. Elles inhibent ainsi la multiplication cellulaire, principalement dans les tissus à activité mitotique élevée.

Selon leur structure chimique, on les divise en moutarde à l'azote et dérivés (cyclophosphamide, ifosfamide), en nitroso-urées (carmustine) et en autres composés appartenant à des classes chimiques variées. Les agents alkylants ont aussi des propriétés immunosuppressives.

Ces médicaments peuvent provoquer une atteinte de la fonction ovarienne et de la spermatogenèse ainsi qu'une fibrose pulmonaire ; ils sont tératogènes et cancérogènes.

CARBOPLATINE

• CARBOPLATIN EBEWE 150 MG Solution Injectable FL/15 ML EBEWE Pharma TA Parentérale H [V]

CISPLATINE

- CISPLATINE MERCK 25 MG Solution Injectable B/1FL/25 ML MERCK GENERIQUES TA Parentérale H [V]
- CISPLATIN-EBEWE 25 MG Solution Injectable FL/50 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]

OXALIPLATINE

- XALIPLAT 50 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL RICHMOND TA Parentérale H [V]
- XALIPLAT 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL RICHMOND TA Parentérale H [V]
- ELOXATINE 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale H [V]
- ELOXATINE 50 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL SANOFI-AVENTIS FRANCE TA Parentérale H [V]
- OXALIPLATINE ACTAVIS 5MG/ML (50MG) Poudre pour Préparation Injectable B/1FL ACTAVIS TA Parentérale H [V]
- OXALIPLATINE ACTAVIS 5MG/ML (100MG) Poudre pour Préparation Injectable B/1FL ACTAVIS TA Parentérale H [V]

CYCLOPHOSPHAMIDE

- ENDOXAN 500 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL BAXTER ONCOLOGY GmbH TA Parentérale H [V]
- ENDOXAN 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL BAXTER ONCOLOGY GmbH TA Parentérale H [V]
- ENDOXAN 200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL BAXTER ONCOLOGY GmbH TA Parentérale H [V]

CARMUSTINE

 BICNU IV 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL+ Solvant BRISTOL MYERS SQUIBB TA Parentérale H [V]

IFOSFAMIDE

• HOLOXAN 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL Sans Solvant BAXTER ONCOLOGY GmbH TA Parentérale H [V]

MITOMYCINE

 AMETYCINE 10 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 FL Sans Solvant SANOFI-AVENTIS France TA Parentérale H ^[V]

BUSULFAN

• MYLERAN 2 MG Comprimé Enrobé FL/25 THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED TA Orale H [V]

11.2. - ANTIMETABOLITES

Les antimétabolites interfèrent avec la synthèse des acides nucléiques.

Outre les effets indésirables communs à tous les cytostatiques, les antimétabolites peuvent causer une anémie mégaloblastique, des lésions du foie et du tube digestif (stomatites, ulcérations buccales et parfois gastro-intestinales).

AZATHIOPRINE

• IMUREL 50 MG Comprimé Sécable B/100 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale H [V]

CYTARABINE

- ARACYTINE 100 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 + Solvant/5 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- ARACYTINE 1 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H ^[V]

FLUOROURACILE

- 5-FLUOROURACIL 250 MG Solution Injectable B/5/5 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- FLUOROURACILE MERCK 250 MG Solution Injectable B/1/5 ML MERCK GENERIQUES TA Parentérale H ^[V]

MERCAPTOPURINE

PURINETHOL 50 MG Comprimé Sécable FI/25 GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Orale H [V]

METHOTREXATE

- EBETREXAT 2.5 MG Comprimé FL/50
 EBEWE PHARMA
 TA Orale 9.161 DT^[V]
- EBETREXAT-EBEWE 5000 MG Solution Injectable FL/5ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H^[V]
- METHOTREXAT 2.5 MG Comprimé Sécable FL/20 SANOFI AVENTIS FRANCE TA Orale 7.177DT[V]
- METHOTREXAT MYLAN 100 MG/ML Solution Injectable B/10 FL/50 ML (perfusion) MYLAN S.A.S TA Parentérale H [V]
- METHOTREXAT MYLAN 50 MG/2 ML Solution Injectable B/10 FL/2ML MYLAN S.A.S TA Parentérale H IVI
- METHOTREXAT MYLAN 25 MG/ML Solution Injectable B/10 FL/20 ML (perfusion) MYLAN S.A.S TA Parentérale H [V]
- METHOTREXAT MYLAN 5 MG/2 ML Solution Injectable B/10 FL/2 ML MYLAN S.A.S TA Parentérale [V]

GEMCITABINE

- GEMCITABINE ACTAVIS 200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL ACTAVIS TA Parentérale HIVI
- GEMCITABINE ACTAVIS 1G Poudre pour Préparation Injectable B/1FL ACTAVIS TA Parentérale H [V]
- GEMCITABINE EBEWE 10MG/ML 200 MG Solution Injectable B/1FL EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- GEMCITABINE EBEWE 10MG/ML 1000 MG Solution Injectable B/1FL EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- GEMCITABINE HOSPIRA 200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL HOSPIRA TA Parentérale HIVI
- GEMCITABINE HOSPIRA 1G Poudre pour Préparation Injectable B/1FL HOSPIRA TA Parentérale H [V]
- GEMZAR IV 1 GR Poudre pour Préparation Injectable B/1FL SS LILLY FRANCE TA Parentérale H [V]
- GEMZAR IV 200 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL SS LILLY FRANCE TA Parentérale H [V]

HYDROXYCARBAMIDE

• HYDREA 500 MG Gélule B/20 BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale 4.945 DT [V]

11.3. – INTERCALANTS

Les dérivés de la camptothécine (irinotecan) sont des inhibiteurs de la topoisomérase entrainant des coupures de l'ADN, dont les toxicités limitantes principales sont une neutropénie dose-dépendante et une diarrhée parfois sévère. L'irinotécan est utilisé dans le traitement du cancer colorectal métastasé après échec du traitement standard.

Les antibiotiques de la famille des anthracyclines (doxorubicine, epirubicine, idarubicine...) agissent comme des agents intercalants. Ils sont largement utilisés malgré leur toxicité cardiaque (moindre pour l'epirubicine). Le traitement nécessite une surveillance très stricte, notamment cardiologique, hématoloique et hépatique.

L'étoposide est un inhibiteur de la topo-isomérase-II ; c'est un dérivé semi-synthétique de la podophyllotoxine qui est utilisé dans certaines maladies néoplasiques du sang et dans certaines tumeurs solides.

IRINOTECAN

- CAMPTO 100 MG/5 ML Solution Injectable B/1FL/5 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- CAMPTO 40 MG/2 ML Solution Injectable B/1FL/2 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- IRINOTESIN 100 MG/5 ML Solution Injectable B/1FL/5ML ACTAVIS TA Parentérale H IVI
- IRINOTESIN 40 MG/2 ML Solution Injectable B/1FL/2ML ACTAVIS TA Parentérale H IVI

DOXORUBICINE

- ADRIBLASTINE 10 MG Solution Injectable B/1Fl PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- ADRIBLASTINE 50 MG Solution Injectable B/1Fl PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- DOXORUBICIN EBEWE 10 MG Solution Injectable B/1/5 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H IVI

EPIRUBICINE

- EPIRUBICINE EBEWE 2 MG/ML Solution pour perfusion B/1FL/5 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- EPIRUBICINE EBEWE 2 MG/ML Solution pour perfusion B/1FL/25 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- FARMORUBICINE 50 MG/25ML Solution Pour Perfusion B/1FL PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]
- FARMORUBICINE 10 MG/5ML Solution Pour Perfusion B/1FL PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H DT [V]

IDARUBICINE

• ZAVEDOS 10 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1FL de Lyophilisat PFIZER HOLDING FRANCE TA Parentérale H [V]

ETOPOSIDE

• ETOPOSIDE MYLAN 100 MG Solution Injectable B/10/5 ML MYLAN S.A.S TA Parentérale H [V]

11.4. – LES POISONS DU FUSEAU

Les alcaloïdes de la pervenche (vinca rosea) bloquent la mitose en métaphase; ils ont les effets indésirables habituels des cytostatiques, mise à part la dépression médullaire qui est moins prononcée; ils peuvent être en outre responsables d'asthénie, de troubles visuels, de constipation et parfois d'iléus

paralytique ainsi que de polynévrite. La toxicité neurologique s'observe surtout avec la vincristine. Une sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique a également été signalée.

VINCRISTINE

• VINCRISTINE RICHTER 1 MG Poudre pour Préparation Injectable B/1 + Solvant/10 ML GEDEON RICHTER TA Parentérale H [V]

VINORELBINE

- NAVELBINE 50 MG Solution Injectable B/10/5 ML PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Parentérale H [V]
- NAVELBINE 10 MG Solution Injectable B/10/1 ML PIERRE FABRE MEDICAMENT TA Parentérale H [V]

11.5. –LES STABILISANTS DU FUSEAU

Les taxanes agissent par un mécanisme différent des autres poisons du fuseau ce qui permettrait de contourner la résistance de certains cancers aux autres anticancéreux.

L'administration doit être réalisée sous surveillance médicale en raison du risque de survenue de réaction anaphylactique sévère (en particulier lors des 1^{ère} et 2^{ème} perfusion).

Le docétaxel et le paclitaxel sont des agents antimicrotubules. Ils sont utilisés dans le traitement de carcinomes mammaires localement avancé ou métastasiques. Le paclitaxel est également utilisé seul ou associé au cisplatine dans le traitement de carcinomes métastasiques de l'ovaire.

DOCETAXEL

- TAXOTERE 20 MG Poudre Poudre pour Préparation Injectable B/1FL/0.5 ML + Solvant/1.5 ML SANOFI-AVENTIS TA Parentérale H [V]
- TAXOTERE 80 MG Poudre Poudre pour Préparation Injectable B/1FL/2 ML + Solvant /6 ML SANOFI-AVENTIS TA Parentérale H [V]

PACLITAXEL

- EBETAXEL 30 MG Solution pour perfusion B/1FL/5 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H IVI
- EBETAXEL 100 MG Solution pour perfusion B/1FL/16.7 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]
- EBETAXEL 150 MG Solution pour perfusion B/1FL/25 ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [V]

11.6. - **DIVERS**

L' *imatinib* est un inhibiteur puissant de la tyrosine kinase métabolisé par le CYP 3A4. Il est indiqué dans le traitement des patients atteints de LMC Ph+ nouvellement diagnostiquée, en phase chronique après échec du traitement par l'interféron alpha, ou en phase accélérée ou en crise blastique. Il est également indiqué chez l'adulte dans le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales.

Le *rituximab* est un anticorps monoclonal se liant spécifiquement à l'antigène CD20 des lymphocytes B ce qui entraine la lyse des lymphocytes avec une réponse prolongée (au moins 9 mois) dans 50% des cas. Il est indiqué dans le traitement de patients avec lymphome folliculaire et lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules.

IMATINIB

- GLIVEC 400 MG Comprimé Pelliculé B/30 NOVARTIS EUROPHARM LIMITED R.U TA Orale H [V]
- GLIVEC 100 MG Comprimé Pelliculé B/30 NOVARTIS EUROPHARM LIMITED R.U TA Orale H [V]

RITUXIMAB

- MABTHERA 100 MG/10ML Solution Injectable B/2FL/10 ML ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD SUISSE TA Parentérale H [V]
- MABTHERA 500 MG/50ML Solution Injectable B/1FL/50 ML ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) LTD SUISSE TA Parentérale H [V]

11.6. - ADDENDA : FACTEURS HEMATOPOÏETIQUES ET CYTOPROTECTEURS

Les facteurs hématopoïetiques sont utilisés pour réduire la neutropénie induite par un traitement cytostatique ou immunosuppresseur ; ils sont aussi indiqués dans certains cas de neutropénie idiopathique ou congénitale et dans la transplantation de moelle osseuse. L'objectif est de réduire le risque et la durée des infections en augmentant le nombre de neutrophiles.

L'érythropoïétine est décrite dans le chapitre Autres médicaments du système hormonal.

Le mesna (uromitexan) est un protecteur vésical indiqué pour la prévention de la toxicité vésicale des oxaphosphorines (cyclophosphamide, ifosfamide).

MESNA

• UROMITEXAN 400 MG Solution Injectable B/5/4 ML BAXTER ONCOLOGY GmbH TA Parentérale H IVI

LENOGRASTIM

 GRANOCYTE 34 263 μG Poudre pour Préparation Injectable B/5FL + Solvant/1 ML SANOFI-AVENTIS INTERCONTINENTAL TA Parentérale H ^[V]

12. - ANESTHESIQUES

Seules les spécialités injectables enregistrées auprès du Ministère de la Santé Publique sont mentionnées ci-dessous. Le midazolam est repris avec les benzodiazépines. Ces médicaments ne sont employés qu'en milieu hospitalier. Les modes d'utilisation, les posologies et effets indésirables ne sont donc pas indiqués.

12.1. - PARALYSANTS NEUROMUSCULAIRES

ATRACURIUM

- ATRACURIUM 25 MG Solution Injectable B/50/2.5 ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- ATRACURIUM 50 MG Solution Injectable B/50/5 ML MEDIS TA Parentérale H [V]
- CURARIUM 25 MG Solution Injectable B/50/2.5 ML DORCAS TA Parentérale H [V]
- CURARIUM 50 MG Solution Injectable B/50/5 ML DORCAS TA Parentérale H [V]

CISATRACURIUM

- NIMBEX 2 MG/ML Solution Injectable B/5 AMP/5 ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale H IVI
- NIMBEX 5 MG/ML Solution Injectable FI/30 ML GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Parentérale IVI

ROCURONIUM BROMURE

• ESMERON IV 50 MG Solution Injectable B/12/5 ML ORGANON N.V HOLLANDE TA Parentérale H [V]

12.2. - GAZS ANESTHESIQUES

HALOTHANE

• ANESTANE 100% Solution Pour Inhalation FL/250 ML HIKMA PHARMACEUTICALS TA Inhalation H [V]

ISOFLURANE

- FLORAN 100% Solution Pour Inhalation FL/100 ML HIKMA PHARMACEUTICALS TA Inhalation H [V]
- FORENE 100 ML Solution Pour Inhalation FL/100 ML ABBOTT TA INHALATION H [V]

12.3. – ANESTHESIQUES INTRAVEINEUX

PROPOFOL

- PROPOFOL FRESENIUS 10 MG/ML Emulsion Injectable B/10/50 ML FRESENIUS KABBI TA Parentérale H [V]
- PROPOFOL LIPURO 20 MG/ML Emulsion Injectable B/1/20 ML B.BRAUN MELSUNGERS AG TA Parentérale H [V]

THIOPENTAL

- THIOPENTAL 0.5 GR-ROTEXMEDICA Poudre pour Préparation Injectable B/50 FL Sans Solvant ROTEXMEDICA GMBH TA Parentérale H [V]
- THIOPENTAL 1 GR-ROTEXMEDICA Poudre pour Préparation Injectable B/50 FL Sans Solvant ROTEXMEDICA GMBH TA Parentérale H [V]

ALFENTANIL

• RAPIFEN 1 MG Solution Injectable B/5/2 ML JANSSEN-CILAG TB Parentéral H [V]

FENTANYL

- FENTANYL MEDIS 0.1 MG/2 ML Solution Injectable B/10/2 ML MEDIS TB Parentérale H [V]
- FENTANYL MEDIS 0.5 MG/10 ML Solution Injectable B/10/10 ML MEDIS TB Parentérale H [V]
- FENTANYL RENAUDIN 100 μG G/2 ML Solution Injectable B/10/2 ML RENAUDIN TB Parentérale Η [V]

REMIFENTANIL

- ULTIVA 1 MG Poudre pour préparation Injectable B/5 FL GLAXOSMITHKLINE SpA TB Parentérale H [V]
- ULTIVA 5 MG Poudre pour préparation Injectable B/5 FL GLAXOSMITHKLINE SpA TB Parentérale H IVI

SUFENTANIL

- SUFENTA 50 µg/10 ML Solution Injectable B/10/10 ML JANSSEN-CILAG TB Parentérale H IVI
- SUFENTA 10 μg/2 ML Solution Injectable B/5/2 ML JANSSEN-CILAG TB Parentérale H [V]

13. - MINERAUX, VITAMINES ET TONIQUES

13.1. - MINERAUX

13.1.1. - Fer

Dans la plupart des cas d'anémie ferriprive, la prise de fer par voie orale suffit. A cette fin, on utilise une préparation dont le fer est le seul principe actif. L'acide ascorbique est parfois associé au fer dans le but d'améliorer la résorption. L'organisme peut assimiler environ 100 mg de fer élément par jour; pour les préparations simples reprises dans la liste ci-dessous, la quantité de fer élément est donnée.

Lors du traitement d'une carence en fer, il faut tenir compte du fait que les réserves de l'organisme en cet élément doivent être reconstituées; ceci peut prendre de 3 à 6 mois. Dans certains cas, par exemple après gastrectomie, la prise de fer devra même être continue.

Les effets indésirables de la thérapeutique martiale sont: troubles digestifs et constipation ou diarrhée. Le fer, par voie orale, noirci les fèces. Les préparations solubles peuvent provoquer une coloration réversible des dents. La prise après le repas diminue le risque de troubles gastro-intestinaux mais entrave la résorption. Un surdosage en fer peut entraîner une intoxication grave, spécialement chez les enfants.

Durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse, la prise systématique de fer est indiquée souvent en association avec de l'acide folique. Cette association est reprise ci-dessous. Les autres associations contenant du fer sont décrites dans le chapitre *Toniques*: elles ne conviennent pas au traitement de l'anémie ferriprive.

13.1.1.1. - Spécialités à usage oral

FER

- FER PLUS Solution Buvable FL/60 ML avec mesurette OPALIA PHARMA TC Orale 4.435 DT [E]
- FER PLUS Solution Buvable FL/250 ML avec mesurette OPALIA PHARMA TC Orale 15.040 DT [E]
- FER UCB Ampoules Buvables B/14/5ML UCB PHARMA SA Orale 9.206 DT [E]
- FUMAFER 200 MG Comprimé Pelliculé B/100 ADWYA Orale 3.100 DT [E]
- FUMAFER 100 MG/GR Poudre pour Solution Orale FL/50 GR ADWYA Orale 1.950 DT [E]
- TARDYFERON 80 MG Comprimé Pelliculé B/30 PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION TUNISIE Orale 4.205 DT [E]

FER+ACIDE FOLIQUE

- FEFOL 150 MG Gélule B/30 ADWYA Orale 3.335 DT [E]
- TARDYFERON B9 50 MG Comprimé Enrobé B/30 PIERRE FABRE Orale 3.235 DT [E]

FEREDETATE DE SODIUM

- HYMOFER 34MG /5MLsrp.flt/125ml WEST PHARMA TC Orale 3.760DT [E]
- HYMOFER 34MG /5MLsrp.flt/250ml WEST PHARMA TC Orale 6.340DT [E

13.1.1.2. - Spécialités à usage parentéral

FER

• IV-FER 100 MG/5ML Solution Injectable B/5/5 ML MEDIS Parentérale 29.909 DT [E]

13.1.1.3. - Chélateurs du fer

La déferoxamine forme des chélates solubles avec les ions ferriques. Elle est utilisée dans les intoxications martiales et dans certaines maladies caractérisées par une accumulation de fer.

La déféripone est utilisée chez les patients pour lesquels un traitement par la déféroxamine est contreindiqué ou s'accompagne d'une toxicité sévère.

DEFEROXAMINE

• DESFERAL 500 MG Poudre pour Preparation Injectable B/10 NOVARTIS PHARMA SUISSE TA Parentérale H [V]

DEFERIPRONE

• FERRIPROX 500 MG Comprimé Pelliculé Sécable FL/100 APOTEX EUROPE Ltd TA Orale H [V]

13.1.2. - Fluor

L'usage local de fluorure au niveau des dents diminue l'incidence des caries. Jusqu'à l'âge de 6 ans, un dentifrice pour enfants (max. 500 ppm de fluorure) doit être utilisé. A partir de 6 ans, un dentifrice ordinaire (1.000 à 1.500 ppm de fluorure) peut être utilisé.

Le schéma préventif suivant peut être proposé:

- à partir de la première poussée dentaire: un brossage par jour (le soir) avec un dentifrice pour enfants;
- enfants de 2 à 6 ans: deux brossages par jour (matin et soir) avec un dentifrice pour enfants;
- enfants de plus de 6 ans et adultes: trois brossages par jour (matin, midi et soir) avec un dentifrice ordinaire.

13.1.3. - Sels de calcium

Le calcium est employé comme adjuvant dans la prophylaxie et le traitement de l'ostéoporose; les doses utilisées varient de 0,5 à 1,5 g de calcium élément par jour. Chez les personnes âgées, une augmentation de la prise de calcium permet de ralentir la perte osseuse; c'est pourquoi des suppléments de 0,5 à 1 g par jour sont généralement recommandés dans l'objectif d'obtenir un total de 1.5 g par jour par l'alimentation et la prise d'un supplément. L'administration de calcium en association à de la vitamine D (environ 800 U.I. par jour) diminue le risque de fractures ostéoporotiques, en particulier le risque de fracture de la hanche chez des femmes âgées vivant en institution. Après prise de doses élevées de calcium, des troubles gastro-intestinaux ont parfois été observés. Un traitement concomitant avec des diurétiques thiazidiques et des préparations à base de vitamine D augmente le risque d'hypercalcémie.

Le chlorure de calcium peut être proposé dans les manifestations allergiques aiguës ou accidents anaphylactiques en traitement adjuvant des thérapeutiques spécifiques.

Un gramme de calcium élément correspond à 2,5 g de carbonate, 15,5 g de glucobionate ou 7,8 g de gluconolactate de calcium.

CALCIUM

- ADCAL 500 MG Granules Effervescents B/20 Sachets SAIPH Orale 3.735 DT [E]
- CALCIUM SANDOZ 500 MG Comprimé Effervescent T/20 SANDOZ Orale 4.065 DT [E]
- CALCIFAST 500 MG Comprimé à Croquer Fl/30 WEST PHARMA Orale 3.780 DT [E]
- CALPEROS 500 MG Comprimé à Sucer B/30 ADWYA Orale 4.135 DT [E]
- CHLORURE DE CALCIUM 10% Solution Injectable B/10FL/5 ML UNIMED Parentérale 2.495 DT [E]
- CHLORURE DE CALCIUM 10% Solution Injectable B/10FL/10 ML UNIMED Parentérale 2.690DT [E]
- CHLORURE DE CALCIUM 10% Solution Injectable B/100 FL/5 ML UNIMED Parentérale [E]
- CHLORURE DE CALCIUM 10% Solution Injectable B/100FL/10 ML UNIMED Parentérale [E]
- DENSICAL 600 MG Comprimé à Croquer FL/60 ZAMBON FRANCE Orale 9.845 DT [E]
- GLUCONATE DE CALCIUM Ampoules Buvables B/100/10 ML SIPHAT Orale 6.700 DT [E]
- GLUCONATE DE CALCIUM 10 % Solution Injectable B/100/10 ML AGUETTANT Parentérale [E]
- OROCAL 500 MG Comprimé à Croquer TUBE DE 60 THERAMEX Orale 8.140 DT [E]

CALCIUM+VITAMINE C

- CALCEMIL Poudre pour Solution Orale B/10 Sachets SAIPH Orale 2.180 DT [E]
- UPSA C CALCIUM Comprimés Effervescents T/10 BMS-UPSA TN SAID Orale 1.655 DT I^Q

CALCIUM+VITAMINE D

• FIXICAL VIT D3 500 MG Comprimé à Sucer b/60 EXPANSCIENCE Orale 6.410 DT [E]

13.1.4. - Sels de magnésium

L'administration de magnésium ne se justifie qu'en présence de carence magnésique avérée.

MAGNESIUM

- MAG 2 100 MG Comprimé B/60 COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE Orale 8.234 DT [I]
- MAGNESIUM TERIAK 100mg Comprimé B/60 TERIAK Orale 5.500 DT [1]
- MAGNESIUM GLYCOCOLLE LAFARGE Comprimé Pelliculé B/50 S.E.R.P. MONACO Orale 5.774 DT [1]
- MEGAMAG Gélule B/40 MAYOLY SPINDLER Orale 5.774 DT [1]
- MG 2 PLUS Solution Buvable B/20 sachets-dose /10 ML OPALIA PHARMA Orale 7.525 DT [I]
- SULFATE DE MAGNESIUM 15% Solution Injectable B/50/10 ML AGUETTANT Parentérale H [C]

MAGNESIUM+VITAMINE B6

• UVIMAG B6. 0.500 GR Ampoules Buvables C/20/10 ML SIPHAT Orale 10.408 DT [I]

13.1.5. - Sels de phosphore

Le phosphore est employé dans le cas de rachitisme hypophosphorémique, diabète phosphaté héréditaire ou acquis ou encore en cas d'hypercalciurie accompagnée d'une fuite urinaire de phosphates ou d'une hypophosphatémie avec ou sans lithiase calcique associée.

L'apport phosphorique peut être à l'origine d'une hypercalcémie et d'une insuffisance rénale.

PHOSPHORE

• PHOCYTAN Solution Injectable B/50/20 ML AGUETTANT Parentérale H [E]

13.2. - VITAMINES

Une carence en vitamine D peut se rencontrer chez des nourrissons trop peu exposés au soleil, surtout en cas de sous-alimentation; une carence en vitamine D et vitamine B₁₂ est fréquente chez les personnes âgées. Une carence en acide folique peut se rencontrer durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. Dans des situations pathologiques telles la malabsorption, une carence en vitamine A, D, K, B₁₂ et en acide folique peut survenir; dans d'autres affections, la carence vitaminique se limite souvent à une ou deux vitamines. L'administration de vitamines et d'oligo-éléments est indiquée dans la nutrition parentérale totale. Il est établi que la prise d'acide folique avant la conception et dans la période qui l'entoure peut diminuer le risque d'anomalies congénitales au niveau du tube neural.

Pour certaines vitamines, le surdosage peut donner lieu à une intoxication; c'est en particulier le cas pour les vitamines A et D.

Les spécialités ont été classées en fonction des vitamines qu'elles contiennent. Viennent d'abord, les spécialités qui ne contiennent qu'une seule vitamine suivies, le cas échéant, d'associations classiques. Les associations multiples de vitamines viennent ensuite. Le chapitre *Toniques* reprend également des spécialités qui contiennent des vitamines. Les préparations contenant de la vitamine K sont reprises dans le chapitre *Antihémorragiques*. Les préparations de vitamines associées à des principes actifs tels des analgésiques sont reprises dans les chapitres concernés.

Les vitamines sont considérées officiellement comme des denrées alimentaires ("nutriments") dans la mesure où la dose journalière recommandée se situe dans des limites proches des besoins journaliers.

Les apports journaliers recommandés (AJR) en certaines vitamines sont repris ci-dessous

- Rétinol (vitamine A): 0,8 mg
- Thiamine (vitamine B₁): 1,4 mg
- Riboflavine (vitamine B₂): 1,6 mg
- Nicotinamide (vitamine B₃): 18 mg
- Dexpanthénol (vitamine B₅): 6 mg
- Pyridoxine (vitamine B₆): 2 mg
- Cyanocobalamine (vitamine B₁₂): 1 μg
- Acide folique: 0,2 mg
- Acide ascorbique (vitamine C): 60 mg
- Calciférol (vitamine D): 5 μg
- α-tocoférol (vitamine E): 10 mg
- Biotine (vitamine H): 0,15 mg

13.2.1. - Thiamine (vitamine B1)

Une carence en thiamine (vitamine B₁ ou aneurine) est fréquente dans l'alcoolisme chronique avec nutrition déficiente et est parfois accompagnée d'une carence en d'autres vitamines du groupe B. La thiamine est parfois utilisée à doses élevées, sans beaucoup d'arguments, dans le traitement d'affections douloureuses.

Les formes graves de déficience en thiamine, surtout l'encéphalopathie de Wernicke, nécessitent un traitement parentéral.

VITAMINE B1

• VITAMINE B1 100 MG Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT Parentérale 1.630 DT [C]

13.2.2. - Vitamine B12

Cette dénomination recouvre une série de cobalamines naturelles et semi-synthétiques dont l'hydroxocobalamine et la cyanocobalamine. Dans l'organisme, la vitamine B_{12} se retrouve sous forme de cobalamide.

La carence en vitamine B₁₂ (le plus souvent due à des troubles de la résorption chez les personnes âgées) peut entraîner une anémie macrocytaire et des troubles neurologiques (anémie pernicieuse). Ce tableau clinique peut passer inaperçu lorque le malade a reçu une association contenant e.a. de l'acide folique ou de la vitamine B₁₂. L'anémie pernicieuse est traitée classiquement par des injections intramusculaires de cyanocobalamine ou d'hydroxocobalamine. Un schéma thérapeutique possible consiste en l'administration i.m. d'une dose initiale de 1 mg tous les 2 à 3 jours jusqu'à un total de 6 mg, puis de 1 mg i.m. tous les 2 mois comme dose d'entretien.

VITAMINE B12

• VITAMINE B12 1000 1000 μG Solution Injectable B/4/1 ML SIPHAT Parentérale 1.660 DT [E]

HYDROXOCOBALAMINE

- HYDROXOCOBALAMINE 5000 Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT Parentérale 2.088 DT [E]
- HYDROXOCOBALAMINE 10 000 Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT Parentérale 2.621 DT [E]
- HYDROXOCOBALAMINE 20 000 Solution Injectable B/4/2 ML SIPHAT Parentérale 3.813 DT [E]

13.2.3. - Acide folique

La carence en acide folique, lors de troubles de la résorption, durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse et lors de traitement chronique à la phénytoïne, peut donner lieu à une anémie macrocytaire. Le traitement d'une telle carence fait appel à des préparations à usage oral à raison de 0,5 à 2 mg p.j. L'acide folique ne peut être utilisé pour le traitement de l'anémie pernicieuse car il ne corrige que l'anémie et non les troubles neurologiques. Des doses élevées d'acide folique peuvent masquer une carence en vitamine B_{12} .

L'administration d'acide folique avant la conception et dans la période qui l'entoure peut diminuer le risque d'anomalies congénitales au niveau du tube neural.

- En prévention primaire, toutes les femmes doivent augmenter l'apport d'acide folique de 0,4 mg par jour pendant les 8 semaines qui précèdent la conception jusque et y compris le 2ème mois de la grossesse. Même si on recommande une alimentation saine, cela ne suffit pas pour atteindre la quantité requise d'acide folique. Il n'existe pas de médicament à base d'acide folique sous une forme prédosée à 0,4 mg; il peut être prescrit en préparation magistrale et est disponible sous forme de nutriment.
- En prévention secondaire, c'est-à-dire aux femmes qui ont déjà mis au monde un enfant atteint d'une anomalie du tube neural, une dose de 4 mg par jour doit être donnée aux alentours de la conception.

Chez les femmes traitées par des antiépileptiques, une dose de 4 mg doit aussi être utilisée aux alentours de la conception.

L'association acide folique-fer, préconisée durant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse, est reprise avec les associations à base de fer.

ACIDE FOLIQUE

• FOLICUM 5 MG Comprimé B/20 JULPHAR Orale 1.203 DT [E]

13.2.4. - Acide folinique

L'acide folinique et son isomère actif l'acide lévofolinique sont utilisés dans le traitement de l'anémie macrocytaire due à une déficience en acide folinique. Ils sont aussi utilisés pour diminuer les effets toxiques du méthotrexate. Ils sont administrés quelques heures après le méthotrexate pour ne pas annihiler les effets antitumoraux.

FOLINATE DE CALCIUM

- CALCIUMFOLINAT-EBEWE 30 MG Solution Injectable B/5/3ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [E]
- CALCIUMFOLINAT-EBEWE 100 MG Solution Injectable B/5/10ML EBEWE PHARMA TA Parentérale H [E]
- FOLINATE DE CALCIUM AGUETTANT 50 MG Poudre P.Prep.Injectable B/10 FL AGUETTANT TA Parentérale H [E]

13.2.5. - Associations de vitamines B

Associations de vitamine B1 et/ou B6 et/ou B12

La vitamine B_1 à dose élevée est souvent associée aux vitamines B_6 et B_{12} . Ces préparations sont proposées, sans beaucoup d'arguments, dans des névrites et des algies d'origines diverses.

ARGININE CHLORHYDRATE+VITAMINE B1+VITAMINE B6

• ARGINO B Comprimé Pelliculé B/24 ADWYA Orale 2.740 DT [C]

VITAMINE B1+VITAMINE B12+VITAMINE B6

• TRI-B Comprimé Enrobé B/30 SIPHAT Orale 2.983 DT [C]

13.2.6. - Acide ascorbique (vitamine C)

L'utilité de l'acide ascorbique dans les refroidissements et autres affections n'est pas établie.Il est, toutefois utilisé dans le traitement d'appoint de l'asthénie fonctionnelle.

Des doses élevées de vitamines C sont responsables de diarrhée et favorisent chez des personnes prédisposées l'apparition de calculs d'oxalate.

ACIDE ASCORBIQUE

- ACIDE ASCORBIQUE A 10 POUR CENT RENAUDIN 500 MG Solution Injectable B/100/5ML RENAUDIN Parentérale H [C]
- CEMIL 1000 MG Poudre Orale Effervescente B/10 sachets SAIPH Orale 1.565 DT [C]

- UPSA C 1 GR Comprimé Effervescent B/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 1.370 DT ICI
- VITAMINE C 500 MG Comprimé B/20 SIPHAT Orale 1.065 DT [C]
- VITAMINE C IPS 500 MG Comprimé à Croquer Boite /20 IPS Orale 2.000 DT [C]
- VITAMINE C UPSA 500 MG Comprimé à Croquer Boite /20 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 2.205 DT [C]
- VITAMYL 1G Comprimé Effervescent Boite /10 IPS Orale 1.305 DT [C]
- VITASCORBOL SS TAMPONNE 500 MG Comprimé à Croquer Boite/2T/12 IBN ALBAYTAR Orale 2.400 DT ICI

ACIDE ASCORBIQUE+CALCIUM

UPSA C CALCIUM Comprimé Effervescent T/10 BMS-U P S A-TUN-SAID Orale 1.575 DT [C]

13.2.7. - Vitamines D et dérivés

La vitamine D est indiquée notamment dans la prévention et le traitement du rachitisme et de l'ostéomalacie, ainsi que dans le traitement symptomatique de certains cas d'hypoparathyroïdie. Dans le rachitisme dû à une carence en vitamine D, la dose thérapeutique est de 3.000 à 5.000 UI p.j., mais en cas de malabsorption, des doses beaucoup plus élevées peuvent être nécessaires. Chez les enfants, une dose de 400 UI p.j. est donnée à titre prophylactique jusqu'à l'âge d'un an, ou plus longtemps chez les enfants à risque; en cas de carence, une dose journalière de 10.000 UI pendant 30 à 60 jours est nécessaire. La vitamine D à faible dose (environ 800 UI p.j., en association avec des suppléments calciques) peut jouer un rôle dans la prophylaxie des fractures consécutives à une ostéoporose sénile.

Le calcifédiol ou 25-hydroxy-vitamine D₃est un métabolite de la vitamine D formé par le foie et hydroxylé une nouvelle fois dans le rein en calcitriol(1,25-dihydroxy-vitamine D₃) responsable de l'activité de la vitamine D. L'alfacalcidol ou 1α-hydroxy-vitamine D₃ est un dérivé synthétique qui se transforme en calcitriol au niveau du foie. L'alfacalcidol est utilisé dans la prévention et le traitement de l'ostéodystrophie rénale en cas d'insuffisance rénale au stade terminal, la biotransformation dans cet organe n'étant alors plus nécessaire. Ils sont aussi utilisés dans le traitement de l'hypoparathyroïdie dans laquelle l'hydroxylation rénale de la vitamine D est diminuée. L'alfacalcidol est également proposé dans le traitement de l'ostéoporose. Un contrôle de la calcémie s'impose, principalement lors d'un traitement avec l'alfacalcidol.

L'intoxication à la vitamine D et à ses dérivés peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, un état de stupeur, de la constipation et des calcifications tissulaires.

VITAMINE D

 VITAMINE D3 B.O.N Solution Injectable B/1 Ampoule/1 ML BOUCHARA-RECORDATI TC Parentérale 2.100 DT [E]

ERGOCALCIFEROL

STEROGYL 2 MUI/100 ML Gouttes Buvables FL/20 ML DESMA PHARMA TC Orale 2.860 DT [E]

ALFACALCIDOL

- UN-ALFA 1 μG Solution Injectable B/10/0.5 ML LEO TA Parentérale H [E]
- UN-ALFA 1 µG Capsule Molle B/30 LEO TA Orale 15.875 DT [E]
- UN-ALFA 0.250 μG Capsule Molle B/30 LEO TA Orale 5.308 DT [E]

ERGOCALCIFEROL+CALCIUM GLUCONATE+CALCIUM LACTATE

- FRUBIOSE CALCIQUE FAIBLE Ampoules Buvables C/20/5ML SIPHAT Orale 5.539 DT [C]
- FRUBIOSE CALCIQUE FORTE Ampoules Buvables B/20/5ML SIPHAT Orale 5.705 DT [C]

13.2.8. - Alphatocoférol (vitamine E)

Actuellement, l'intérêt se porte davantage sur les propriétés anti-oxydantes de la vitamine E que sur l'activité qu'elle exercerait sur la fonction de reproduction. L'utilité de suppléments en vitamine E n'est pas prouvée.

VITAMINE E

- VITAMIN E 100 MG Capsule Molle B/50 NOVENTIS Orale 5.550 DT [E]
- VITAMIN E 200 MG Capsule Molle B/60 NOVENTIS Orale 8.330 DT [E]

13.2.9. - Associations

Les spécialités regroupées ici contiennent plusieurs vitamines.

Dans nos régions, l'utilisation de telles préparations ne s'indique qu'exceptionnellement. La posologie n'est dès lors pas mentionnée. Celles qui contiennent plus de 10 000 UI de rétinol sont à proscrire, surtout pendant la grossesse.

POLYVITAMINES

- CERNEVIT Poudre pour Préparation Injectable B/10 FL + Solvant/5 ML CLINTEC BENELUX TA Parentérale [C]
- HYDROSOL POLYVITAMINE Solution Buvable Fl/20ml PHARMA DEVELOPPEMENT Orale 6.975 DT [C]

VITAMINE B12+HEMATOPORPHYRINE+VITAMINE B1

• HEMACTEROL Ampoules Buvables C/20/10 ML SIPHAT Orale 4.805 DT [C]

VITAMINE B12+FER

• TOT'HEMA 200 MG Ampoules BUVABLES C/20/10 ML SIPHAT Orale 7.424 DT ICI

13.3. - TONIQUES

Ce titre recouvre une série de préparations dont l'efficacité n'est pas prouvée. Il faut toujours se demander si l'effet psychologique attendu vaut la dépense engagée.

ARGININE ASPARTATE

- SARGENOR 1 GR Ampoules Buvables B/20/5 ML SIPHAT Orale 6.850 DT [C]
- SARGENOR SANS SUCRE Comprimé à Croquer B/18 SIPHAT Orale 3.800 DT I^{CI}

ASCORBATE DE DL-LYSINE+ASCORBATE DE CALCIUM

- TONICALCIUM ADULTES Ampoules Buvables C/20/10 ML ADWYA Orale 6.160 DT [C]
- TONICALCIUM ENFANTS Ampoules Buvables C/20/5 ML ADWYA Orale 4.405 DT [C]

CITRULLINE

• STIMOL 1 GR Solution Buvable B/24 PHARMAGHREB Orale 6.985 DT [C]

USAGE EXTERNE

14.1. - MEDICAMENTS A USAGE DERMATOLOGIQUE

Sont repris successivement dans ce chapitre:

- médicaments antiinfectieux
- corticostéroïdes
- médicaments antiprurigineux, analgésiques et antiinflammatoires
- médicaments utilisés dans les traumatismes et la stase veineuse
- médicaments antiacnéiques
- médicaments antipsoriasiques
- préparations kératolytiques
- préparations enzymatiques et produits apparentés
- préparations protectrices et cicatrisantes
- divers
- médicaments à usage systémique utilisés en dermatologie.

Les antibiotiques, les antimycosiques, les corticostéroïdes, les antihistaminiques et les vitamines à utiliser par voie générale et qui peuvent aussi être indiqués dans certaines affections de la peau, sont repris aux chapitres correspondants.

L'étiopathogénie de nombreuses maladies cutanées n'est pas encore bien établie; un traitement étiologique n'est dès lors pas possible, le traitement se limite alors aux prescriptions symptomatiques. Les associations de plusieurs principes actifs ne sont en général pas recommandables et sont souvent superflues après un diagnostic précis.

Presque toutes les substances appliquées sur la peau peuvent provoquer des réactions allergiques, et il existe de nombreux cas de sensibilité croisée entre des substances chimiquement apparentées. Ces réactions allergiques surviennent non seulement avec des principes actifs tels certains antihistaminiques, antiinflammatoires et anesthésiques locaux, la néomycine, les sulfamidés mais aussi avec des excipients, des agents conservateurs ou des substances aromatiques. Aussi, des préparations contenant un même principe actif peuvent être différemment tolérées.

14.1.1. - **Infections**

14.1.1.1. - Antiseptiques et désinfectants

Les antiseptiques empêchent la multiplication des germes pathogènes de la peau et des muqueuses. Le terme désinfectant est réservé aux substances antimicrobiennes utilisées sur des matériaux inertes: p.ex. des instruments chirurgicaux ou des tables d'examen. La séparation entre ces deux termes n'est pas toujours nette, et certaines substances peuvent être utilisées tantôt comme antiseptiques, tantôt comme désinfectants.

La plupart des antiseptiques influencent seulement la flore superficielle (souvent dite transitoire), et ont peu d'effet sur la flore résidente, localisée en profondeur dans l'épiderme. L'emploi d'antiseptiques doit se situer dans le cadre de la prophylaxie. Etant donné le problème de résistance et de réactions allergiques lors de l'utilisation locale d'antibiotiques, les antiseptiques leur sont dans beaucoup de cas préférables pour l'application locale. Les principaux effets indésirables des antiseptiques sont leur action irritante sur la peau et les muqueuses, et l'hypersensibilisation qu'ils peuvent provoquer. Ces produits doivent être utilisés aux concentrations adéquates. Les colorants (éosine, fluorescéine etc...) sont de

moins en moins utilisés parce qu'ils sont des antiseptiques peu puissants et peuvent en outre masquer les lésions.

Le contact avec les yeux doit être évité; l'ingestion ou l'inhalation accidentelle de certains antiseptiques et désinfectants peut provoquer des troubles sérieux entraînant parfois une issue fatale.

Pour certaines préparations, une dilution préalable s'impose. Afin d'éviter une irritation et le cas échéant des brûlures, il est impératif de suivre scrupuleusement les recommandations de la notice.

POLYVIDONE IODEE

- BETADINE 10% Solution Externe FL/125 ML MEDA PHARMA Locale 2.349 DT [I]
- BETADINE 10% Soluté Buccale FL/125 ML MEDA PHARMA Locale 5.640 DT [I]
- BETADINE 10% Gel Dermique T/30 GR MEDA PHARMA Locale 1.580 DT [I]
- BETADINE SCRUB 4% Solution Externe FL/125ML MEDA PHARMA Locale 1.890 DT [I]
- BETADINE SCRUB 4% Solution Externe FL/500ML MEDA PHARMA Locale 9.605 DT [I]
- BETAVIDINE 10% Solution Gynéco. Fl/125 ML PHARMADERM Locale 2.145 DT [I]
- BETAVIDINE 10% Solution Externe. Fl/125 ML PHARMADERM Locale 2.350 DT [I]
- BETAVIDINE 10% Solution Externe. Fl/500 ML PHARMADERM Locale 5.475 DT [I]
- BETAVIDINE 10% Solution Externe. Fl/20 ML PHARMADERM Locale 1.500 DT [I]

ARGENT COLLARGOL+ARGENT COLLOIDAL

• COLLARGOL 5% Pommade Dermique T/10 GR SIPHAT Locale 1.750 DT [I]

CHLORHEXIDINE

• SEPTEAL 0.5% Solution Externe FL/250 ML SIMED Locale 3.590 DT [I]

CHLORHEXIDINE+BENZALKONIUM

- BISTERYL Solution Externe FL/250 ML OPALIA PHARMA Locale 3.270 DT [I]
- DERMOBACTER Solution Externe FL/300 ML INNOTECH INTERNATIONAL Locale 5.322 DT [1]

BISTERYL EAU OXYGENEE

PEROX 10 V 3% Solution Externe FL/120 ML PHARMAGHREB Locale 2.335 DT [I]

EOSINE

• EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BARBEZAT 2% Solution Externe B/10/2 ML GIFRER BARBEZAT Locale 3.645 DT [C]

HEXAMIDINE

- BACTICID 0.1% Solution Externe FL/250 ML PHARMAGHREB Locale 2.750 DT [I]
- BACTICID 0.1% Solution Externe FL/125 ML PHARMAGHREB Locale 2.270 DT [I]
- HEXOMEDINE Solution Externe FL/250 ML ADWYA Locale 3.340 DT [I]

HYPOCHLORITE DE SODIUM

- AMUCHINA 5% Solution Externe FL/250ML OPALIA PHARMA Locale 2.080 DT [I]
- AMUCHINA 5% Solution Externe FL/500ML OPALIA PHARMA Locale 3.950 DT [I]

- AMUCHINA 5% Solution Externe FL/1000ML OPALIA PHARMA Locale 7.160 DT [I]
- DAKIN COOPER STABILISEE Solution Externe FL/250 ML COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Locale 3.585 DT [I]

IRGASAN

- AMUSTIL Creme Dermique TUBE/30 GR OPALIA PHARMA Locale 3.685 DT [1]
- TILL Solution Externe FL/200 ML OPALIA PHARMA Locale 3.055 DT [I]

CHLORHEXIDINE+CHLOROCRESOL+HEXAMIDINE

- CYTEAL 0.1% Solution Externe FL/250 ML SIMED Locale 3.590 DT [I]
- CYTEAL 0.1% Solution Externe FL/500 ML SIMED Locale 6.580 DT [1]

TRICLOCARBAN

- SEPTISAN 0.5% Solution Externe FL/250 ML DAR ESSAYDALI Locale 2.990 DT [I]
- SEPTISAN 0.5% Solution Externe FL/500 ML DAR ESSAYDALI Locale 5.490 DT [I]
- TRICLOSAN 1% Poudre à Usage Externe FL/80 GR PHARMAGHREB Locale 2.595 DT [I]
- TRICLOBACTER 1% Solution Externe FL/200 ML PHARMAGHREB Locale 3.305 DT [1]
- TRICLOBACTER 1% Solution Externe FL/400 ML PHARMAGHREB Locale 5.635 DT [1]

14.1.1.2. - Antibiotiques et sulfamidés

L'application locale de certains antibiotiques se justifie dans le traitement de dermatoses infectées. Cependant, ils sont fréquemment utilisés sans nécessité alors que des antiseptiques peuvent suffire. L'application locale d'antibiotiques sur la peau présente en effet un certain nombre d'inconvénients, notamment la possibilité de voir se développer une résistance. Pour cette raison, il faudrait prendre comme règle générale qu'aucun antibiotique employé par voie générale ne devrait être utilisé en application locale.

Un autre inconvénient de l'application locale d'antibiotiques est l'apparition d'une hypersensibilité. Celle-ci peut dans certains cas, par suite d'une allergie croisée, impliquer d'autres antibiotiques de structure chimique apparentée, parfois indispensables par voie générale. Le risque d'hypersensibilité est élevé pour la néomycine, la polymyxine B et la virginiamycine, et plus faible pour la tétracycline et l'érythromycine.

ACIDE FUSIDIQUE

- ACIDE FUSIDIQUE OPALIA 2% Crème Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 3.932 DT [E]
- AFUSIDIQUE 2% Pommade Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 4.011 DT [E]
- TRICIDINE 2% Pommade Dermique Tube/15 GR WEST PHARMA TA Locale 3.720 DT [E]
- TRICIDINE 2% Crème Dermique Tube/15 GR WEST PHARMA TA Locale 3.920 DT [E]
- UCIDERM 2% Crème Dermique Tube/15 GR SIMED TA Locale 4.505 DT [E]
- UCIDERM 2% Pommade Dermique Tube/15 GR SIMED TA Locale 4.505 DT [E]

CHLORTETRACYCLINE

- AUREOMYCINE SPECIA 3% Pommade Dermique T/15 GR TERIAK TA Locale 1.290 DT [E]
- ORECYCLINE Pommade Dermique T/15 GR SIPHAT TA Locale 1.000 DT [E]

MUPIROCINE

• BACTROBAN Pommade Dermique T/15 GR SB HOUSE ENG TA Locale 6.340 DT [E]

OXYTETRACYCLINE

OXYTETRACYCLINE 3% Pommade Dermique T/15 GR SIPHAT TA Locale 1.050 DT [E]

14.1.1.3. - Antimycosiques

Dans les infections mycosiques superficielles, un traitement local donne souvent des résultats satisfaisants.

Dans les mycoses étendues et les mycoses dues à T. Rubrum, un traitement local est souvent associé à un antimycosique par voie générale. Un antimycosique par voie générale est certainement nécessaire dans les mycoses des ongles et du cuir chevelu. Un tel traitement ne peut être entrepris que sur la base d'un diagnostic confirmé par un examen direct et/ou une culture. En cas d'infection de l'ongle, le traitement doit être poursuivi pendant 3 à 4 mois au moins.

Le meilleur médicament local pour le traitement de la candidose cutanée est la nystatine. Le traitement local doit parfois être complété par l'administration per os de nystatine afin d'éliminer la source d'infection gastro-intestinale. La nystatine n'est active ni sur les dermatophytes, ni sur le pityriasis versicolor. De plus, n'étant pas résorbée, elle ne peut être utilisée per os pour traiter des mycoses cutanées.

Les associations qui, outre des antimycosiques, contiennent des antibiotiques, ne se justifient qu'en cas d'infections microbiennes associées. Celles contenant des corticostéroïdes ne doivent être utilisées que si des réactions inflammatoires manifestes sont également présentes. Il ne faut pas perdre de vue que l'effet antiinflammatoire du corticostéroïde peut faire croire à une guérison alors que l'agent responsable n'est pas éliminé.

Les antimycosiques à usage local provoquent rarement une irritation cutanée ou une allergie; ce qui est par contre très fréquent avec les associations, surtout celles qui contiennent de la néomycine ou de l'éthylènediamine.

NYSTATINE

• NYSTATINE Pommade Dermique T/25 GR SIPHAT TA Locale 2.787 DT [E]

ECONAZOLE

- ECOREX Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA Locale 4.500 DT [E]
- ECOREX 1% Lotion FL/50 ML OPALIA PHARMA Locale 9.050 DT [E]
- ECOREX Spray Solution FL/30 GR OPALIA PHARMA Locale 4.848 DT [E]
- ECOREX 1% Lait Dermique FL/30ML OPALIA PHARMA Locale 4.510 DT [E]
- ECOZYL 1% Crème Dermique T/30 GR WEST PHARMA Locale 3.550 DT [E]
- ECOZYL 1% Lait Dermique FL/30 ML WEST PHARMA Locale 2.950 DT [E]
- FONGICIL 1% Lait Dermique FL/30 ML DAR ESSAYDALI Locale 3.635 DT [E]
- FONGICIL 1% Crème Dermique T/30 GR DAR ESSAYDALI Locale 3.585 DT [E]
- MYCODERM 1% Crème Dermique T/30 GR PHARMADERM Locale 3.660 DT [E]
- MYCODERM 1% Lait Dermique FL/30 ML PHARMADERM Locale 3.830 DT [E]

- PEVARYL Spray Solution FL/30 GR PHARMAGHREB Locale 6.590 DT [E]
- PEVARYL 1% Crème Dermique T/30 GR PHARMAGHREB Locale 5.595 DT [E]
- PEVARYL 1% Lait Dermique FL/30 ML PHARMAGHREB Locale 5.525 DT [E]
- PEVARYL 1% Poudre à Usage Externe FL/30 GR PHARMAGHREB Locale 6.570 DT 🖪

KETOCONAZOLE

- DERMATIN 20MG/GR SHAMPOOING FL/120 ML ACTAVIS TA 9.402 DT [E]
- KETODERM 2% Crème Dermique T/15 GR PHARMAGHREB TA Locale 5.100 DT [E]
- KETODERM 2% GEL EN SACHET-DOSE 2% Gel Dermique B/8/6 GR JANSSEN-CILAG TA Locale 16.979 DT [E]
- KETOGEL 2% Gel Dermique TUBE MONODOSE/20GR OPALIA PHARMA TA Locale 8.325 DT [E]
- PHILAZOLE 2% SHAMPOOING FL/100 ML TA Locale SIMED 11.445 DT [E]

CLOTRIMAZOLE

• CAMYSTEN 1% Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA Locale 3.885 DT [E]

ISOCONAZOLE

• VOCOZOLE 1% Crème Dermique T/15 GR SIMED Locale 2.800 DT [E]

TERBINAFINE

- LAMISIL 1% Spray Solution FL/15 ML NOVARTIS SANTE FAMILIALE TC Locale 9.380 DT [E]
- LAMISILATE MONODOSE 1% Solution Externe T/4 GR NOVARTIS SANTE FAMILIALE Locale 11.290 DT [E]
- MYCOPHIL 1% Crème Dermique T/15 GR GALPHARMA TC Locale 6.000 DT [E]
- ONYCAL 1% Crème Dermique T/15 GR PHARMAGHREB TC Locale 5.780 DT [E]
- ONYCAL 1% Spray Solution FL/15 ML PHARMAGHREB TC Locale 6.750 DT [E]
- TALLIS 1% Crème Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TC Locale 7.140 DT [E]
- TALLIS 1% Spray Solution FL/15 ML OPALIA PHARMA TC Locale 6.800 DT [E]
- TERCYD 1% Crème Dermique T/15 GR ADWYA TC Locale 6.360 DT [E]
- TERBISIL 1% Crème Dermique T/15 GR SIPHAT TC Locale 5.940 DT [E]
- TERBISIL 1% Crème Dermique T/30 GR SIPHAT TC Locale 9.330 DT [E]

AMOROLFINE

• LOCERYL 5% Solution Externe FL/2.5 ML GALDERMA TA Locale 50.955 DT [E]

CICLOPIROXOLAMINE

- MYCOREX 1% Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA Locale 4.055 DT [E]
- MYCOREX 1% Lotion FL/30 ML OPALIA PHARMA Locale 3.860 DT [E]
- MYCOSTER 1% Spray Solution FL/30 ML SIMED Locale 5.760 DT [E]
- MYCOSTER Crème Dermique T/30 GR SIMED Locale 4.610 DT [E]
- MYCOSTER 1% Poudre A Usage Externe FL/30 GR PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Locale 7.305 DT [E]
- MYCOSTER VERNIS 8% Solution Externe FL/3 ML + Pinceau PIERRE FABRE DERMATOLOGIE Locale 21.265 DT [E]
- SEBIPROX 1.5% Shampooing FL/100 ML STIEFEL FRANCE Locale 17.785 DT [E]

TOLNAFTATE

• SPORALIM 1% Lotion FL/30 ML OPALIA PHARMA Locale 2.765 DT [E]

• TOMYCOSE 1% Lotion FL/25 ML PHARMAGHREB Locale 3.100 DT [E]

14.1.1.4. - Antiviraux

Ces médicaments sont utilisés notamment dans les affections herpétiques. L'efficacité sur les virus herpétiques a été démontrée pour l'aciclovir et l'ibacitabine, mais uniquement lorsque ces substances sont utilisées au stade prodromal ou tout au début des lésions.

ACICLOVIR

ACICLOVIR OPALIA 5% Crème Dermique T/5 GR OPALIA PHARMA TC Locale 8.880 DT [I]

IBACITABINE

• CUTERPES 1% Pommade Dermique T/5 GR CHAUVIN Locale 4.925 DT [I]

14.1.1.5. - Médicaments contre la gale et la pédiculose

Pour le traitement de la *gale*, le benzoate de benzyle peut être utilisé. Malgré un traitement efficace, les symptômes et les lésions de la gale peuvent subsister pendant plusieurs semaines; le patient doit en être averti afin d'éviter un emploi inutile de ces médicaments.

Pour le traitement de la *pédiculose*, une seule application de perméthrine à 1% est efficace. Après une semaine, il convient de contrôler l'effet du traitement. En présence de poux vivants, un traitement avec le même produit peut être répété. S'il apparaît que l'infestation est encore active après 14 jours, il est recommandé de passer à un autre produit actif. L'utilité de peigner à plusieurs reprises les cheveux mouillés avec un peigne spécial est controversée.

En cas d'exposition excessive à de telles substances, des manifestations d'intoxication aiguë peuvent survenir. Une irritation cutanée est possible et le contact avec les yeux doit être évité. L'application de lotions contenant des substances inflammables doit se faire en un lieu bien ventilé, à distance de toute flamme nue.

BENZOATE DE BENZYLE

• ASCALOL Lotion FL/125 ML PHARMAGHREB Locale 2.620 DT [E]

BENZOATE DE BENZYLE+SULFIRAME

• ASCABIOL Lotion FL/125 ML TERIAK Locale 3.350 DT [E]

LINDANE

• ASCAPOUDRE Poudre A Usage Externe FL/100 GR PHARMAGHREB Locale 2.365 DT [E]

14.1.2. - Corticostéroïdes

Les corticostéroïdes en application locale ont une place dans la thérapeutique de diverses affections cutanées: affections inflammatoires telles eczémas, affections prolifératives telles psoriasis, affections auto-immunes telles lupus érythémateux, affections tumorales telles mycosis fongoïde. L'indication d'une corticothérapie locale doit être correctement évaluée et il convient d'expliquer au patient l'utilité et les risques d'un tel traitement.

Les effets indésirables, tant généraux que locaux, dépendent de la concentration en corticostéroïde et de la puissance de celui- ci, de la nature de l'excipient, de la durée du traitement et aussi du site, de l'étendue et de la nature de l'affection cutanée. La résorption des corticostéroïdes est particulièrement importante au niveau du visage et des plis cutanés, d'une peau lésée et sous un pansement occlusif. Afin de limiter autant que possible les effets indésirables des corticostéroïdes locaux, il faut tenir compte de ces facteurs ainsi que de l'âge du patient.

La réaction générale la plus à craindre est l'inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal, surtout chez le nourrisson.

Les préparations disponibles ont été classées en quatre catégories en fonction de leur puissance, déterminée ici par la nature de la molécule et de l'excipient (les pommades sont en général plus puissantes que les crèmes ou les lotions), et par la concentration du principe actif. Les frontières entre les classes restent cependant difficiles à établir, en particulier pour la triamcinolone et le butyrate d'hydrocortisone.

14.1.2.1. - Préparations très puissantes

CLOBETASOL

- CLOBEVATE 0.05% Gel Dermique T/45 GR SIPHAT TA Locale 6.000 DT [E]
- CLOBEVATE 0.05% Gel Dermique T/15 GR SIPHAT TA Locale 2.400 DT [E]
- CLOBEX 500μG/GR Shampooing FI/125ML GALDERMA INTERNATIONAL TA Locale 30.850 DT IEI
- DERMOCORT 0.05% Crème Dermique T/10 GR GALPHARMA TA Locale 1.520 DT [E]

14.1.2.2. - Préparations puissantes

BETAMETHASONE

- DERMOSONE 0.05% Crème Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 2.015 DT [E]
- DERMOSONE 0.05% Pommade Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 2.015 DT [E]
- DERMOSONE 0.05% Lotion FL/15 ML OPALIA PHARMA TA Locale 1.655 DT [E]
- SUPRASONE 0.05% Lotion FL/30 G WEST PHARMA TA Locale 2.765 DT [E]
- SUPRASONE 0.05% Crème Dermique T/15 G WEST PHARMA TA Locale 1.900 DT [E]
- SUPRASONE 0.05% Pommade Dermique T/15 GR WEST PHARMA TA Locale 1.980 DT [E]
- VALECORT 0.1% Lotion FL/15 GR PHARMADERM TA Locale 2.155 DT [E]
- VALECORT 0.1% Pommade Dermique T/10 GR PHARMADERM TA Locale 2.415 DT [E]
- VALECORT 0.1% Crème Dermique T/10 GR PHARMADERM TA Locale 2.415 DT [E]

FLUOCINONIDE

- CORTEMA 0.01% Pommade Dermique T/50 GR PHARMADERM TA Locale 3.605 DT [E]
- CORTEMA 0.01% Lotion FL/30 ML PHARMADERM TA Locale 2.395 DT [E]
- CORTEMA APG 0.05% Creme Dermique T/15 GR PHARMADERM TA Locale 3.350 DT [E]
- CORTEMA GEL 0.025% Gel Dermique T/30 GR PHARMADERM TA Locale 2.615 DT [E]
- CORTEMA GRAS 0.05% Pommade Dermique T/15 GR PHARMADERM TA Locale 2.905 DT [E]
- FLUSKIN 0.05% Gel Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA TA Locale 2.620 DT [E]

FLUTICASONE

• FLUDERM 0.05% Pommade Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA TA Locale 4.000 DT [E]

14.1.2.3. - Préparations moyennement puissantes

DESONIDE

- LOCAPRED 0.1% Crème Dermique T/15 GR SIMED TA Locale 2.550 DT [E]
- LOCATOP 0.1% Crème Dermique T/30 GR SIMED TA Locale 4.875 DT [E]

14.1.2.4. - Préparations peu puissantes

L'hydrocortisone provoque parfois des réactions allergiques.

HYDROCORTISONE

- HYDROCORTISONE 2.5% Pommade Dermique T/15 GR SIPHAT TA Locale 2.515 DT [E]
- HYDROCORTISONE 1% Pommade Dermique T/10 GR SIPHAT TA Locale 1.355 DT [E]

14.1.2.5. - Associations avec des corticostéroïdes

Il existe des préparations à base de corticostéroïdes associés à de nombreuses autres substances telles antiseptiques, antibiotiques, antimycosiques. Ces associations sont presque toujours à déconseiller: elles sont en effet souvent inutiles, elles peuvent fausser le diagnostic et être responsables de réactions allergiques.

BETAMETHASONE+ACIDE SALICYLIQUE

- DERMOSALIC Lotion FL/30 GR OPALIA PHARMA TA Locale 3.645 DT [E]
- DERMOSALIC Pommade Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA TA Locale 3.262 DT [E]

BETAMETHASONE+NEOMYCINE

- DERMOSONE NEOMYCINE Crème Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 2.015 DT [E]
- DERMOSONE NEOMYCINE Pommade Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA Locale 2.015 DT [E]
- VALECORT NEOMYCINE Lotion FL/15 GR PHARMADERM TA Locale 2.440 DT [E]
- VALECORT NEOMYCINE Pommade Dermique T/10 GR PHARMADERM TA Locale 2.505 DT [E]
- VALECORT NEOMYCINE Crème Dermique T/10 GR PHARMADERM TA Locale 2.505 DT [E]

ACIDE FUSIDIQUE+BETAMETHASONE

- FUCIVAL 2 Crème Dermique Tube/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 4.200 DT [E]
- UCIDERM PLUS Crème Dermique Tube/15 GR SIMED TA Locale 4.410 DT [E]

FLUOCINONIDE +NEOMYCINE

- CORTEMA NEOMYCINE Pommade Dermique T/15 GR PHARMADERM TA Locale 3.525 DT [E]
- FLUSKIN NEO 0.05% Pommade Dermique T/15 GR OPALIA PHARMA TA Locale 1.927 DT IEI

TRIAMCINOLONE+NEOMYCINE

- CINODERM Pommade Dermique T/10 GR PHARMADERM TA Locale 2.165 DT [E]
- NEOCILONE Pommade Dermique T/10 GR SIPHAT TA Locale 1.615 DT [E]

TRIAMCINOLONE+NEOMYCINE+NYSTATINE

• NEOFUNGINE Pommade Dermique T/10 GR SIPHAT TA Locale 2.540 DT [E]

BETAMETHASONE+CALCIPOTRIOL

- XAMIOL 50mcg/0.5mg Gel Dermique Fl/60 GR LEO TA Locale 106.315 DT [E]
- DAIVOBET 50mcg/0.5mg Pommade Dermique T/60 GR LEO TA Locale 103.871 DT [E]

14.1.3. - Antiprurigineux, analgésiques et anti-inflammatoires

L'efficacité des préparations contenant un antihistaminique et/ou un anesthésique local n'est souvent pas établie. Les antihistaminiques surtout (et certainement la prométhazine) peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité, notamment en cas d'ensoleillement. L'utilisation de ces préparations est à déconseiller.

Les préparations contenant un anti-inflammatoire non stéroïdien sont utilisées dans le traitement symptomatique de certains processus inflammatoires ou de certains traumatismes, mais leur efficacité est limitée. Le buféxamac et la méphénésine peuvent entraîner des réactions d'hypersensibilité. Une irritation cutanée peut survenir avec tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Des réactions systémiques surviennent rarement lors de l'application locale d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais la prudence s'impose, certainement chez les insuffisants rénaux.

CROTAMITON

• PRUREX 10% Crème Dermique T/40 GR OPALIA PHARMA Locale 3.005 DT [C]

IDROCILAMIDE

• SRILANE Pommade Dermique T/60 GR PHARMAGHREB Locale 3.805 DT [C]

ACIDE NIFLUMIQUE

- INFLOCINE 3% Pommade Dermique T/60 GR IPS Locale 1.515 DT [C]
- INFLOCINE 2.5% Gel Dermique T/60 GR IPS Locale 3.490 DT [C]
- NIFLUDERM 3% Crème Dermique Tube/60 GR PHARMADERM TC Locale 2.620 DT ICI
- NIFLUGEL 2.5% Gel Dermique T/60 GR BMS-U P S A-TUN-SAID TC Locale 3.850 DT I^CI
- NIFLUMIC Crème Dermique T/60 GR SIPHAT Locale 1.554 DT [C]

DICLOFENAC

- DICLOPAL 1% Gel Dermique T/50 GR OPALIA PHARMA TC Locale 3.695 DT [C]
- XEDOL EMULGEL 1% Gel Dermique T/50 GR PHARMAGHREB TC Locale 3.200 DT [9]

PIROXICAM

- GELDENE 0.5% Gel Dermique T/50 GR PFIZER S.A TA Locale 5.064 DT [C]
- PAINOXAM Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA TA Locale 3.270 DT [C]
- ROXAM 0.5 Gel Dermique T/50 GR SIMED TA Locale 3.520 DT [C]

IBUPROFEN

- DOLGIT Crème Dermique T/50 GR MERCK LIPHA SANTE S.A.S Locale 3.845 DT [C]
- IBUPHIL GEL 5% Gel Dermique T/50 GR SIMED TC Locale 3.675 DT [C]

IBUPROFEN+MENTHOL

- CLIPTOL 5% Gel Dermique T/50 GR PIERRE FABRE MEDICAMENT TC Locale 5.370 DT [C]
- IBUPHIL GEL MENTHOLE 5% Gel Dermique T/50 GR SIMED TC Locale 4.000 DT [C]

KETOPROFENE

- AXEN 2.5% Gel Dermique T/50 GR OPALIA PHARMA TC Locale 3.150 DT [C]
- KETUM 2.5% Gel Dermique T/50 GR PHARMAGHREB TC Locale 3.880 DT [C]
- RHUTAGEL 2.5% Gel Dermique T/50 GR WEST PHARMA TC Locale 3.258 DT [C]

BENZYDAMINE

- VERAX 5% Gel Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA Locale 2.945 DT [C]
- VERAX 5% Gel Dermique T/70 GR OPALIA PHARMA Locale 5.500 DT [C]

ESSENCES NATURELLES+SALICYLAMIDE

• BAUME AROMA Crème Dermique T/50 GR MAYOLY SPINDLER Locale 3.335 DT [C]

MEPHENESINE

• MYORELAX Baume T/70 GR SIPHAT Locale 1.555DT [C]

MEPHENESINE+NICOTINATE DE METHYLE

• DECONTRACTYL Baume T/80 GR TERIAK Locale 3.475 DT [C]

MYRTECAINE+SALICYLATE DE DIETHYLAMINE

• ALGESAL SURACTIVE Baume T/60 GR SIPHAT Locale 3.100 DT [C]

CAPSICUM

- EMPLATRE LE LION GM Emplâtre B/10/18/31 ADHE-ELS Locale 1.245 DT [C]
- EMPLATRE LE LION PM Emplâtre B/36/18X12 ADHE-ELS Locale 0.505 DT [C]

METHOXY-5 SALICYLATE D'ETHYLE+SALICYLATE DE PHENYL PROPYLE

• ARTHROL Liniment FL/50 GR PHARMAGHREB Locale 8.910 DT [C]

CAMPHRE+MENTHOL+ARNICA+CALENDULA

• CREME DECONTRACTANTE LAINO Crème Dermique T/75 GR PHARMAGHREB Locale 2.655 DT [C]

14.1.4. - Médicaments des traumatismes et des affections veineuses

Ces préparations sont proposées en cas de thrombophlébite superficielle, contusions et extravasations sanguines. Leur efficacité n'est pas prouvée, et elles peuvent être photosensibilisantes.

ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL

- SAVEROL Gel Dermique T/70 GR OPALIA PHARMA Locale 3.390 DT [C]
- SYNTHOL Gel Dermique T/100 GR GLAXO SMITH KLINE SANTE GRAND PUBLIC Locale 5.535 DT [C]

14.1.5. - Médicaments antiacnéiques

Le peroxyde de benzoyle, la clindamycine et l'érythromycine sont, à raison de une à deux applications par jour, les traitements de choix de l'acné juvénile. Le peroxyde de benzoyle peut entraîner une irritation cutanée et, plus rarement, une dermatite de contact ainsi qu'une décoloration des vêtements. Certains antibiotiques ont un effet sensibilisant.

La trétinoïne (acide rétinoïque) et l'adapalène sont des dérivés de la vitamine A; ils sont surtout indiqués dans l'acné avec de nombreux comédons. Il faut parfois attendre deux ou plusieurs mois avant qu'une amélioration ne survienne. De plus, une aggravation des lésions acnéiques se produit parfois en début de traitement. Les réactions indésirables les plus fréquentes sont: irritation en début de traitement, blanchiment de la peau, sensibilité accrue au soleil. Les crèmes sont moins irritantes que les solutions alcooliques ou les gels. L'adapalène et la trétinoïne ne peuvent pas être appliqués chez les femmes qui envisagent de procréer, ni pendant la grossesse.

ADAPALENE

- DIFFERINE 0.1% Gel Dermique T/30 GR GALDERMA TA Locale 10.685 DT [4]
- DIFFERINE 0.1% Crème Dermique T/30 GR GALDERMA TA Locale 11.157 DT [I]

ISOTRETINOINE

• ISOTREX 0.05% Gel Dermique T/30 GR STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) Ltd TA Locale 7.005 DT [I]

TRETINOINE

- LOCACID 0.05% Crème Dermique T/30 GR SIMED TA Locale 3.635 DT [1]
- RETISOL-A 0.01% Crème Dermique T/25 GR STIEFEL CANADA TA Locale 8.970 DT [I]
- RETISOL-A 0.05% Crème Dermique T/25 GR STIEFEL CANADA TA Locale 7.755 DT [I]
- RETISOL-A 0.025% Crème Dermique T/25GR STIEFEL CANADA TA Locale 9.755 DT [I]

PEROXYDE DE BENZOYLE

- SOLUGEL 8% Gel Dermique T/45 GR STIEFEL CANADA TC Locale 8.105 DT [1]
- SOLUGEL 4% Gel Dermique T/45 GR STIEFEL CANADA TC Locale 8.390 DT [1]

CLINDAMYCINE

• DALACINE T TOPIC 10 MG Solution Externe FL/30 ML PFIZER HOLDING FRANCE TA Locale 7.180 DT [I]

ERYTHROMYCINE

- ERYSOL 2% Gel Dermique T/25 GR STIEFEL CANADA TA Locale 7.195 DT [1]
- ERYFLUID 4% Solution Externe FL/100 ML SIMED TA Locale 6.415 DT [I]

CLINDAMYCINE+PEROXYDE DE BENZOYLE

DUAC ONCE DAILY Gel Dermique T/25GR STIEFEL TA Locale 23.095 DT [I]

14.1.6. - Médicaments antipsoriasiques

CALCIPOTRIOL

- DAIVONEX 0.005% Lotion FL/60 ML LEO TC Locale 33.905 DT [E]
- DAIVONEX 0.005% Crème Dermique T/30 GR LEO TC Locale 17.845 DT [E]
- DAIVONEX 0.005% Pommade Dermique T/30GR LEO TC Locale 19.675 DT [E]

METHOTREXATE

• EBETREXATE 2.5 MG Comprimé Sécable FL/50 EBEWE Pharma TA Orale 9.161 DT [V]

GOUDRON

• POLYTAR Shampooing FL/150 ML STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) Ltd TC Locale 9.110 DT [C]

14.1.7. - Kératolytiques

L'acide salicylique et l'acide lactique (urée) sont kératolytiques. L'acide salicylique est utilisé surtout en cas de verrues virales. Un traitement prolongé à l'acide salicylique peut provoquer une irritation. S'il est appliqué sur de grandes surfaces, sa résorption est susceptible de conduire à une intoxication.

ACIDE SALICYLIQUE+COLLODION

- CORICIDE LE DIABLE 12.5% Solution Externe FL/4 GR SODIA Locale 6.585 DT [C]
- CORICIDE VERRUCIDE LIQUID Solution Externe FL/5 ML PHARMAGHREB Locale 3.065 DT [C]

ACIDE LACTIQUE+ACIDE SALICYLIQUE

DUOFILM Solution Externe FL/15ML STIEFEL LABORATORIES (UK) Limited Locale 7.901 DT [C]

14.1.8. - Enzymes et produits apparentés

Ces préparations sont utilisées dans l'espoir de favoriser la disparition des hématomes et des exsudats fibrineux ou purulents des plaies, ulcères, etc. Elles sont également proposées pour faciliter la résorption des oedèmes.

Ces préparations peuvent provoquer des réactions allergiques.

14.1.9. - Préparations protectrices ou cicatrisantes

Ces préparations sont utilisées pour protéger la peau contre l'irritation et diverses agressions extérieures. Elles contiennent des substances réduites en très fines particules (talc, oxyde de zinc, .). Diverses huiles sont également utilisées. Plusieurs de ces préparations contiennent de la vitamine A ou D. L'effet cicatrisant de ces préparations n'est pas clairement démontré.

OXYDE DE ZINC

• MYTOPLASTINE Pommade Dermique T/50 GR PHARMADERM Locale 4.005 DT ICI

PHENAZONE+TANIN+HAMAMELIS

• H.E.C 12.5% Pommade Dermique T/25 GR CHAUVIN Locale 5.931 DT [C]

VITAMINE A+VITAMINE D+ZINC OXYDE

• DERMOVIT A+D Pommade Dermique T/35 GR SIPHAT Locale 2.455 DT [C]

VITAMINE A

• VITAMINE A-CREME 1MUI% Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA Locale 2.420 DT [9]

HUILE DE FOIE DE MORUE + OXYDE DE ZINC

• MITOSYL Pommade Dermique Tube de 65 GR TERIAK Locale 4.515 DT [C]

TROLAMINE

- BIAFINE Emulsion T/186 GR JOHNSON&JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS Locale 9.690 DT [9]
- BIAFINE Emulsion T/93 GR JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS Locale 5.085 DT [C]

BETASITOSTEROL

- MEBO 0.25% Pommade Dermique T/30 GR JULPHAR Locale 17.457 DT [C
- MEBO 0.25% Pommade Dermique T/75 GR JULPHAR Locale 31.920 DT [C]]

CUIVRE SULFATE+ZINC OXYDE

- DERMOCUIVRE Pommade Dermique T/25 GR CHAUVIN Locale 2.540 DT [C]
- DERMOCUIVRE Pommade Dermique T/100 GR CHAUVIN Locale 8.260 DT [C]

VASELINE

- VASELINE Pommade Dermique T/20 GR SIPHAT Locale 1.329 DT [C]
- VASOGAZE Compresse imprégnée stérile B10/10 CM x 10 CM ALLIANCE PHARMA Locale 7.783 DT [9]
- VASOGAZE Compresse imprégnée stérile B10/20 CM x 20 CM ALLIANCE PHARMA Locale 17.622 DT ICI
- VASOGAZE Compresse imprégnée stérile B10/10 CM x 30 CM ALLIANCE PHARMA Locale 11.250 DT ICI

VASELINE+GLYCEROL+PARAFFINE

• DEXERYL Crème Dermique T/150 GR PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE Locale 7.475 DT [C]

HYALURONATE DE SODIUM

- CONNETTIVINA 0.2% Crème Dermique T/15 GR FIDIA SPA TC Locale 5.643 DT [C]
- CONNETTIVINA 2MG Compresse Imprégnée Stérile 10x10CM B/10 FIDIA SPA Locale 9.022 DT [C]

14.1.10. - Médicaments à usage systémique en dermatologie

14.1.10.1. - Rétinoïdes

L'acitrétine et l'isotrétinoïne sont des dérivés synthétiques de la vitamine A. Ils sont administrés per os.

L'acitrétine est indiquée dans le traitement de dermatoses graves caractérisées par de l'hyper- ou de la dyskératose telles le psoriasis pustuleux et le psoriasis palmo-plantaire lorsque ces affections sont rebelles aux traitements classiques. L'isotrétinoïne est indiquée dans le traitement des formes sévères d'acné (nodulaire et conglobata) ainsi que dans l'acné ayant résisté à un traitement classique d'au moins 3 mois.

L'acitrétine et l'isotrétinoïne sont hautement embryotoxiques et tératogènes; une contraception efficace est dès lors requise pendant toute la durée du traitement ainsi que pendant les deux ans qui suivent l'arrêt d'un traitement par l'acitrétine et pendant le mois qui suit l'arrêt d'un traitement par l'isotrétinoïne. La prudence est également de rigueur lors de don de sang.

Les autres effets indésirables sont: desquamation de la peau et des muqueuses, chute de cheveux, chéilite, conjonctivite, altérations hépatiques et hypertriglycéridémie. De plus, pour l'isotrétinoïne, des douleurs ostéomusculaires diffuses, une hyperostose, des troubles psychiatriques et du système nerveux central ainsi que de l'hypertension intracrânienne ont été mises en évidence. Ces rétinoïdes peuvent diminuer l'effet contraceptif des minipilules progestatives.

ISOTRETINOINE

- CURACNE 40 MG Capsule Molle B/30 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE TA Orale 74.565 DT [4]
- CURACNE Gé 5 MG Capsule Molle B/30 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE TA Orale 16.480 DT [1]
- CURACNE Gé 10 MG Capsule Molle B/30 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE TA Orale 24.660 DT [I]
- CURACNE Gé 20 MG Capsule Molle B/30 PIERRE FABRE DERMATOLOGIE TA Orale 45.355 DT [1]
- DECUTAN 20 MG Capsule Molle B/50 ACTAVIS GROUP hf TA Orale 62.150 DT [E]
- DECUTAN 10 MG Capsule Molle B/50 ACTAVIS GROUP hf TA Orale 31.100 DT [E]

ACITRETINE

- NEOTIGASON 10 MG Gélule B/30 ROCHE TA Orale 53.605 DT [E]
- NEOTIGASON 25 MG Gélule B/30 ROCHE TA Orale 117.329 DT [E]

14.1.10.2. - Dépigmentants

MEQUINOL

• LEUCODENINE B 10% Pommade Dermique T/30 GR TERIAK Locale 5.215 DT [C]

HYDROQUINONE

 DEQUINONE 4% Crème Dermique T/30 GR PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE Locale 16.680 DT [C]

14.1.10.3. - Stimulants de la pigmentation

METHOXALENE

- MELADENINE 10MG Comprimé B/30 CLS PHARMA TA Orale 5.297 DT I^Q
- MELADENINE FAIBLE 0,1% Solution Externe FL/24ML CLS PHARMA TA Locale 4.392 DT ICI

14.1.10.4. - Traitement des affections phanérinnes

CYSTEINE

• CYSTINA 500 MG GÉLULE B/20 GALPHARMA Orale 2.100 DT [C]

14.1.11. - Addenda: Minoxidil

Appliqué par voie topique, le *minoxidil* stimule la croissance des kératinocytes in vitro et in vivo et la pousse des cheveux chez certains sujets présentant une alopécie androgénétique. L'apparition de ce phénomène a lieu après environ 4 mois (ou davantage) d'utilisation du produit et varie en fonction des sujets. A l'arrêt du traitement, la repousse cesse et un retour à l'état initial est prévisible après 3 ou 4 mois.

Le plus souvent, le minoxidil est à l'origine de réactions cutanées mineures de type irritation locale avec, en particulier, desquamations, érythème, dermite, peau sèche, hypertrichose, sensation de brûlure et de prurit.

MINOXIDIL

- MINOSTYL 2% Solution Externe FL/90 ML + Ser/1 ML OPALIA PHARMA Locale 13.730 DT [C]
- MINOSTYL 5% Solution Externe FL/90 ML + Pipette/1 ML OPALIA PHARMA TC Locale 15.670 DT ICI
- MINOXIDIL 2% Solution Externe FL/120 ML PHARMAGHREB Locale 17.975 DT ICI
- MINOXIDIL 5% Solution Externe FL/120 ML PHARMAGHREB TC Locale 19.900 DT ICI
- MINOXIDIL 2% Solution Externe Coffret de 2FL/120 ML PHARMAGHREB Locale 31.400 DT ICI
- MINOXIDIL IPS 2% Solution Externe FL/120 ML IPS Locale 14.500 DT [C]
- MINOXIDIL IPS 5% Solution Externe FL/120 ML IPS TC Locale 18.000 DT [C]

14.2. - MEDICAMENTS A USAGE OPHTALMIQUE

Les médicaments à usage ophtalmique ont été classés comme suit:

- antimicrobiens
- antiviraux
- antiallergiques et antiinflammatoires
- décongestionnants
- mydriatiques-cycloplégiques
- médicaments du glaucome
- anesthésiques locaux
- médicaments utilisés à des fins de diagnostic ou en chirurgie oculaire
- larmes artificielles
- préparations à visée cicatrisante ou protectrice
- médicaments de la cataracte.

Pendant un traitement local, le port de lentilles de contact, surtout si elles sont souples, est contreindiqué à moins qu'il ne soit spécifiquement autorisé par l'ophtalmologue.

14.2.1. - Antimicrobiens

Les médicaments antimicrobiens à usage ophtalmique comprennent les antiseptiques et les antibiotiques. Ces médicaments ne sont indiqués que pour les infections microbiennes des muqueuses

oculaires et du segment antérieur de l'oeil. Ils sont inefficaces dans les infections mycosiques ou virales et dans les atteintes allergiques. Des prélèvements avec culture peuvent permettre le choix d'un antibiotique spécifique. La gentamicine et la tobramycine doivent être réservées aux infections à *Pseudomonas aeruginosa* et aux cas où l'antibiogramme montre que le germe responsable suspecté n'est sensible qu'à ces antibiotiques.

Dans le choix de la préparation, on tiendra compte des risques éventuels d'allergie qui peuvent être augmentés lorsque des associations sont utilisées. L'adjonction de corticostéroïdes est rarement justifiée et celle d'anesthésiques locaux est à déconseiller, ces derniers pouvant entraîner des lésions graves et irréversibles de la cornée.

Parmi les antiseptiques, le nitrate d'argent et les sels de mercure n'ont plus de place en thérapeutique.

14.2.1.1. - Antiseptiques

ACIDE SALICYLIQUE+CHLORHEXIDINE

• SOPHTAL 0.1% Collyre FL/10 ML ALCON FRANCE Locale 1.900 DT [1]

BENZODODECINIUM

- BACTYL 0.25 % Collyre FL/10 ML COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE Locale 2.225 DTU
- BENZOSEPT Collyre FL/5 ML UNIMED Locale 1.200 DT [1]

CETHOXINIUM

• VISIODIS 0.01% Collyre FL/10 ML MEDIS Locale 1.100 DT [I]

HEXAMIDINE

• DESOMEDINE 0.1% Collyre FL/10 ML CHAUVIN Locale 2.685 DT [1]

BENZALKONIUM CHLORURE+BORATE DE SOUDE+SYNEPHRINE

• UNIPHRINE 0.5% Collyre FL/5 ML UNIMED Locale 1.200 DT [I]

METHYLTHIONINIUM+NAPHAZOLINE NITRATE

• COLLYRE BLEU LAITER Collyre FL/10ML LEURQUIN MEDIOLANUM TC Locale 1.835 DT [1]

14.2.1.2. - Antibiotiques

ACIDE FUSIDIQUE

FUCITHALMIC 1% Gel Ophtalmique T/3 GR LEO TA Locale 3.672 DT [E]

AZITHROMYCINE

AZYTER 15MG/G Collyre Monodose B/6 recip.unidoses/0.25G THEA TA Locale 11.360 DT [E]

CHLORTETRACYCLINE

• ORECYCLINE Pommade Ophtalmique T/5 GR SIPHAT TA Locale 0.700 DT [E]

CIPROFLOXACINE

• CIPRO 0.3% Collyre FL/5 ML MEDIS TA Locale 3.820 DT [E]

GENTAMICINE

- GENTADAR 0.3% Collyre FL/5 ML DAR ALDAWA TA Locale [E]
- UNIGENTA 0.3% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 1.465 DT [E]

LOMEFLOXACINE

• OKACIN Collyre FL/5 ML NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG SUISSE TA Locale 5.749 DT [E]

NEOMYCINE

• NEOMYCINE UNIMED 0.35% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 0.660 DT [E]

NEOMYCINE+POLYMYXINE B

- CEBEMYXINE Collyre FL/10 ML CHAUVIN Locale 2.090 DT [E]
- CEBEMYXINE Pommade Ophtalmique T/5GR CHAUVIN Locale 2.830 DT [E]

NORFLOXACINE

• FLOXAMED 0.3% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 4.000 DT [E]

OFLOXACINE

- OFLOCOL 1.5 MG/0.5 ML Collyre Monodose B/15ophtadoses/0.5 ML UNIMED TA Locale 4.800 DT [E]
- OFLOCOL 0.3% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 3.800 DT [E]

OXYTETRACYCLINE

• OXYTETRACYCLINE 0.5% Pommade Ophtalmique T/5 GR SIPHAT TA Locale 0.750 DT [E]

RIFAMYCINE

- RIFAMYCINE CHIBRET 1% Collyre FL/10 ML THEA TA Locale 4.408 DT [E]
- RIFAMYCINE CHIBRET 1000 000 UI% Pommade Ophtalmique T/5 GR THEA TA Locale 3.446 DT [E]

TOBRAMYCINE

- TOBRACOL 0.3% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 2.885 DT [E]
- TOBREX 0.3% Collyre FL/5 ML ALCON FRANCE TA Locale 2.917 DT [E]

14.2.2. - Antiviraux

L'aciclovir et le ganciclovir doivent être réservés au traitement des infections virales prouvées (le plus souvent herpétiques); leur emploi prolongé peut donner lieu à une kératite superficielle.

ACICLOVIR

• ZOVIRAX 3% Pommade Ophtalmique T/4.5 GR GLAXO SMITH KLINE FRANCE TA Locale 10.945 DT [E]

GANCICLOVIR

• VIRGAN Gel Ophtalmique T/5 GR THEA TA Locale 14.685 DT [E]

14.2.3. - Antiallergiques et anti-inflammatoires

Les affections allergiques des muqueuses oculaires requièrent d'abord l'éviction de l'allergène.

Les corticostéroïdes à usage ophtalmique ne peuvent être utilisés qu'après exclusion d'une kératite herpétique, d'une infection mycosique ou purulente ou d'un ulcère cornéen. Ils sont parfois indiqués dans les traumatismes dus à des agents physiques et chimiques. Les corticostéroïdes peuvent augmenter la pression intraoculaire; leur usage prolongé accroît le risque de glaucome et de cataracte. Ils peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité tardives. Lors d'un traitement local par corticostéroïdes, un suivi ophtalmologique s'impose.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés entre autres dans la prévention et le traitement des manifestations inflammatoires oculaires post-chirurgicales.

Des antiallergiques peuvent prévenir la conjonctivite accompagnant souvent les rhinites allergiques saisonnières.

14.2.3.1. - Corticostéroïdes

DEXAMETHASONE

• DEXACOL 0.1% Collyre FL/3 ML UNIMED TA Locale 1.400 DT [E]

FLUOROMETHOLONE

• FLUCON 0.1% Collyre FL/3 ML ALCON FRANCE TA Locale 1.804 DT [E]

14.2.3.2. - Antiinflammatoires non stéroïdiens

DICLOFENAC

- DICLOCED 1MG/ML Collyre FL/10 ML THEA TC Locale 11.210 DT [E]
- DICLOGESIC 0.1% Collyre FL/5 ML DAR ALDAWA TC Locale 2.716 DT [E]
- VOLTAREN OPHTA CD 1 MG/1ML Collyre Fl/5ML NOVARTIS PHARMA S.A TA Locale 5.803 DT [E]

INDOMETACINE

• INDOCOLLYRE 0.1 % Collyre FL/5 ML CHAUVIN TA Locale 3.954 DT [E]

INDOMETACINE+GENTAMYCINE

• INDOBIOTIC Collyre FL/5 ML CHAUVIN TA Locale 4.589 DT [E]

14.2.3.3. - Antiallergiques

ACIDE N-ACETYL-ASPARTYL-GLUTAMIQUE

- NAABAK Collyre FL/10 ML THEA Locale 12.031 DT [E]
- NAAXIA Collyre FL/5 ML THEA Locale 6.046 DT [E]

CROMOGLYCATE DE SODIUM

- UNICROM 2% Collyre FL/5 ML UNIMED TC Locale 3.843 DT [E]
- UNICROM OPHTADOSE 2% Collyre Monodose BT/15 FL/0,35 ML UNIMED TC Locale 5.720 DT [E]

LEVOCABASTINE

• LEVOPHTA 0.05% Collyre FL/5 ML CHAUVIN TC Locale 10.399 DT [E]

OLOPATADINE

• OPATANOL 1MG/ML Collyre FL/5 ML ALCON TA Locale 11.950 DT [E]

PHENIRAMINE+TETRAHYDROZOLINE

• LRJ Collyre Fl/10 ML MEDIS Locale 6.440 DT [E]

EMEDASTINE

• EMADINE 0.05% Collyre FL/5 ML ALCON LABORATORIES UK Ltd TA Locale 8.534 DT [E]

LODOXAMIDE TROMETHAMINE

• ALMIDE 0.1% Collyre FL/5 ML ALCON FRANCE Locale 4.943 DT [E]

14.2.3.4. - Corticostéroïdes + antibactériens

Ces associations ont les contre-indications des corticostéroïdes et des antibactériens. Leur emploi n'est que rarement indiqué.

DEXAMETHASONE+FRAMYCETINE

- FRAKIDEX Pommade Ophtalmique T/5 GR CHAUVIN TA Locale 1.938 DT [E]

DEXAMETHASONE+NEOMYCINE

• DEXAMEX 0.1% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 2.357 DT [E]

DEXAMETHASONE+NEOMYCINE+POLYMYXINE B

- MAXIDROL Collyre FL/3 ML ALCON FRANCE TA Locale 2.203 DT [E]
- P.N.D Collyre FL/3 ML UNIMED TA Locale 2.100 DT [E]

HYDROCORTISONE+OXYTETRACYCLINE

• STER-DEX Pommade Ophtalmique B/12 Tubes THEA TA Locale 2.000 DT [E]

PREDNISOLONE+NEOMYCINE

• NEOPRED Collyre FL/5 ML MEDIS TA Locale 2.200 DT [E]

DEXAMETHASONE+TOBRAMYCINE

- TOBRACORT Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 3.700 DT [E]
- TOBRADEX Collyre FL/5 ML ALCON FRANCE TA Locale 4.192 DT [E]
- TOBRADEX Pommade Ophtalmique T/3.5 GR ALCON BELGIQUE TA Locale 5.986 DT [E]

14.2.4. - Mydriatiques - cycloplégiques

L'utilisation d'atropine ou de produits analogues se justifie pour dilater la pupille dans des cas de kératite et d'uvéite, ou pour l'examen du fond de l'oeil. Il est nécessaire de prévenir le patient de la cycloplégie et de la mydriase qui, suivant les dérivés utilisés, peuvent durer de quelques heures à quelques jours. Les mydriatiques sont formellement contre-indiqués chez les malades atteints (ou à risque) de glaucome à angle fermé. Des effets systémiques peuvent survenir.

ATROPINE

• ATROPINE UNIMED 0.5% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 1.200 DT [E]

CYCLOPENTOLATE

• CYCLOCOL 0.5% Collyre FL/0.5 ML UNIMED TA Locale 1.000 DT [E]

PHENYLEPHRINE

• NEOPHRINE 10% Collyre FL/10 ML UNIMED Locale 2.180 DT [E]

14.2.5. - Médicaments du glaucome

Dans le traitement du glaucome, il est fait appel à l'application locale de collyres à base d'agents cholinomimétiques, de β-bloquants, d'α-sympathicomimétiques ou de dérivés des prostaglandines tel le latanoprost. Si la baisse de tension est insuffisante, un inhibiteur de l'anhydrase carbonique à usage local (dorzolamide, brinzolamide) ou éventuellement à usage systémique (voir *Diurétiques*) peut aussi être administré. Le choix et la posologie varient en fonction du type de glaucome. Toute interruption du traitement peut être dangereuse.

Les β -bloquants, spécialement indiqués dans le glaucome à angle ouvert, ont l'avantage de ne devoir être appliqués qu'une ou deux fois par jour, mais ils peuvent provoquer, même en usage local, de la bradycardie et favoriser les bronchospasmes.

Les dérivés des prostaglandines et le *latanoprost*, peuvent entraîner à long terme une coloration plus foncée de l'iris, et peuvent être responsables d'une récidive d'une uvéite antérieure préexistante.

14.2.5.1. - Cholinomimétiques

PILOCARPINE

• PILO 2% Collyre FL/10 ML CHAUVIN TA Locale 2.894 DT [E]

14.2.5.2. - Bêta-bloquants

BETAXOLOL

- BETOPTIC 0.5% Collyre FL/3 ML ALCON FRANCE TA Locale 6.571 DT [E]
- BETOPTIC 0.25% Collyre FL/3 ML ALCON BELGIQUE TA Locale 6.571 DT [E]

TIMOLOL

- NORMOPTIC 0.5% Collyre FL/5 ML MEDIS TA Locale 2.745 DT [E]
- NORMOPTIC 0.25% Collyre FL/5 ML MEDIS TA Locale 2.700 DT [E]
- TUNOLOL 0.25% Collyre B/15 Ophtadoses/0,45 ML UNIMED TA Locale 4.000 DT [E]
- TUNOLOL 0.5% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 2.745 DT [E]
- TUNOLOL 0.25% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 2.700 DT [E]
- TUNOLOL 0.5% Collyre B/15 Ophtadoses/0,45 ML UNIMED TA Locale 4.200 DT [E]

CARTEOLOL

- CARTEOL LP 1% Collyre FL/3 ML CHAUVIN TA Locale 12.465 DT [E]
- CARTEOL LP 2% Collyre FL/3 ML CHAUVIN TA Locale 12.465 DT [E]

14.2.5.3. - Alfa-sympathicomimétiques

APRACLONIDINE

- IOPIDINE 0.5% Collyre FL/5 ML ALCON FRANCE TA Locale 25.644 DT [E]
- IOPIDINE 1% Collyre B/2/0.25 ML ALCON FRANCE TA Locale [E]

BRIMONIDINE

ALPHAGAN 0.2% Collyre FL/5 ML ALLERGAN FRANCE SA TA Locale 16.900 DT [E]

TROPICAMIDE

• MYDRICOL 0.5% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 1.920 DT [E]

14.2.5.4. - Analogues des prostaglandines

LATANOPROST

• XALATAN 50 µG/ML Collyre FL/2.5 ML PFIZER SA TA Locale 34.000 DT [E]

LATANOPROST+ TIMOLOL

• XALACOM collyre FL/2.5 ml PFIZER SA TA Locale 37.394 DT [E]

BIMATOPROST

• LUMIGAN 0.3 MG/ML Collyre FL/3 ML ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND TA Locale 30.306 DT [E]

BIMATOPROST+TIMOLOL

• GANFORT 0.3 MG/ML + 5MG/ML Collyre FL/3 ML ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND TA Locale 43.870 DT [E]

TRAVOPROST

• TRAVATAN 40 µg/ML Collyre FL/2.5 ML ALCON LABORATORIES UK Ltd TA Locale 30.225 DT [E]

14.2.5.5. - Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

ACETAZOLAMIDE

• DIAMOX 250 MG Comprimé Sécable B/24 THERAPLIX TC Orale 2.208 DT [E]

BRINZOLAMIDE

• AZOPT 1% Collyre FL/5 ML ALCON LABORATORIES UK Ltd TA Locale 19.506 DT [E]

DORZOLAMIDE

- ALZOR 2% Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 16.000 DT [E]
- TRUZOPT 2% Collyre FL/5 ML MSD CHIBRET TA Locale 18.854 DT [E]

14.2.5.6. - Associations

PILOCARPINE+CARTEOL

• CARPILO Collyre FL/3 ML CHAUVIN TA Locale 6.512 DT [E]

PILOCARPINE+TIMOLOL

• PILOLOL Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 6.000 DT [E]

DORSOLAMINE+TIMOLOL

- COSOPT Collyre FL/5 ML MSD CHIBRET TA Locale 26.165 DT [E]
- ZOLOL 100MG/25MG Collyre FL/5 ML UNIMED TA Locale 18.720 DT [E]

BRIMONIDINE+TIMOLOL

• COMBIGAN Collyre FL/5 ML ALLERGAN-EUROCENTRE TA Locale 28.755 DT [E]

TRAVOPROST+TIMOLOL

• DUOTRAV 40μG/ML+5MG/ML Collyre FL/2.5 ML ALCON TA Locale 37.395 DT [E]

14.2.6. - Médicaments de la cataracte

INOSINE

• CATACOL 0.1% Collyre FL/10 ML ALCON FRANCE Locale [C]

MSB

• DULCIPHAK Collyre FL/10 ML ALLERGAN FRANCE S.A.S. Locale 2.455 DT [C]

14.2.7. - Larmes artificielles

Ces préparations doivent être appliquées plusieurs fois par jour.

CARBOMERE

- GEL-LARMES 0.3% Gel Ophtalmique T/10 GR THEA Locale 5.727 DT [E]
- LACRIFLUID 0.13% Collyre FL/10 GR EUROPHTA Locale 5.165 DT [E]
- LACRINORM 0.2% Gel Ophtalmique T/10 GR CHAUVIN Locale 4.654 DT [E]
- LACRYVISC Gel Ophtalmique T/15 GR ALCON FRANCE Locale 8.024 DT [E]
- LIPOSIC 0.2% Gel Ophtalmique T/10 GR CHAUVIN Locale 4.750 DT [E]
- SICCAFLUID 0.25% Gel Ophtalmique FL/10 GR THEA Locale 5. 390 DT [E]

CARMELLOSE

• CELLUVISC 4 MG/0.4 ML Collyre B/30 Flacons Unidoses ALLERGAN FRANCE SAS Locale 5.340 DT [E]

HYPROMELLOSE

• ARTELAC 3.2 MG Collyre Fl/10ML CHAUVIN Locale 5.255 DT [E]

CHLORURE DE SODIUM

• LARMES ARTIFICIELLES UNIMED 1.4% Collyre FL/5 ML UNIMED Locale 0.950 DT [E]

CHONDROITINE

• LACRYPOS Collyre FL/10 ML ALCON FRANCE Locale 2.182 DT [E]

POVIDONE

• LACRYMED 6MG/0.4ML Collyre B/20 unidoses UNIMED Locale 4.200 DT [E]

14.2.8. - Préparations protectrices ou cicatrisantes

VITAMINE A

• VITAMINE A FAURE Collyre FL/10 ML EUROPHTA Locale 2.050 DT [1]

14.2.9. - Produits de contactologie

CHLORHEXIDINE+THIMEROSAL

• C.LENS Solution Externe FL/180 ML OPALIA PHARMA Locale 6.915 DT [C]

14.2.10. - Bains et lavages oculaires

ACIDE BORIQUE+BORATE DE SOUDE

• DACUROSE Collyre B/10/10 ML UNIMED Locale 2.200 DT [I]

14.2.11.- Solutions à usage chirurgical

HYALURONATE DE SODIUM

- HEALON GV 14 MG/ML Solution Intraoculaire SER/0.85 ML ADVANCED MEDICAL OPTIC UPPSALA AB Locale 70.259 DT [E]
- HEALON 10 MG/ML Solution Intraoculaire SER/0.85 ML ADVANCED MEDICAL OPTIC UPPSALA AB Local 65.180 DT [E]
- OPHTALIN 10 MG/ML Solution Intraoculaire B/1 SER/1ML HYALTECH LTD Locale 61.151 DT [E]

HYALURONATE DE SODIUM +CHONDROITIN

 DUOVISC Solution Intraoculaire B/ 1SER/0.55 ML + S2R/0.5 ML ALCON LABORATOIRES UK Ltd Locale [C]

14.2.12. - Produits divers en ophtalmologie

HYDROXYMETHYLCELLULOSE+PHOSPHATE DISODIQUE.MONOSODIQUE

• GONIOSOL Collyre FL/10 ML ALCON FRANCE Locale [9]

INOSINE

• CORRECTOL 0.1% Collyre FL/10ML ALCON France Locale 2.155 DT [C]

OXYBUPROCAINE

• CEBESINE 0.4% Collyre FL/10 ML CHAUVIN TA Locale 2.941 DT [1]

ANTHACYANOSIDES+BETACAROTENE

• DIFRAREL 100 MG Comprimé Enrobé B/20 LEURQUIN MEDIOLANUM Orale 5.465 DT [C]

ANTHOCYANOSIDES+VITAMINE E

• DIFRAREL E 50 MG Comprimé Enrobé B/24 LEURQUIN MEDIOLANUM Orale 4.830 DT [9]

VITAMINE C+RUTOSIDE+VITAMINE E

• VELITEN Comprimé Pelliculé B/30 LAPHAL FRANCE Orale 5.531 DT [C]

14.3. - MEDICAMENTS A USAGE AURICULAIRE

Ce chapitre reprend :

- les associations de corticostéroïdes à des antimicrobiens
- les préparations ramollissant le cérumen
- les antivertigineux
- les associations diverses.

Les gouttes auriculaires peuvent être utiles pour le traitement d'états inflammatoires ou infectieux du conduit auditif. En cas d'infection de l'oreille moyenne, le traitement local doit être plutôt administré au niveau du rhinopharynx.

En cas d'otite moyenne, les préparations contenant un agent anesthésique peuvent exercer une action antalgique passagère mais sont susceptibles de retarder le diagnostic adéquat. Elles peuvent provoquer des réactions allergiques locales et sont contre-indiquées en cas de perforation du tympan, car elles peuvent être toxiques au niveau cochléaire. En cas d'otalgie, il est préférable d'administrer un analgésique comme le paracétamol par voie orale.

La plupart des préparations contiennent un antibactérien associé à un corticostéroïde. Leur indication principale est l'otite externe, pour autant que le tympan ne soit pas perforé. Les antibactériens fréquemment responsables de réactions allergiques locales seront évités. Il en va de même pour les antibactériens utilisés par voie générale étant donné le risque de réactions allergiques lors d'un usage systémique ultérieur et le développement de résistance.

Certaines gouttes otiques sont destinées à ramollir les bouchons de cérumen. Des réactions cutanées sont possibles.

Certaines gouttes à usage nasal ou ophtalmique sont aussi parfois utilisables pour l'usage otique (voir *Médicaments utilisés dans les rhinites et sinusites* et *Médicaments à usage ophtalmique*). Ne sont reprises ici que les préparations à usage exclusivement auriculaire.

14.3.1. - Corticostéroïdes et/ou antimicrobiens

En cas de perforation du tympan, ce qui peut survenir en cas d'otite moyenne, l'administration de gouttes contenant un antibiotique ototoxique tel la néomycine peut entraîner une surdité de perception irréversible.

DEXAMETHASONE+NEOMYCINE+POLYMYXINE B

POLYDEXA 10 MG Gouttes Auriculaires FL/10.5 ML BOUCHARA-RECORDATI TA Locale 1.465 DT [I]

DEXAMETHASONE+NYSTATINE+POLYMYXINE B+OXYTETRACYCLINE

AURICULARUM Poudre Auriculaire + Solvant GRIMBERG TA Locale 10.990 DT [I]

FLUDROCORTISONE+NEOMYCINE+POLYMYXINE B

• PANOTILE Gouttes Auriculaires FL/8 ML ZAMBON FRANCE TA Locale 3.432 DT [I]

OFLOXACINE

• OFLOMED 1.5 MG/0.5 ML Gouttes Auriculaires B/20/Recipient Unidose/0.5 ML UNIMED TA Locale 6.400 DT [I]

RIFAMYCINE

• OTOFA Gouttes Auriculaires FL/10 ML BOUCHARA-RECORDATI TA Locale 3.625 DT [I]

14.3.2. - Préparations ramollissant le cérumen

DOCUSATE SODIQUE

• ORILYSE 0.5% Gouttes Auriculaires FL/10 ML PHARMAGHREB Locale 3.300 DT [I]

XYLENE

• CERULYSE 5% Gouttes Auriculaires FL/10 ML CHAUVIN Locale 2.860 DT [I]

14.3.3. - Antivertigineux

L'acétylleucine est un médicament antivertigineux non antihistaminique de mécanisme d'action inconnu mais qui a fait ses preuves sur la crise vertigineuse.

ACETYL-DL-LEUCINE

- TANGANIL 500 MG Comprimé Sécable B/30 PIERRE FABRE PRODUCTION TUNISIE Orale 10.400 DT [C]
- TANGANIL 500 MG Solution Injectable B/5/5 ML PIERRE FABRE MEDICAMENT Parentérale H [C]

14.3.4. - Associations diverses

La plupart de ces associations contiennent des anesthésiques locaux. Elles sont à déconseiller.

EPHEDRINE+RESORCINE

• OSMOTOL Gouttes Auriculaires FL/10 ML CHAUVIN Locale 1.155 DT [1]

PHENAZONE+LIDOCAINE

- AURIPAX Gouttes Auriculaires FL/15 ML OPALIA PHARMA Locale 1.980 DT [I]
- OTIPAX Gouttes Auriculaires FL/15 ML PHARMAGHREB Locale 2.290 DT [I]

14.4. - MEDICAMENTS DES AFFECTIONS BUCCO-PHARYNGEES

Ce chapitre reprend:

- les pastilles à sucer à base d'antibiotiques ou de sulfamidés
- les autres pastilles à sucer

- les bains de bouche, collutoires et gargarismes
- les préparations pour les dents ou les gencives.

Les préparations à base de fluorure sont reprises dans le chapitre Vitamines, minéraux et toniques.

L'intérêt des thérapeutiques locales dans les affections bucco-pharyngées est limité. Dans les infections bactériennes du bucco-pharynx, l'efficacité d'antibiotiques ou de sulfamidés utilisés localement n'a jamais été prouvée. En cas d'affections douloureuses, une préparation à base d'un anesthésique local peut être utilisée; dans le cas d'aphtose, un corticostéroïde peut être appliqué localement.

Les préparations contenant des dérivés mercuriels et des sulfamidés sont à déconseiller. Celles qui contiennent des anesthésiques locaux, spécialement la procaïne, sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

14.4.1. - Antifongique à usage stomatologique

MICONAZOLE

DAKTARIN 2% Gel Buccal T/40 GR JANSSEN-CILAG TA Locale 8.705 DT [C]

AMPHPTERICINE B

FUNGIZONE 10% Suspension Buvable FL/40 ML BRISTOL MYERS SQUIBB TA Orale 3.930 DT [I]

MYCOSTATINE

MIKOSTAT 100 000 UI/ML Suspension Buvable FL/30 ML+Compte-gouttes JULPHAR TA Locale 2.717 DT [I]

14.4.2. - Pastilles à sucer

L'intérêt thérapeutique de ces préparations n'est le plus souvent pas démontré.

VITAMINE C+CHLORHEXIDINE+TETRACAINE

- DRILL Pastilles B/24 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.245 DT [C]
- DRILL CITRON MENTHE Pastilles B/24 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.245 DT [9]
- DRILL MIEL ROSAT Pastilles B/24 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.245 DT [G]
- DRILL SANS SUCRE pastille édulcoré à l'aspartam et l'isomalt Pastilles B/24 PIERRE FABRE MEDICAMENT Orale 5.245 DT ^[C]

14.4.3. - Bains de bouche, collutoires et gargarismes

TIXOCORTOL+CHLORHEXIDINE

• THIOVALONE 0.333% Collutoire FL/12 ML/66 dos PFIZER S.A TA Locale 4.432 DT [C]

HEXETIDINE

• HEXABAIN 1 MG Soluté Buccal FL/200 ML SIPHAT Locale 1.515 DT [C]

ACIDE SALICYLIQUE+MENTHOL+RESORCINE+VERATROL

- SYNTHOL Soluté Buccal FL/450 ML GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC Locale 7.130 DT [C]
- SYNTHOL Soluté Buccal FL/225 ML GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC Locale 3.975 DT [C]

CHLORHEXIDINE

- COLLUXID Soluté Buccal FL/120 ML OPALIA PHARMA Locale 2.205 DT [C]
- ELUDRIL 0.1% Soluté Buccal FL/90 ML SIMED Locale 2.880 DT [C]
- HEXIDENT 0.2% Soluté Buccal FL/125 ML PHARMADERM Locale 2.380 DT [C]

MENTHOL+VERATROLE+RESORCINOL+ACIDE SALICYLIQUE

• SAVEROL Solute Buccal FL/400 ML OPALIA PHARMA Locale 4.985 DT [C]

BENZYDAMINE

- VERAX BLU Solute Buccal FL/120 ML OPALIA PHARMA Locale 2.710 DT [C]
- VERAX BLU Collutoire FL/30 ML OPALIA PHARMA Locale 3.285 DT [C]

14.4.4. - Préparations pour les dents ou les gencives

La plupart de ces préparations contiennent un anesthésique local et sont utilisées dans l'espoir d'un soulagement momentané lors des poussées dentaires ou avant un traitement dentaire.

BICLOTYMOL

• HEXASPRAY 0.75% Collutoire FL/30 GR BOUCHARA-DECORDATI FRANCE Locale 4.266 DT [9]

SALICYLATE DE CHOLINE

• PANSORAL Gel Buccal T/12 GR SIMED Locale 2.690 DT [C]

TAMARIN

• DELABARRE Gel Gingival T/20 GR FUMOUZE Locale 6.060 DT [9]

14.4.5 – Hygiène buccodentaire

ETHACRIDINE

• PYOREX Pâte Dentaire T/90 GR BAILLY-CREAT Locale 5.166 DT [C]

FLUOR

• FLUOCARIL BI-FLUORE 250 MG Pate Dentaire T/75 ML TERIAK Locale 3.950 DT [C]

14.5. - PREPARATIONS DES AFFECTIONS VULVO-VAGINALES

Dans les vulvo-vaginites, le choix d'une thérapeutique locale et/ou générale doit être déterminé en fonction du ou des germes pathogènes responsables et du fait qu'il s'agit d'une infection aiguë, chronique ou récidivante.

Les préparations contenant plusieurs substances sont en général à déconseiller. Le traitement du partenaire, même asymptomatique, s'impose souvent car il peut être responsable de réinfestation, spécialement dans les infections à gonocoques, à *Trichomonas V aginalis* ou à *Chlamydia Trachomatis*.

Dans la *Trichomonase Vaginale*, le traitement local n'a pas d'utilité. Le métronidazole et d'autres dérivés de l'imidazole doivent être utilisés par voie générale (voir *Antiparasitaires*).

Les vulvo-vaginites à *Candida* qui se manifestent notamment en cas de grossesse et d'utilisation de contraceptifs hormonaux, d'antibiotiques à large spectre, de métronidazole, de corticostéroïdes et d'antimitotiques requièrent l'administration locale une à deux fois par jour soit d'un dérivé azolique pendant 1 à 7 jours, soit de nystatine pendant deux semaines. La prise de dérivés azoliques par voie orale n'est indiquée qu'en cas d'échec du traitement local. La prise de nystatine par voie orale peut s'indiquer lorsque le tube digestif est le réservoir des candidas.

Le traitement local des infections gonococciques n'a pas de sens.

Pour les vaginites à *Gardnerella vaginalis* (anciennement dénommé Haemophilus vaginalis) et/ou à *germes anaérobies*, un traitement local par la clindamycine pendant 7 jours peut être envisagé. L'utilité d'un traitement local par des antiseptiques (par exemple la polyvidone iodée) ou par d'autres antibiotiques est controversée. Le métronidazole ou d'autres dérivés imidazolés (voir *Antiparasitaires*) pris par voie orale sont actifs sur les anaérobies et Gardnerella vaginalis.

Les infections gynécologiques dues à *Chlamydia Trachomatis* ne sont pas traitées localement. Elles répondent à la prise de doxycycline ou d'érythromycine per os pendant 10 à 14 jours, ou encore d'azithromycine per os à raison d'une prise unique.

L'utilisation locale d'estrogènes ne se justifie dans les vulvo-vaginites atrophiques que lorsque les estrogènes par voie générale ne sont pas indiqués ou mal tolérés.

Les effets indésirables se limitent habituellement à des réactions locales, qui sont surtout fréquentes avec les sulfamidés. Le métronidazole, partiellement résorbé lors d'application vaginale, est à déconseiller au cours de la grossesse, surtout dans les premiers mois.

La posologie n'a pas été mentionnée. En effet, elle varie en fonction de la situation clinique; en outre, les posologies reprises sur les notices sont souvent divergentes. On s'en tiendra dès lors aux directives générales reprises ci-dessus en ce qui concerne le nombre d'applications journalières et la durée du traitement.

Il est possible que des excipients gras présents dans certains médicaments à usage vaginal altèrent le latex des préservatifs.

ECONAZOLE

- ECOREX 150 MG Ovule B/3 OPALIA PHARMA Locale 6.380 DT [1]
- ECOREX LP 150 MG Ovule B/1 OPALIA PHARMA Locale 6.380 DT [1]
- ECOZYL 150 MG Ovule B/3 WEST PHARMA Locale 4.800 DT [1]
- FONGICIL 150 MG Ovule B/3 DAR ESSAYDALI Locale 4.905 DT [I]
- GYNO-PEVARYL 150 MG Ovule B/3 PHARMAGHREB Locale 7.210 DT [I]

MICONAZOLE

- MYCOHEAL 400 MG Ovule B/3 DAR ALDAWA Locale 2.348 DT [I]
- MYCOHEAL 200 MG Ovule B/7 DAR ALDAWA Locale 2.178 DT [1]

NYSTATINE

• NYSTATINE 2% Pommade T/25 GR SIPHAT TA Locale 1.980 DT [E]

TENONITROZOLE

ATRICAN 250 MG Capsule Molle B/8 INNOTHECH INTERNATIONAL TA Orale 6.660 DT [I]

TINIDAZOLE

• FASIGYNE 500 MG Comprimé Enrobé B/4 PFIZER TUNISIE PHARMACEUTICALS TA Orale 2.930 DT [1]

METRONIDAZOLE

- PROTOGYL 500 MG Ovule B/10 SIMED TA Locale 2.875 DT [I]
- VAGILEN 500 MG Ovule B/10 OPALIA PHARMA TA Locale 2.750 DT [I]

METRONIDAZOLE+NEOMYCINE+NYSTATINE

• TERGYNAN Comprimé Gynécologique B/10 BOUCHARA-RECORDATI TA Locale 4.908 DT [I]

POLYVIDONE IODEE

• BETADINE 10% Solution Gynécologique FL/125 ML VIATRIS PHARMACEUTICALS Locale 2.470 DT [I]

NEOMYCINE+NYSTATINE+POLYMYXINE

• POLYGYNAX Capsules Gynécologiques B/6 INNOTECH INTERNATIONAL TA Locale 3.945 DT [I]

14.6. - ANESTHESIQUES LOCAUX

Les anesthésiques locaux sont des esters ou des amides (articaïne, bupivacaïne, lidocaïne, mépivacaïne, prilocaïne).

Les effets indésirables des anesthésiques locaux sont un collapsus cardio-vasculaire, une bradycardie, des troubles de la conduction cardiaque, un arrêt cardiaque et des manifestations liées à une toxicité centrale (agitation, angoisse, tremblements, convulsions); ces effets indésirables sont surtout à craindre lors de surdosage ou d'injection intravasculaire. Avec la prilocaïne, une méthémoglobinémie peut aussi survenir. Des réactions allergiques sont possibles; elles sont plus fréquentes avec les esters. Il s'agit surtout de réactions locales d'hypersensibilité; les réactions de type anaphylactoïde ou anaphylactique sont rares. Le diagnostic in vitro est impossible. L'allergie croisée est fréquente entre les anesthésiques de type ester, mais elle est rare entre les anesthésiques de type ester et ceux de type amide. Les parabens et bisulfites, souvent ajoutés comme agents conservateurs, peuvent également être responsables de réactions (pseudo-) allergiques. Les anesthésiques locaux traversent la barrière placentaire et peuvent ainsi provoquer des effets indésirables chez les nouveau-nés.

Les solutions d'anesthésiques locaux contiennent aussi souvent un vasoconstricteur, dans le but d'en ralentir la résorption et de prolonger ainsi la durée de l'anesthésie. Etant donné la possibilité de nécrose, ces associations ne peuvent pas être utilisées pour l'anesthésie des organes à circulation terminale tels les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et le pénis. Ces vasoconstricteurs, souvent doués de propriétés α - et β -mimétiques, peuvent provoquer une vasoconstriction généralisée et de l'hypertension, des arythmies et des douleurs angoreuses. L'emploi d'anesthésiques locaux contenant des vasoconstricteurs

doit se faire avec prudence chez les patients atteints d'arythmies, d'ischémie coronarienne, d'hypertension, de thyréotoxicose, et chez les patients traités par un inhibiteur des monoamines oxydases.

Les préparations contenant des anesthésiques locaux destinés à l'application cutanée sont reprises dans le chapitre Médicaments à usage dermatologique, celles utilisées pour l'anesthésie de l'urèthre figurent dans le chapitre Médicaments du système uro-génital.

Les anesthésiques pour usage dentaire sont représenté par la mépivacaine et l'articaine. Ces produits sont contre indiqués en cas d'hypersensibilité ou épilepsie non contrôlée.

La survenue d'un effet indésirable doit faire suspecter un surdosage. Les réactions toxiques, témoins d'un surdosage en anesthésique local, peuvent apparaître dans deux conditions : soit immédiatement par surdosage relatif dû à un passage intraveineux accidentel, soit plus tardivement par surdosage vrai dû à l'utilisation d'une trop grande quantité d'anesthésique. Les signes de toxicité peuvent être neurologiques : nervosité, agitation, céphalées, nausées ; respiratoire : tachypnée, puis apnée et cardiovasculaire : effet inotrope négatif, hypotension artérielle.

LIDOCAINE

- CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE 1% Solution Injectable B/1/4 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE 1% Solution Injectable B/1/5 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE AGUETTANT 1 POUR CENT SANS CONSERVATEUR 1% Solution Injectable B/10 FL/20 ML AGUETTANT TC Parentérale [E]
- CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE AGUETTANT 2 % SANS CONSERVATEUR 2% Solution Injectable B/10 FL/20 ML AGUETTANT TC Parentérale [E]
- LIDOCAINE 5% Solution Externe FL/24 ML LAPROPHAN TA Parentérale H [E]
- LIDOJECT 1% Solution Injectable B/50/10 ML LABESFAL ALMIRO S.A TC Parentérale [E]
- LIDOJECT 2% Solution Injectable B/50/10 ML LABESFAL ALMIRO S.A TC Parentérale [E]
- UNICAINE 1% Solution Injectable B/10/5 ML UNIMED TC Parentérale 3.790 DT [E]
- UNICAINE 2% Solution Injectable B/10/5 ML UNIMED TC Parentérale 4.265 DT [E]
- UNICAINE 1% Solution Injectable B/50/10 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- UNICAINE 2% Solution Injectable B/50/10 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- UNICAINE 2% Solution Injectable B/50/5 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- UNICAINE 1% Solution Injectable B/50/5 ML UNIMED TC Parentérale [E]
- XYLOCAINE VISQUEUSE 2% Gel Oral T/100 GR ASTRA ZENECA TC Locale 2.489 DT [E]
- XYLOCAINE URETRAL 0.30 GR/15 GR Gel Dermique T/15 GR ASTRA ZENECA TC Locale 6.189 DT [E]

LIDOCAINE+ADRENALINE

- LIDOCAINE 2% A L'ADRENALINE Solution Injectable B/10 FL/20 ML AGUETTANT TA Parentérale H [E]
- LIDOCAINE 1% ADRENALINE Solution Injectable B/10 FL/20 ML AGUETTANT TA Parentérale H [E]

LIDOCAINE+PRILOCAINE

- EMLA 5% Crème Dermique T/5 GR ASTRA ZENECA TC Locale 7.314 DT [E]
- PRILIA 5% Crème Dermique T/5 GR OPALIA PHARMA TC Locale 5.850 DT [E]PRILIA 5% Crème Dermique T/30 GR OPALIA PHARMA TC Locale 21.450 DT [E]

ARTICAINE+ADRENALINE

- PRIMACAINE adrénaline 1/100000 Solution Injectable B/50 Cartouches PIERRE ROLLAND TA Parentérale H [E]
- PRIMACAINE adrénaline 1/200000 Solution Injectable B/50 cartouches PIERRE ROLLAND TA Parentérale H [E]

- SEPTANEST ADRENALINEE 1/100 000 Solution Injectable B/50/1.8 ML SEPTODENT TA Locale H [E]
- SEPTANEST ADRENALINEE 1/200 000 Solution Injectable B/50/1.8 ML SEPTODENT TA Locale H [E]
- UBISTESIN ADRENALINEE 1/200 000 UI Solution Injectable B/50 Cartouches/1.7 ML 3M ESPE AG TA Locale H [E]
- UBISTESIN ADRENALINEE 1/100 000 UI Solution Injectable B/50 Cartouches/1.7 ML 3M ESPE AG TA Locale H [E]

MEPIVACAINE

- MEDICAINE 3% sans vasoconstricteur 3% Solution Injectable B/50 Carpules/1.8ML MEDIS TC Locale H [E]
- MEDICAINE 2% avec adrénaline Solution Injectable B/50 CARPULES/1.8ML MEDIS TA Parentérale [E]
- MEPIVACAINE+ADRENALINE SCANDICAINE 2 POUR CENT SPECIALE Solution Injectable B/50 CARTOUCHES/1.8ML SEPTODENT TA Locale H [E]

BUPIVACAINE

- BUPICAINE 0.5% Solution Injectable B/10/10 ML UNIMED TC Parentérale H [E]
- BUPICAINE 0.25% Solution Injectable B/10/10 ML UNIMED TC Parentérale H [E]
- BUPIVACAINE 0.25% Solution Injectable B/10/20ML AGUETTANT TC Parentérale H [E]
- BUPIVACAINE 0.5% Solution Injectable B/10/20ML AGUETTANT TC Parentérale H [E]

ETHYLE CHLORURE

• WARIACTIV-CHLORURE D'ETHYLE Aérosol FL/100ML WALTER RITTER Locale [E]

15. - AGENTS DE DIAGNOSTIC

Ce chapitre reprend:

- les agents de radiodiagnostic
- les agents de diagnostic par résonance magnétique

Les hormones et polypeptides d'origine hypothalamo-hypophysaire utilisés comme agents de diagnostic différentiel endocrinien sont repris aux chapitres correspondants.

15.1. - AGENTS DE RADIODIAGNOSTIC

15.1.1. - Produits iodés

Les produits de contraste iodés peuvent être subdivisés en:

- préparations de haute osmolalité: monomères ioniques
- préparations de faible osmolalité: dimères ioniques, monomères non ioniques et dimères non ioniques.

Les préparations iodées, même après prise orale, peuvent entraîner des réactions allergiques; celles-ci peuvent apparaître jusqu'à 48 heures après l'administration. Administrés par voie parentérale, les produits de contraste iodés peuvent entraîner des réactions anaphylactiques, une instabilité hémodynamique et une néphrotoxicité; une hyperthyréose peut survenir, surtout chez les patients qui ont une production autonome d'hormones thyroïdiennes (par ex. un goitre autonome multinodulaire). Les effets indésirables bénins tels nausées, sensation de chaleur, douleur et réactions cutanées superficielles sont nettement moins fréquents avec les substances de faible osmolalité, en particulier avec les préparations non ioniques. Il n'est pas évident que cela soit aussi vrai pour les effets indésirables graves; cependant la néphrotoxicité, surtout chez les patients à risque (par exemple, les insuffisants rénaux ou les patients atopiques), semble être moindre avec les substances de faible osmolalité.

15.1.1.1. - Haute osmolalité (monomères ioniques)

HUILE D'OEILLETTE ESTERS ETHYL.DES AC.GRAS IODES

 LIPIODOL ULTRA-FLUIDE 480 MG d'iode /ML Solution Injectable AMP/10 ML GUERBET Parentérale H [E]

15.1.1.2. - Faible osmolalité

Monomères non ioniques

IOBITRIDOL

- XENETIX 350 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/20ML GUERBET TC Parentérale 14.138 DT [E]
- XENETIX 350 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/50ML GUERBET TC Parentérale 70.692 DT [E]
- XENETIX 300 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/100ML GUERBET TC Parentérale 63.048 DT [E]
- XENETIX 300 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/60ML+SERINGUE+ MICROPERFUSEUR GUERBET TC Parentérale 39.388 DT [E]

 XENETIX 300 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/50ML+SERINGUE+ MICROPERFUSEUR GUERBET TC Parentérale [E]

IOPAMIDOL

- SCANLUX 300 MG/ML Solution Injectable FL/100 ML SANOCHEMIA Pharmazeutika TC Parentérale 68.332 DT [E]
- SCANLUX 300 MG/ML Solution Injectable FL/50 ML SANOCHEMIA Pharmazeutika TC Parentérale 37.271 DT [E]
- SCANLUX 370 MG/ML Solution Injectable FL/100 ML SANOCHEMIA Pharmazeutika TC Parentérale 77.648 DT [E]
- SCANLUX 370 MG/ML Solution Injectable FL/50 ML SANOCHEMIA Pharmazeutika TC Parentérale 40.377 DT [E]

IOXAGLATE DE SODIUM+IOXAGLATE DE MEGLUMINE

- HEXABRIX 320 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/50 ML GUERBET TC Parentérale 47.923 DT [E]
- HEXABRIX 320 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/20 ML GUERBET TC Parentérale 18.721 DT [E]

IOHEXOL

- OMNIPAQUE 300 MG d'iode /ML Solution Injectable B/10FL/100ML GE HEALTHCARE AS NORVEGE TC Parentérale H [E]
- OMNIPAQUE 350 MG d'iode /ML Solution Injectable B/10FL/50ML GE HEALTHCARE AS NORVEGE TC Parentérale H [E]

IOXITALAMATE DE Na, MEGLUMINE

- TELEBRIX 35 Solution Injectable FL/50 ML GUERBET TC Parentérale 14.075 DT IEI
- TELEBRIX 35 Solution Injectable FL/100 ML GUERBET TC Parentérale 22.132 DT [E]
- TELEBRIX 35 Solution Injectable FL/200 ML GUERBET TC Parentérale 40.152 DT [E]

IOPROMIDE

- ULTRAVIST 370 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/50ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale 37.556 DT [E]
- ULTRAVIST 370 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/100 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale 75.269 DT [E]
- ULTRAVIST 300MG d'iode/ML Solution Injectable FL/100 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale 62.697 DT [E]
- ULTRAVIST 300 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/50 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale 31.318 DT [E]
- ULTRAVIST 300 MG d'iode/ML Solution Injectable FL/20 ML BAYER SCHERING PHARMA TC Parentérale 31.318 DT [E]

15.1.2. - Sulfate de baryum

BARYUM SULFATE

- MICROPAQUE Suspension Buvable FL/150ML GUERBET Orale 5.917 DT [E]
- MICROPAQUE Suspension Buvable BIDON/2L GUERBET Orale H [E]

15.2. - AGENTS DE DIAGNOSTIC PAR RESONANCE MAGNETIQUE

Dérivés du Gadolinium

Le gadopentétate et de méglumine est un agent pour l'imagerie par résonance magnétique. Ce sont des chélates de gadolinium à distribution extracellulaire, qui entraînent un contraste positif. Des effets

indésirables mineurs tels des nausées, des céphalées et des réactions cutanées superficielles sont rares. Le risque d'effets indésirables n'est pas accru chez les patients qui présentent une hypersensibilité aux produits de contraste iodés.

MEGLUMINE GADOPENTETATE

- DOTAREM Solution Injectable FL/10 ML GUERBET TC Parentérale H [E]
- DOTAREM Solution Injectable FL/20 ML GUERBET TC Parentérale H [E]
- DOTAREM Solution Injectable FL/15 ML GUERBET TC Parentérale H [E]
- MAGNEVIST Solution Injectable FL/10 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale H [E]
- MAGNEVIST Solution Injectable FL/20 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale H [E]
- MAGNEVIST Solution Injectable FL/15 ML BAYER SCHERING PHARMA AG TC Parentérale H [E]

15.3. - AUTRES AGENTS DE DIAGNOSTIC

GADODIAMIDE

- OMNISCAN 0.5 mmol/ML Solution Injectable B/10FL/20 ML AMERSHAM HEALTH AS NORVEGE Parentérale [E]
- OMNISCAN 0.5 mmol/ML Solution Injectable B/10FL/10 ML AMERSHAM HEALTH AS NORVEGE Parentérale [E]
- OMNISCAN 0.5 mmol/ML Solution Injectable B/10FL/15 ML AMERSHAM HEALTH AS NORVEGE Parentérale [E]

TUBERCULINE

• BIOCINE TEST PPD 2 DOSE Solution Injectable FL/2 DOSES BIOCINE PARENTERALE 6.515 DT^[E]

16. – LES THERAPEUTIQUES COMPLEMENTAIRES ET ALTERNATIVES

16.1. – LES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES

Ce sont des remèdes préparés selon la théorie de Samuel Hahnemann et répondant aux lois de l'Homéopathie à savoir :

- 1 La loi de Similitude
- 2 La loi de la dilution / dynamisation pour accéder à l'infinitésimalité
- 3 La loi de la globalité dans l'approche de la maladie

Ils appartiennent aux règnes minéral, végétal et animal et sont répertoriés dans la « Matière Médicale ». A partir de ces souches sont délivrés les « remèdes homéopathiques unitaires », distribués sous l'unique appellation de la souche et sa dilution (de la Teinture mère à 1/10éme jusqu'à la 30ème Centésimale Hahnemanienne (CH) et sous des formes galéniques diverses : solution hydro-alcoolique, granules, globules, comprimés, pommades...) Les indications de ces « unitaires » varient en fonction des dilutions et de l'individu à traiter en tenant compte de son terrain et du type de symptômes (généraux, locaux, neuro-psychiques...).

Il existe également des **spécialités** qui sont des **« complexes homéopathiques »** constitués de plusieurs souches à des dilutions basses ou moyennes et ayant des indications précises.

Ce sont des remèdes préparés selon la théorie de Samuel Hahnemann et répondant aux lois de l'Homéopathie à savoir :

- 4 La loi de Similitude
- 5 La loi de la dilution / dynamisation pour accéder à l'infinitésimalité
- 6 La loi de la globalité dans l'approche de la maladie

Ils appartiennent aux règnes minéral, végétal et animal et sont répertoriés dans la « Matière Médicale ». A partir de ces souches sont délivrés les « remèdes homéopathiques unitaires », distribués sous l'unique appellation de la souche et sa dilution (de la Teinture mère à 1/10éme jusqu'à la 30ème Centésimale Hahnemanienne (CH) et sous des formes galéniques diverses : solution hydro-alcoolique, granules, globules, comprimés, pommades...) Les indications de ces « unitaires » varient en fonction des dilutions et de l'individu à traiter en tenant compte de son terrain et du type de symptômes (généraux, locaux, neuro-psychiques...).

Il existe également des **spécialités** qui sont des **« complexes homéopathiques »** constitués de plusieurs souches à des dilutions basses ou moyennes et ayant des indications précises.

- ALLIUM CEPA COMPOSE Gouttes Buvables FL/30ML BOIRON Orale 3.068 DT ICI
- AVENOC Pommade Rectale T/30 GR BOIRON Rectale 7.445 DT [C]
- AVENOC Suppositoire B/10 BOIRON Rectale 6.586 DT [C]
- CAMILIA Solution Buvable B/10 Récipients Unidoses/1ML BOIRON Locale 6.725 DT [C]
- CEPHYL Comprimé B/20 BOIRON Orale 2.848 DT [C]
- COCCULINE Comprimé Orodispersibles B/40 BOIRON Orale 6.600 DT [C]
- CORYSALIA Comprimé Dragéifié B/40 BOIRON Orale 4.942 DT [C]
- DROSETUX Sirop FL/150 ML BOIRON Orale 6.004 DT [C]
- FORMICA RUFA COMPOSE Gouttes Buvables F/30 ML BOIRON Orale [C]
- GASTROCYNESINE Comprimé B/60 BOIRON Orale 7.068 DT [C]
- Gouttes homéopathiques Unitaires MG fl/125 ml 10.944 DT [C]
- Gouttes homéopathiques Unitaires TM fl/125 ml 11.289 DT [C]
- Gouttes homéopathiques Unitaires fl/30 ml 3.602 DT [C]
- Gouttes homéopathiques Unitaires Tb Dose 2.333 DT [C]
- Granules homéopathiques Unitaires Tube 2.814 DT [C]

- Homéogène 9 comprimés b/60 BOIRON Orale 5.869 DT [C]
- HOMEOPLASMINE Pommade Dermique T/18 GR BOIRON Locale 3.706 DT [G]
- HOMEOVOX Comprimé Dragéifié B/60 BOIRON Orale 5.010 DT [C]
- JENOVERINE Granules B/125 GR BOIRON Orale 8.030 DT [C]
- L 114 Gouttes Buvables FL/30 ML LEHNING Orale 7.548 DT [C]
- L 52 Gouttes Buvables FL/30 ML LEHNING Orale 7.171 DT [C]
- LENICALM 75 MG Comprimé Pelliculé B/40 DOLISOS Orale 8.491 DT [C]
- MERCUR N°39 SOLUTION COMPLEXE Comp B/60 LEHNING Orale 7.239DT [C]
- OSCILLOCOCCINUM 200 Globules B/1 DOSE BOIRON Orale 2.054 DT [C]
- OSCILLOCOCCINUM 200 Globules B/6DOS/1GR BOIRON Orale 8.919 DT [C]
- OSTEOCYNESINE Comprimé B/60 BOIRON Orale 6.829 DT [C]
- PARAGRIPPE Comprimé B/60 BOIRON Orale 6.450 DT [C]
- P.H. tubes doses globules Homeopathiques BOIRON Orale 2.182 DT [C]
- P.H.U tubes doses granules Homeopathiques BOIRON Orale 2.639DT [C]
- POMMADES HOMEOPATHIQUES TUBES LEHNING Orale 1.658 DT [C]
- QUIETUDE SIROP FL/200 ML BOIRON Orale 8.337 DT [9]
- RHINALLERGY Comprimé à Sucer B/40 BOIRON Orale 6.931 DT [C]
- SEDATIF PC Comprimé B/40 BOIRON Orale 5.903 DT [C]
- SINUSPAX Comprimé B/60 LEHNING Orale 8.407 DT [C]
- SPORTENINE Comprimé à Croquer B/22 BOIRON Orale 7.822 DT [C]
- STODAL Sirop FL/200 ML BOIRON Orale 8.165DT [C]
- TEINTURES MERES FL/125ML LEHNING Orale 10.944 DT [C]
- TEINTURES MERES MACERAT GLYCERINGES FL/250ML LEHNING Orale 14.738 DT [9]
- TUBES GRANULES LEHNING Orale 2.814 DT [C]
- TUBES DOSES LEHNING Orale 2.333 DT [C]

16.2. -LES OLIGO-ELEMENTS

Ce sont des minéraux (métaux ou métalloïdes) présents naturellement dans les organismes vivants et administrés à doses faibles ou très faibles et destinés selon le cas soit à pallier à des déficits pondéraux de ces oligo-éléments, soit (selon la théorie du Dr Ménétrier) à induire des « stimulations » des systèmes enzymatiques fondamentaux dans les fonctions métaboliques et/ou endocrines, dans le but de réactiver les fonctions immunitaires et d'adaptation.

- OLIGOSTIM CUIVRE 31 μG Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.275 DT ^[C]
- OLIGOSTIM CUIVRE OR ARGENT Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 8.407 DT [C]
- OLIGOSTIM LITHIUM Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.275 DT [C]
- OLIGOSTIM MAGNESIUM Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.275 DT [C]
- OLIGOSTIM MANGANESE Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.275 DT [C]
- OLIGOSTIM MANGANESE COBALT Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.882 DT [C]
- OLIGOSTIM PHOSPHORE 68 μG Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 6.820 DT I^CI
- OLIGOSTIM POTASSIUM 19 μG Comprimé Sublingual B/40 BOIRON Orale 6.820 DT [C]
- OLIGOSTIM SOUFRE 15 µG Comprimé Sublingual B T/40 BOIRON Orale 7.275 DT [C]
- OLIGOSTIM ZINC 32 μG Comprimé Sublingual B T/40 BOIRON Orale 7.275 DT [C]
- OLIGOSTIM ZINC CUIVRE Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 7.882 DT ICI
- OLIGOSTIM ZINC NICKEL COBALT Comprimé Sublingual T/40 BOIRON Orale 8.407 DT I^{CI}

16.3. – LES MEDICAMENTS DE PHYTOTHERAPIE

La Phytothérapie est la **thérapeutique par les plantes**. C'est une discipline **allopathique** destinée à prévenir et à traiter certains **troubles fonctionnels** et/ou certains **états pathologiques** au moyen de plantes, de parties de plantes ou de préparations à base de plantes.

Les médicaments de Phytothérapie ou à base de plantes peuvent s'inscrire dans deux domaines distincts d'indications thérapeutiques :

- 1. des indications de première intention, notamment pour traiter de nombreuses affections bénignes
- 2. des indications liées à une thérapeutique de **complémentarité** : la Phytothérapie est en effet un excellent **complément** dans le traitement **d'affections plus sévères** ou au cours de traitements pénibles.
 - ARKOGELULE AUBELINE Gélule B/45 ARKOPHARMA Orale 6.500 DT [G]
 - CALENDULA PAR DIGESTION Pommade Dermique T/20GR BOIRON Locale 2.848 DT [C]
 - CICADERMA Pommade Dermique T/30 GR BOIRON Locale 5.422 DT [C]
 - ELUSANES PENSEE SAUVAGE Gélule FL/30 PIERRE FABRE Orale 7.567 DT [C]
 - ELUSANES VIGNE ROUGE Gélule FL/30 PIERRE FABRE Orale 7.567 DT [C]
 - GINSENG ALPHA 500 MG Gélule B/32 PHARMAGHREB Orale 5.400 DT [C]
 - GOUTTES AUX ESSENCES Gouttes Buvables FL/45 ML PIERRE FABRE MEDICAMENTS Orale 6.931 DT [C]
 - MUCIVITAL Gélule B/45 ARKOPHARMA Orale 6.500 DT [C]
 - POMMADE A L'ARNICA 4% Pommade Dermique T/20 GR BOIRON Locale 2.848 DT [C]

16.4. - MEDICAMENTS UTILISES DANS LA MENOPAUSE

La bêta-alanine, acide aminé pur, agirait sur les phénomènes de vasodilatation périphérique comme inhibiteur non hormonal des bouffées de chaleur de la ménopause. Le médicament sera administré pendant des périodes de 5 à 10 jours jusqu'à inhibition des bouffées de chaleur. Lors de la réapparition de celles-ci, une nouvelle cure médicamenteuse redevient nécessaire pendant une même période.

Le véralipride est un neuroleptique, produit non hormonal et non stéroïdien indiqué pour le traitement des bouffées vasomotrices invalidantes associées aux manifestations psychofonctionnelles de la ménopause confirmée.

BETA-ALANINE

• ABUFENE 400 MG Comprimé B/30 BOUCHARA-RECORDATI Orale 5.550 DT [E]

16.5. - MEDICAMENTS UTILISE DANS LA CRISE VERTIGINEUSE

16.6. - MEDICAMENTS AGISSANT SUR LA MUSCULATURE UTERINE

16.6.1 - Ocytociques

L'ocytocine est indiquée pour la stimulation du travail en cas d'insuffisance de contractilité utérine, et pour la prévention ou le traitement d'hémorragies du post-partum. Etant donné le risque d'hyperstimulation avec hypoxie foetale, l'administration ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. L'emploi d'ocytocine augmenterait l'incidence d'hyperbilirubinémie chez le nouveau-né, surtout chez le prématuré.

La méthylergométrine est un alcaloïde de l'ergot de seigle utilisé par voie parentérale ou orale pour la prévention ou le traitement de l'hypotonie utérine et des hémorragies du post-partum. Elle provoque parfois une élévation tensionnelle et peut être responsable de douleurs angoreuses. Elle ne sera pas administrée en cas d'hypertension, par ex. dans l'hypertension gravidique.

Contrairement à l'ocytocine, la dinoprostone (prostaglandine E_2) stimule la musculature utérine à n'importe quel moment de la grossesse. Elle est utilisée e.a. en cas de môle hydatiforme, de mort in utero et dans la pré-induction et l'induction du travail.

METHYLERGOMETRINE

- METHERGIN 0,20 MG/ML Solution Injectable B/5/1 ML NOVARTIS TA Parenterale 5.439 DT [E]
- METROL 0,25 MG/ML Gouttes Buvables Fl/20 ML SIMED TA Orale 3.300 DT [E]

OXYTOCINE

OXYTOCINE 5 UI Solution Injectable B/5/1 ML GEDEON RICHTER TC Parentérale 1.883 DT [E]

DINOPROSTONE

• PREPIDIL GEL STERILE INTRACERVICAL 0.500 MG/2.5ML Gel Vaginal SER/2.5 ML+ catheter PFIZER HOLDING FRANCE TA Locale H 59.638 DT [E]

16.6.2. - Tocolytiques

Parmi les substances β_2 -mimétiques, est proposé pour son action relaxante sur l'utérus gravide, le salbutamol (voir Médicaments utilisés dans l'asthme et la BPCO).

En cas d'hyperactivité utérine prématurée, ces β_2 -mimétiques peuvent être essayés, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication à prolonger la grossesse ou de contre-indication maternelle (tachycardie, thyréotoxicose...). En cas de perfusion intraveineuse, une surcharge volémique doit être évitée. Les menaces d'avortement survenant au cours du premier trimestre ne sont pas une indication. La posologie sera fonction de la réponse individuelle.

Les effets indésirables des β₂-mimétiques chez la mère sont: tachycardie, agitation, tremblements, nausées, sudation, congestion faciale, hyperglycémie et hypokaliémie. Les nouveau-nés peuvent présenter des tremblements ainsi que de l'hyperglycémie et de l'acido-cétose.

Des *antiinflammatoires non stéroidiens* sont parfois utilisés pour une tocolyse de courte durée, de préférence avant la 34^{ème} semaine de la grossesse. Avec ces médicaments, il y a risque de fermeture prématurée du canal artériel et influence possible sur la coagulation chez l'enfant à naître.

SALBUTAMOL

- SALBUMOL 1 MG Suppositoire B/12 GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Rectale 2.112 DT [E]
- SALBUMOL 0.500 MG Solution Injectable B/6/1 ML GLAXOSMITHKLINE FRANCE TA Parentérale 1.981 DT [E]

16.7. - SPERMICIDES

Les préparations spermicides seules ne suffisent pas, mais elles augmentent la sécurité contraceptive des préservatifs mécaniques et des dispositifs intra-utérins.

BENZALKONIUM CHLORURE

- PHARMATEX 18.900 MG Ovule B/20 INNOTECH INTERNATIONAL Locale 7.650 DT [I]
- PHARMATEX 2.400 GR Crème Gynecologique T/6/4.5 GR INNOTECH INTERNATIONAL Locale 5.585 DT [I]

ALDACTONE.......34 Index 5-FLUOROURACIL 193 ALFA AMYLASE 97 ABBOTICINE 162 ALFACALCIDOL......205 ABILIFY 108 ALFENTANIL......198 ABUFENE 245 ALFUZOSIN65, 66 ACARBOSE 147 ALFUZOSINE......65 ACENOCOUMAROL 42 ALGESIC 82 ACETAZOLAMIDE228 ALGINATES 53 ALGISEDAL 85 ALLERGAMINE 121 ACETYLSALICYLATE DE LYSINE 84 ALLERGENES 190 ALLERGICA 122 ACIDE ALGINIQUE......53 ALLERGODIL 80 ACIDE ASCORBIQUE204, 205 ALLERGUS 122 ACIDE BORIQUE230 ALLIUM CEPA COMPOSE......242 ACIDE CLAVULANIQUE 159 ALLOPURINOL......96 ALPHAGAN......227 ACIDE MEFENAMIQUE90 ALPRAZOLAM 103 ACIDE N-ACETYL-ASPARTYL-GLUTAMIQUE ALTEPLASE......43 ACIDE NIFLUMIQUE91, 215 ALTIZIDE......35 ACIDE SALICYLIQUE.....214, 216, 218, 222, 234 ALUMINIUM OXYDE 53 ACIDE TIAPROFENIQUE 88 ALUMINIUM PHOSPHATE......53 ACIDE URIDINE-5' TRIPHOSPHORIQUE 95 ACIDE VALPROIQUE......117 ALVERINE CITRATE...... 55 ACTAPULGITE 52 AMANTADINE 115 ACTIFED 78 ACTIFED VITAMINE C 79 AMARYL 147 ACTISOUFRE 80 AMBROGAM 77 AMBROXOL 77 AMETYCINE 192 AMISULPRIDE107 AMITRIPTYLINE 110 AMLODIPINE24, 31 ADAPALENE217 ADENOSINE 95 AMOROLFINE 211 AMOXICILLINE......155, 159 ADOLINE 82 ADRIBLASTINE 194 AMPHOTERICINE B 174 AKINETON 115 ANALGAN......82, 85, 86 ANASTROZOLE 133

ANDROCUR	139	AURICULARUM	231
ANDROTARDYL	138	AURIPAX	232
ANESTANE	197	AVAMYS	
ANGIOTEC	27	AVENOC	
ANGIOZIDE		AVLOCARDYL	
ANGORAL		AVODART	
ANSEMID		AVONEX	
ANTACID		AVONEX	
ANTHACYANOSIDES		AZANTAC	
ANTHOCYANOSIDES		AZATHIOPRINE	
ANTILIP		AZELASTINE	
ANTIMONIATE DE MEGLUMINE		AZITHROCINE	
ANXIOMYL		AZITHROMYCINE	
APIDRA SOLOSTAR		AZIX	
APO-AMITRIPTYLINE		AZOPT	
APRACLONIDINE		AZRO	
APRANAX		AZYTER	
APROVEL		B.C.G VACCINE SSI	
APROZAR		BACLOFENE	
APYREX		BACTALL	
APYROSIS		BACTICID	
ARACYTINE		BACTRIM	
ARAVA		BACTROBAN	
		BACTYL	
ARAVEN			
ARGENT COLLARGOL		BALKAPROFEN	
ARGENT COLLOIDAL		BARYUM SULFATE	
ARGININE ASPARTATE		BASDENE	
ARGININE CHLORHYDRATE		BAUME AROMA	
ARGINO B		BAUME CALMOL	
ARHIN		BECLOJET	
ARICEPT		BECLOMETASONE	
ARIMIDEX		BECONASE	
ARIPIPRAZOLE		BEDELIX	
ARKOGELULE AUBELINE		BELARA	
ARNICA		BELLADONA	
AROMASINE		BENZALKONIUM	,
ARTELAC		BENZALKONIUM CHLORURE	
ARTICAINE	237	BENZATHINE BENZYLPENIC	ILLINE 154
ARTOTEC		BENZOATE DE BENZYLE	
ASCABIOL	212	BENZOSEPT	222
ASCALOL	212	BENZYDAMINE	91, 216, 234
ASCAPOUDRE		BENZYLPENICILLINE	154
ASCORBATE DE CALCIUM	206	BENZYLTHIOURACILE	131
ASCORBATE DE DL-LYSINE	206	BETA-ALANINE	245
ASPEGIC	84, 85	BETACAROTENE	230
ASPIRINE	84	BETADINE	208, 236
ASTRADOL	99	BETAFERON	123
ATACAND	27	BETAHISTINE	122
ATARAX	104	BETAMETHASONE1	28, 213, 214, 215
ATENOLOL		BETASERC	
ATEPADENE	,	BETASITOSTEROL	
ATIMOS		BETAVIDINE	
ATOR		BETAXOLOL	
ATORVASTATINE		BETOPTIC	,
ATRACURIUM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BIAFINE	
ATRICAN		BICALUTAMIDE	
ATTAPULGITE DE MORMOIRON AC		BICLOTYMOL	
AUREOMYCINE		BICNU	
TO REOM LOUNE	209	DIOI10	132

BIMATOPROST	228	CALYPTINE	78
BIOCINE TEST PPD		CAMILIA	242
BIOGYL	163	CAMPHRE	
BIPERIDENE	115	CAMPTO	194
BIPERIDYS	57	CAMYSTEN	
BIPRETERAX	31	CANDESARTAN CILEXETIL	27
BI-PROFENID	89	CANSARTAN CILEXETIL	31
BIRODOGYL		CAPOCARD	
BISOPROLOL		CAPRIL	
BI-SPIRAZOL		CAPSICUM	
BI-SPIROGYL	163	CAPTODIAMINE	
BISTERYL		CAPTOPRIL	
BI-TIAPRAM		CAPTO-PRIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BI-TILDIEM		CAPTOZID	
BLOPRESS		CARBACTIVE	
BOLDINE	<i>'</i>	CARBAMAZEPINE	
BONEFOS		CARBOCISTEINE	
BORATE DE SOUDE		CARBOGAM	
BOTOX	,	CARBOMERE	
BRICANYL		CARBOPHOS	
BRIMONIDINE		CARBOPLATINE	
BRINZOLAMIDE		CARBOSTINE	
BROMAZEPAM		CARBOSYLANE	
BROMHEXINE		CARDENSIEL	
BROMISOL		CARDEPINE	
BROMOCRIPTINE		CARDILOL	
BROMOLACTOBIONATE DE CA		CARDOMINE	
BROMOLACTOBIONATE DE CAL		CARDOX	
BROMURE D'IPRATROPIUM		CARDULAR	
BRONCHOCINE		CARMELLOSE	
BRONCHOFYLINE		CARMUSTINE	
BRONCHOTHIOL		CARPILO	
BUDESONIDE		CARRAGHAHEEN	
BUPICAINE		CARTEOL	
BUPIVACAINE		CARTEOL LP	
BUPROFEN		CARTEOL LP	
BUSCOPAN		CARVEDILOL	
BUSULFAN		CASODEX	
BUTYLHYOSCINE BROMURE C.LENS		CATA DDISCANI	
		CATAPRESSAN	
CAPEDIE		CEBEMYXINE	
CAFENO.		CEBESINE	
CALCENTI.		CEBUTOL	
CALCIBRONATE		CEBUTRAL	
CALCIEACT		CEDROX	
CALCIPOTPIOL		CEFALEYINE	
CALCITONING	,	CEFALEXINE	
CALCHIM		CEFAZOI	
CALCIUM		CEFAZOL DIE	
CALCIUM CARBONATE		CEFAZOLINE	
CALCIUM GLUCONATE		CEFIXIME	
CALCHDEOL DIAT		CEFOTAXIME	
CALCIUMFOLINAT		CEFOTIM	
CALENDULA		CEFPODOXIME	
CALENDULA PAR DIGESTION		CEFTAZIDIME	
CALMACIDE		CEFTRIAXONE	
CALMATUX	,	CEFUROXIME	
CALPEROS	201	CELEBREX	91

CELECOXIB	91	CLAMOXYL	155
CELESTAMINE	128	CLAMYCINE	
CELESTENE	128	CLARANTIN	
CELIPROL		CLARID	
CELIPROLOL		CLARITHROMYCINE	
CELLUVISC		CLAVOR	
CELOPRAM		CLEDOS	
CELOXX		CLENIL	
CEMIL		CLIDINIUM	
CEPHYL		CLIMASTON	
CERNEVIT		CLINDAMYCINE	
CERULYSE.		CLIPTOL	
CERVARIX		CLOBAZAM	
CETAMOL		CLOBETASOL	
CETHOXINIUM		CLOBEVATE	
CETIRIZINE		CLOBEX	
CETRIX		CLODRONATE	
CETRORELIX		CLOMIFENE	
CETROTIDE		CLOMIPRAMINE	
CHARBON		CLONAZEPAM	
CHEFIX		CLONIDINE	
CHIBRO-PROSCAR		CLOPIDOGREL	
CHLORDIAZEPOXIDE		CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE	
CHLORHEXIDINE208,209,222,2		CLOTRIMAZOLE	
CHLORHYDRATE DE LIDOCAINE .		CLOZAPINE	
CHLORMADINONE		CO-ALGESIC	
CHLOROCRESOL		COAPROVEL	
CHLOROHISTOL		COAPROZAR	
CHLOROQUINE		COARAVEN	
CHLOROTHIAZIDE		COCCULINE	
CHLORPHENIRAMINE		CODEINE CAMPHOSULFONATE	
CHLORPROMAZINE		CODENFAN	
CHLORTALIDONE		CODOLIPRANE	
CHLORTETRACYCLINE		COLCHICINE	
CHLORURE DE CALCIUM		COLCHICINE OPOCALCIUM	
CHLORURE DE CALCIUM		COLDEX	
CHLORURE DE SODIUM		COLECALCIFEROL	
CHOLINE		COLIMYCINE	
CHONDROITIN		COLLARGOL	
CHONDROITINE		COLLODION	
CICADERMA		COLLUXID	
CICLOPIROXOLAMINE		COLLYRE BLEU LAITER	
CICLOSPORINE		CO-LOSAR	
		CO-LOSARTAN	
CIFLOXET		COLOSPASMYL	
CINCOR		COMBIGAN	
CINKASA		CO-MEDZAR	
		CO-MEDZAR FORT	
CINODERM			
CIPRACTINE		CONNECTED IN A	
CIPRO CIPRO ATTE	,	CONNETTIVINA	
CIPROFIBRATE		CONVERTAL	
CIPROFLOXACINE		CO-OLMETEC	
CIPEA DINE		COPP A PONE	
CIPTADINE		CORDARONE	
CISATRACURIUM		CORICIDE LE DIABLE	
CISPLATINE		CORICIDE VERRUCIDE LIQUID	
CITALOPRAM		COROTROPE	
CITRULLINE	206	CORRECTOL	230

CORTEF	128	DELAPRIL	30
CORTEMA	213, 214	DENIR	
CORTINASE	80	DENSICAL	201
CORTIS	72	DEPAKINE	117
CORTIVAZOL	128	DEPAMIDE	117
CORYSALIA	242	DEPROXYL	112
COSOPT	228	DEQUINONE	220
COTAREG	31	DERMATIN	
COTRIMOX	168	DERMOBACTER	208
COTRIMOXAZOLE	168	DERMOCORT	
COVATINE	104	DERMOCUIVRE	219
COVERSYL		DERMOSALIC	
CO-ZARTAN		DERMOSONE	
CO-ZARTAN FORT		DERMOVIT A+D	,
CREME DECONTRACTANTE LAINO		DEROXAT	
CREON		DESFERAL	
CRESTOR		DESLOR	
CROTAMITON		DESLORATADINE	
CUIVRE SULFATE		DESMOPRESSINE	
CURACNE		DESOMEDINE	
CURARIUM		DESONIDE	
CUTERPES		DETRUSITOL	
CYCLADOL		DETURGYLONE	
CYCLO		DEXACOL	
CYCLOCOL		DEXAMEDIS	
CYCLODEX		DEXAMETHASONE128, 2	
CYCLOGEST		DEXAMEX	
CYCLOPENTOLATE		DEXCHLORPHENIRAMINE	
CYCLOPHOSPHAMIDE		DEXERYL	
CYPROHEPTADINE		DEXONE	
CYPROTERONE		DEXTROMETHORPHANE	
CYSTEINE		DIABENORM	
CYSTINA		DIABENYL	
CYTARABINE		DIABIREL	
CYTEAL		DIAFORMINE	
CYVAX		DIAFUSOR	
DACUROSE		DIAMEZID	
DAFLON		DIAMICRON	
DAIVOBET		DIAMOX	
DAIVONEX		DIANE	
DAKIN		DI-ANTACID	
DAKTARIN		DIARETYL	
DALACINE		DIARRYL	
DALACINE T TOPIC		DICETEL	
DALTEPARINE SODIQUE		DICLOCED	
DANATROL		DICLOFEN	
DANAZOL		DICLOFENAC	
DAONIL		DICLOPAL	
DEBRICOL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEBRIDAT		DICLORIUM DICYNONE	
DECAPEPTYL		DIDANOSINE	
DECONTRACTYL			
		DIFFERINE DIFLU4	
DECUTAN			
DEFERIPRONE		DIFLUZOI	
DEFENDAMINE		DIFLUZOL	
DEFLATINE		DIFRAREL	
DELABRIDE		DIGOXINE	
DELAPRIDE	30	DIHYDROERGOCRYPTINE	3/

DIHYDROERGOTAMINE	36, 120	DYSMAN	90
DIHYDROERGOTOXINE		DYSPORT	
DIHYDROGENOPHOSPHATE DE SOD	IUM 59	EAU OXYGENEE	
DILATRANE		EBETAXEL	195
DILTIAZEM		EBETREXAT	
DINALEXIN		EBETREXATE	
DINOPROSTONE		ECAZIDE	
DIOGAM		ECONAZOLE	
DIOSMECTINE		ECOREX	,
DIOSMINE		ECOZYL	
DIOSTAR		EFAVIRENZ	180
DIPHENHYDRAMINE		EFFERALGAN	83, 85, 86
DIPIPERON		ÉLÉTRIPTAN	
DIPROSTENE		ELLEACNELLE	
DISOPYRAMIDE		ELOXATINE	
DITROPAN		ELUSANES PENSEE SAUVAGE	
DIUREX		ELUSANES VIGNE ROUGE	
DIVARIUS		EMADINE	
DOBUTAMINE		EMEDASTINE	
DOCETAXEL		EMLA	
DOCUSATE SODIQUE		EMPLATRE	
DOGMATIL		ENALAPRIL	
DOLEL		ENAPRIL	
DOLGIT		ENBREL	
DOLI RHUME		ENOXA	
DOLIPREX		ENOXACINE	
DOLVEN		ENOXAPARINE	
DOMPER		ENOXOR	
DOMPERIDONE		ENTACAPONE	
DONEPEZIL		EOSINE	
DOPAMINE		EOSINE AQUEUSE GIFRER ET BA	
DOPANORE		EPHEDRINE	
DOPERAN		EPIRUBICINE	
DOPEZIL		EPIVIR	
DOPRID		EQUANIL	
DORSOLAMINE		EQUORAL	
DORZOLAMIDE		ERCEFURYL	
DOTAREM		ERGOCALCIFEROL	
DOXAZOSINE		ERGOKOD	
DOXORUBICINE		ERYFLUID	
DOXY		ERYSOL	
DOXYCYCLINE		ERYTHRO	
DRILL75		ERYTHROCINE	
DROSETUX		ERYTHROMYCINE	
DROSPIRENONE		ERYTHROPOIETINE HUMAINE	
DT POLIO		ESCITALOPRAM	
DUAC ONCE DAILY		ESMERON	
DULCIPHAK		ESOMEPRAZOLE	
DUOFILM		ESOPREX	
DUOTRAV		ESSENCE DE TEREBENTHINE	
DUOVISC		ESSENCES NATURELLES	
DUPHALAC		ESTRADIOL	
DUPHASTON		ETAMSYLATE	,
DUROGESIC		ETANERCEPT	
DUSPATALIN		ETHACRIDINE	
DUTASTERIDE		ETHINYLESTRADIOL	
DYDROGESTERONE		ETHYLE CHLORURE	
DYDROGESTRONE		ETHYLERGOMETRINE	

ETIFOXINE 104	FLOXAPEN	154
ETILEFRINE	FLOXYFRAL	
ETOPOSIDE 194	FLUARIX	
EUCALYPTOL	FLUCAND	
EUCAMPHINE	FLUCAZOLE	
EUCARBON61	FLUCLOXACILLINE	
EULEXINE 139	FLUCON	
EUPHON74	FLUCONAZOLE	
EVISTA93	FLUDERM	
EXELON124	FLUDEX	
EXEMESTANE 134	FLUDROCORTISONE	
EXFORGE31	FLUKAS	
EXT DE PIYGEUM AFRICANUM66	FLUOCARIL	
EXT DE RUSCUS ACULEATUS39	FLUOCINONIDE	
EXTENCILLINE	FLUOR	
EXTRAIT DE RUSCUS ACULEATUS39	FLUOROMETHOLONE	
EXTRAIT FLUIDE DE MELILOT	FLUOROURACILE	
Facteur IX PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE B	FLUOXETINE	
43	FLUSKIN	
Facteur VIII PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE A	FLUTAMIDE	
43	FLUTICASONE	
Facteur VIII PURIFIE ANTIHEMOPHILIQUE A	FLUTICASONE	
43	FLUVASTATINE	
FALOXIM	FLUVOXAMINE	
FAMODAR49	FLUXA	
FAMODINE 49	FOLICUM	
FAMOTIDINE49	FOLINATE DE CALCIUM	
FARMORUBICINE	FONGICIL	
FEFOL	FORADIL	
FELDENE90	FORENE	
FEMARA	FORLAX	
FENADEX 122	FORMICA RUFA COMPOSE	
FENAMYL90	FORMIDIAB	
FENDOL90	FORMOTEROL	
FENOFIBRATE 45	FORTRANS	
FENTANYL	FOSALEN	
FER	FOSAVANCE	
FER PLUS 199	FOSFOCINE	
FER UCB	FOSFOMYCINE	
FEREDETATE DE SODIUM 199	FOSTER	
FERRIPROX	FRAKIDEX	
FERVEX79	FRAMYCETINE	
FEXOFENADINE 122	FRAXIPARINE	
FIBRINOGENE	FRAXODI	
FINASTERIDE66	FRUBIOSE CALCIQUE	
FIVASA	FSH	
FIXICAL 201	FUCIDINE	
FLAGYL	FUCITHALMIC	
FLANID	FUCIVAL	
FLECAINE 19	FUMAFER	
FLECAINIDE	FUNGIZONE	
FLEET PHOSPHO-SODA	FUNZOL	
FLIXONASE	FUNZOLFURADANTINE	
FLIXOTIDE72	FUROLIX	
FLIXOTIDE DISKUS72	FUROSEMIDE	
FLOCTAFENINE 96	FUROXEM	
FLORAN	GABA	
FLOXAMED	GABAPENTINE	
	OADAFENTINE	118

GABENTIN	118	GRISEOFULVINE	174
GABOREX	118	GUAIFENESINE	75
GADODIAMIDE	241	GYNO-PEVARYL	
GAMOFLO	167	H.E.C	
GANFORT		HALDOL	
GARDENAL		HALOPERIDOL	
GASTRAL		HALOTHANE	
GASTRAMYL	/	HAMAMELIS	
GASTROCYNESINE		HARMONRET	
GASTROSIDIN		HAVRIX	
GELATINE FLUIDE MODIFIEE		HEALON	
GELDENE		HEBERBIOVAC HB	
GEL-LARMES		HEMACTEROL	
GELOFUSINE		HEMATOPORPHYRINE	
GELUFENE		HEMI-DAONIL	
GEMCITABINE		HEPARINE SODIQUE	
GEMZAR		HEPAVAX-GENE	
GENOTONORM		HEPTAMINOL	
GENTA		HEPT-A-MYL	
GENTADAR		HESPERIDINE	
		HESPERIDINE METHYL CHALCO	
GENTAMICINE			
GENTAMYCINE		HEXABAIN	
GESTODENE		HEXABRIX	
GINKGO		HEXAMIDINE	
GINKGO BILOBA		HEXASPRAY	
GINSENG ALPHA		HEXETIDINE	
GLIBENCLAMIDE		HEXIDENT	
GLICLAZIDE		HEXOMEDINE	
GLIMEPIRIDE		HHT	
GLIMEREL	146	HISTADINE	
GLIMID		HOLOXAN	
GLIPIZIDE		Homéogène	
GLIQUIDONE		HOMEOPLASMINE	
GLITRA	146	HOMEOVOX	
GLIVEC		HUILE DE FOIE DE MORUE	219
GLUCAGEN HYPOKIT	148	HUILE DE PARAFFINE	
GLUCAGON	148	HUILE D'OEILLETTE ESTERS ET	
GLUCANTIME	179	AC.GRAS IODES	239
GLUCONATE DE CALCIUM	201	HUMIRA	63, 94
GLUCOPHAGE	147	HYALGAN	
GLUCOR	147	HYALURONATE DE SODIUM	95, 219, 230
GLUCOVANCE	147	HYDREA	193
GLURENOR	146	HYDROCHLOROTHIAZIDE	30, 31, 34
GLYCERINE		HYDROCHLOROTHIZIDE	30
GLYCEROL	219	HYDROCHLORTHIAZIDE	30
GLYCINE		HYDROCORTISONE	
GLYSS		HYDROQUINONE	
GOLDIX		HYDROSOL POLYVITAMINE	
GOMME DE STERCULIA		HYDROXOCOBALAMINE	
GONADOTROPHINE CHORIONIQUE		HYDROXYCARBAMIDE	
GONAL-F		HYDROXYCHLOROQUINE	
GONIOSOL		HYDROXYDE D'AL ET DE MG	
GOSERELINE		HYDROXYMETHYLCELLULOSE	
GOUDRON		HYDROXYZINE	
GOUTTES AUX ESSENCES		HYMOFER	
		HYPOCHLORITE DE SODIUM	
Gouttes homéopathiques Unitaires			
GRANOCYTE		HYPOLIP	
GRIPEX	/9	HYPOTEN	22

HYPOTENSYL	22, 26	INSULINE HUMAINE INSULINE ACTRA	
HYPRIL	30		
HYPROMELLOSE	229	INSULINE INSULATARD HM NPH PENI	
HYTACAND	31		
IBACITABINE	212	INSULINE MIXTARD	
IBUPHIL		INTERFERON BETA	
IBUPHIL		INTERFERON BETA-1A	189
IBUPROFEN8		INTETRIX	64
ICAZ		INTRATECT	187
IDARAC		IOBITRIDOL	239
IDARUBICINE		IOHEXOL	
IDROCILAMIDE		IOPAMIDOL	
IFOSFAMIDE		IOPIDINE	
IKARAN		IOPROMIDE	
		IOXAGLATE DE MEGLUMINE	
ILAX		IOXAGLATE DE SODIUM	
IMATINIB		IOXITALAMATE DE Na, MEGLUMINE	
IMIDAPRIL		IPERTEN	
IMIGRAN			
IMMUNO HBS		IPNODIS	
IMMUNO HBS		IPPROTON	
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE AN		IPRATROPIUM	
		IRBESARTAN	,
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE AN		IRGASAN	
	188	IRINOTECAN	
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE		IRINOTESIN	
ANTITETANIQUE	188	IRYS	
IMMUNOGLOBULINE HUMAINE		ISOBAR	
POLYVALENTE		ISOCONAZOLE	
IMODIUM		ISOFLURANE	
IMOVAX POLIO	183	ISONIAZIDE	172
IMUREL	193	ISOPTINE LP	20
INDAPAMIDE	30, 31, 33	ISOSORBIDE DINITRATE	16
INDOBIOTIC	224	ISOSORBIDE MONONITRATE	17
INDOCINE	89	ISOTRETINOINE2	17, 220
INDOCOLLYRE	224	ISOTREX	
INDOMETACINE	89, 224	ISRADIPINE	
INDOPAL	89	ITRA GYN	
INEXIUM		ITRA SKIN	
INFANRIX IPV-HIB		ITRACONAZOLE	
INFLACED		IV-FER	
INFLAGAM		IXEL	
INFLAMYL		JASMINE	
INFLIXIMAB		JENOVERINE	
INFLOCINE	,	KADERGIC	
INFLUVAC	· ·		
INIBREX		KALEORID	
INIPRAZOL		KALETRA	
		KAOLIN	
INNOHEP		KAOLOGEAIS	
INOSINE	,	KARDEGIC	
INSAPONIFIABLE D'HUILE D'AVOC.		KARVEX	
SOJA		KAYEXALATE	
INSULATARD HM NPH		KEFORAL	
INSULINE ACTRAPID H		KENACORT	
INSULINE ASPARTE		KERLONE	22
INSULINE DETEMIR		KETAXOL	22
INSULINE GLARGINE		KETIN	73
INSULINE GLULISINE		KETODERM	211
INSULINE HUMAINE	143	KETOFEN	89

KETOGEL	211	LEVURE DE SACCHAROMYCES C	
KETOMED	89		
KETOPROF	89	LEXOMIL	
KETOPROFENE	89, 216	LH	
KETOTIFENE	73	LIBRAX	54
KETUM		LIDOCAINE	64, 232, 237
KEVAL		LIDOJECT	237
KIOVIC		LINCOCINE	165
KLARIBAC		LINCOMYCINE	
KLAROMIN		LINDANE	
KLEAN		LIPANOR	
KLIPAL		LIPANTHYL	
L 114		LIPICARD	
L 52		LIPIODOL ULTRA-FLUIDE	
LABETALOL		LIPOSIC	
LACRIFLUID		LITHIUM CARBONATE	
LACRINORM		LOCAPRED	
		LOCATOP	
LACRYMED		LOCERYL	
LACRYPOS		LODEPINE	
LACRYVISC			
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS		LODOXAMIDE TROMETHAMINE	
LACTULOSE		LOMEFLOXACINE	
LAMALINE		LOPERAMIDE	
LAMICTAL		LOPINAVIR	
LAMISIL		LOPRESSOR	
LAMISILATE MONODOSE		LOPRIL	
LAMIVUDINE		LORADINE	
LAMOTRIGINE	119	LORATADINE	
LAMOTRIN	119	LORAZEPAM	
LANSOPRAL	50	LOSAR	
LANSOPRAZOLE	50	LOSARTAN	
LANTUS	144	LOVENOX	41
LANZOR	50	LOVIK	167
LARGACTIL	105	LOWRAC	24
LARMES ARTIFICIELLES	229	LOXEN	25
LASILIX		LRJ	225
LATANOPROST		LUMIGAN	
LAXAGEL		LUSOPRESS	
LEFLUNOMIDE		LUVERIS	140
LENICALM		LYRICA	
LENOGRASTIM		LYSANXIA	
LEPONEX		MABTHERA	
LERCANIDIPINE		MAG 2	
LESCOL		MAGNESIE	
LETROZOLE		MAGNESIUM	
		MAGNESIUM CARBONATE	
LEUCODENINE		MAGNESIUM GLYCOCOLLE	
LEVEMIR FLEXPEN		MAGNESIUM HYDROXYDE	
LEVOCABASTINE		MAGNESIUM HYDROXYDE MAGNESIUM SULFATE	
LEVOCETIRIZINE			
LEVOCINE		MAGNEVIST	
LEVOFLOX		MANIDIPINE	
LEVOFLOXACINE		MANTADIX	
LEVOMENTHOL		MAXIDROL	
LEVOMEPROMAZINE		MAXILASE	
LEVONORGESTREL	136, 137	MEBENDAZOLE	
LEVOPHTA		MEBEVERINE	
LEVOTHYROX		MEBO	
LEVOTHYROXINE	130	MECIR	66

MEDICAINE	238	MICROPAQUE	240
MEDISIUM	88	MICROVAL	
MEDROL	129	MIDAZOLAM	103
MEDZAR	28	MIDECAMYCINE	164
MEFENAL	91	MI-DIABENIL	145
MEGACE	135	MIFLASONE	
MEGAMAG		MIFLONIDE	
MEGESTROL		MIKOSTAT	
MEGLUMINE GADOPENTETATE		MILNACIPRAN	
MELADENINE		MILRINONE	
MELOXICAM		MINESSE	
MENAVEN		MINIRIN	
MENCEVAX ACWY		MINIRINMELT	
MENOPUR		MINOSTYL	
MENTHOL 2		MINOXITE	
MENTHOL PUR	,	MIOCAMEN	
MEPHENESINE		MIOREL	
MEPIVACAINE	238	MISOPROSTOL	
MEPIVACAINE+ADRENALINE	220	MITOMYCINE	
SCANDICAINE		MITOSYL	
MEPRAZOL		MMF	
MEPROBAMATE	,	MOBIC	
MEQUINOL		MODOPAR	
MEQUITAZINE		MOLSICOR	
MERCAPTOPURINE	193	MOLSIDOMINE	17
MERCUR N°39	243	MOMENT	88, 89
MESALAZINE	62	MOMETASONE	80
MESATEC	62	MONICOR LP	17
MESNA	196	MONOCLINE	
METACYCLINE		MONOFLOCET	
METEOSPASMYL		MONOREL	
METEOXANE		MONO-TILDIEM	
METFORAL		MONO-TILTIEM	
METFORMINE		MONTELUKAST	
METHACIN		MONTMORILLONITE BEIDELLITIQUE	
METHERGIN		MONURYLad	
METHOTREXAT		MONORT Lad MORPHINE	
METHOTREXATE		MOSCONTIN	
METHOXALENE94, I			
		MOTILIUM	
METHOXY-5 SALICYLATE D'ETHYLE		MOXAL	
METHYCLOTHIAZIDE		MOXONIDINE	
METHYLDOPA		MP	
METHYLENECYCLINE		MSB	
METHYLPHENIDATE		MUCOLARE	
METHYLPREDNISOLONE		MUCOLATOR	76
METHYLTHIONINIUM		MUCOLYSE	76
METOCLOPRAMIDE		MUCOLYTE	76
METOPROLOL		MUCOSOL	76
METROL	245	MUPIROCINE	210
METRONIDAZOLE163, 1	78, 236	MUXOL	77
MEVIROX	179	MYCOBACTERIUM BOVIS	
MEXINE	49	MYCODERM	
MG 2 PLUS		MYCOHEAL	
MIACIN		MYCOPHENOLATE	
MIBRAL		MYCOPHIL	
MICARDIS		MYCOREX	
MICARDIS PLUS		MYCOSTATINE	
MICROGYNON		MYCOSTER	
1711 OTCO 1 1 1 OT 1	13/	MITCOSIER	411

MYDRICOL	227	NORACTONE	34
MYLERAN	192	NORADRENALINE	36
MYOLASTAN	95	NORFLOXACINE	167, 223
MYOLAX	95	NORLEVO	136
MYORELAX	216	NORMACOL	58, 60
MYOZEPAM	95	NORMIX	63
MYRTECAINE		NORMOCARDIL	23
MYTOPLASTINE	218	NORMOPTIC	227
NAABAK	225	NOVACLAV	160
NAAXIA	225	NOVADOL	
NADROPARINE CALCIQUE	41	NOVAMOX	
NAFTIDROFURYL	37	NOVOMIX 30 EXPEN	
NALIDIX		NOVONORM	147
NAPHAZOLINE NITRATE		NOVORAPID FLEXPEN	
NAPROXENE		NOXEN	
NASACORT		NOZINAN	
NASONEX		NYSTATINE210,	
NATISPRAY		OCTREOTIDE	
NAUTAMINE		OESTRODOSE	
NAVELBINE	195	OESTROGEL	
NEBILET	23	OFLOCOL	223
NEBIVOLOL		OFLODIS	
NEFOPAM		OFLOMED	
NEOCILONE		OFLOXACINE	
NEO-CODION		OGYL	
NEOFUNGINE		OKACIN	
NEO-HEALAR		OLANZA	
NEOMYCINE 214, 215, 223, 225, 2		OLANZAPINE	
NEOPHRINE		OLIGOSTIM CUIVRE	
NEOPRED		OLIGOSTIM CUIVRE OR ARGEN	
NEOTIGASON		OLIGOSTIM LITHIUM	
NETILMICINE		OLIGOSTIM MAGNESIUM	
NETRAL		OLIGOSTIM MANGANESE	
NETROMICINE		OLIGOSTIM MANGANESE COBA	
NEULEPTIL	,	OLIGOSTIM PHOSPHORE	
NEURALGIN		OLIGOSTIM POTASSIUM	
NEURODOL		OLIGOSTIM SOUFRE	
NEURONTIN		OLIGOSTIM ZINC	
NICADIPINE		OLIGOSTIM ZINC CUIVRE	
NICARDIPINE		OLIGOSTIM ZINC NICKEL COBA	
NICOPASS		OLMESARTAN MEDOXOMIL	
NICOPATCH		OLMETEC	
NICOTINATE DE METHYLE		OLOPATADINE	
NICOTINE		OMEPRAZOLE	
NIFEDIPINE		OMNISCAN	,
NIFLUDERM	,	ONDANSETRON	
NIFLUGEL		ONYCAL	
NIFLUMIC		OPATANOL	*
NIFLURIL	,	OPHTALIN	
NIFROXID		OPIUM	
NIFUROXAZIDE		OPRAZOLE	
NIMBEX		ORACILLINE	
NITRENDIPINE		ORAMINE	
NITROFURANTOINE		ORAP	
NIVAQUINE		ORECYCLINE	
NOCERTONE		ORELOX	
NOOTROPYL		ORILYSE	
NORACIN		OROCAL	
			=

OROKEN	158	PENTOXIPHAT	38
OROMONE		PENTOXYFYLLINE	38
OSCILLOCOCCINUM	243	PEPSANE	
OSMOLAX		PERFALGAN	
OSMOTOL		PERIDYS	
OSPEN		PERINDOPRIL	
OSTENEL		PERMIXON	
OSTEOCYNESINE		PEROX	
OTIPAX		PEROXYDE DE BENZOYLE	
OTOFA		PERUBORE	
OTYLONIUM		PETHIDINE	
OVITRELLE		PEVARYL	
OXACIL		PHARMATEX	
OXACILLINE		PHENASPIRINE	
OXALIPLATINE		PHENAZONE	
OXAPEN		PHENIRAMINE	
OXELADINE		PHENOBARBITAL	,
OXETORONE		PHENOXYMETHYLPENICILLINE	
OXIMAL		PHENYLEPHRINE	
OXOMEMAZINE		PHILAZOLE	
OXYBOLDINE		PHLOROGLUCINOL	
OXYBUPROCAINE	230	PHOCYTAN	
OXYBUTYNINE		PHOSPHALUGEL	
OXYDE DE ZINC	218, 219	PHOSPHATE DISODIQUE.MONOSC	DIQUE
OXYTETRACYCLINE169, 210			230
OXYTOCINE	245	PHOSPHORE	
P.H	243	PHYSIOL	79
P.H.U		PHYSIOMYCINE	169
P.H.U REGNE MINERAL		PHYSIOTENS	29
P.N.D		PHYTOMENADIONE	44
PACLITAXEL		PIASCLEDINE	95
PAINOXAM		PIDOGREL	40
PANADOL	*	PILO	
PANCREATINE		PILOCARPINE	
PANOTILE		PILOLOL	
PANSORAL		PIMOZIDE	
PANTESTONE		PINAVERIUM	
PANTOPRAZOLE		PIPAMPERONE	
		PIPERACILLINE	
PARACETAMOL IDS		PIPORTIL	
PARACETAMOL IPS		PIPOTIAZINE	
PARAFFINE		PIPOTIAZINE PIPOTIAZINE PALMITATE	
PARAGRIPPE			
PARALGYL		PIRACET	
PAREXAT		PIRACETAM	
PARKIZOL		PIRALDENE	
PAROXETINE		PIRIBEDIL	
PAROXINE		PIROXEN	
PAXELADINE		PIROXICAM	
PAXETIN	112	PIVALONE	
PECTO 6	74, 75	PIVMECILLINAM	
PECTORAL	74	PIZOFEN	120
PEGASYS	189	PIZOTIFENE	120
PEGINTERFERON ALFA 2A	189	PLAQUENIL	93
PEGINTERFERON ALPHA 2B	189	PLAVIX	
PENICILLINE G		PMS CLONAZEPAM	119
PENSORDIL		PMS-BACLOFEN	123
PENTASA		PNEUMO	186
PENTAXIM		POLYDEXA	231

POLYETHYLENE GLYCOL	59	QUIETUDE	243
POLYGYNAX	236	QUIMI-HIB	
POLYMYXINE	236	QUINAPRIL	
POLYMYXINE B223, 2		RACECADOTRIL	
POLYSTYRENE SULFONATE DE SO		RAFOREX	
POLYTAR	218	RALOXIFENE	
POLYVIDONE IODEE	208, 236	RAMIPRIL	
POLYVITAMINES		RANIDINE	
POMMADE A L'ARNICA		RANITIDINE	
POMMADES HOMEOPATHIQUES		RAPIFEN	
LEHNING		RAPRIL	
POTASSIUM CHLORURE		RAXIDONE	
POVIDONE		RAZON	
PPSB		REBETOL	
PRADIS		REBIF	
PRAMIDYL		REBIF	
PRAVASTATINE		REDULIP	
PRAXILENE		RELAXIL	
PRAZEPAM		RELPAX	
PRAZINE		REMICADE	
PRAZOSINE		REMIFENTANIL	,
PREDNISOLONE		REPAGLINIDE	
PREDNISONE	, ,		
PREGABALINE		REQUIP	
		RESORCINE	
PREPIDIL		RESORCINOL	
PREVENAR		RESPIROX	
PREVENSYL		RESTAMINE	
PREVOC		RETISOL-A	
PRIFINIUM		RETROVIR	
PRILIA		RHINALLERGY	
PRILOCAINE		RHINATHIOL	
PRIMACAINE		RHINOCORT	
PRIMALAN		RHINOFEBRAL	
PRIMPERAN		RHINOFLUIMUCIL	
PRIORIX		RHINOSTOP	
PRISTINAMYCINE		RHUMAGRIP	
PRIZMA		RHUMEX	
PROFENID		RHUTA	
PROGESTERONE		RHUTAGEL	
PROGESTOGEL		RIABAL	54
PROGRAF		RIBAVIRINE	
PROMETHAZINE		RIFAMYCINE	169, 223, 232
PROPERICIAZINE	106	RIFAXIMINA	63
PROPOFOL		RIFOCINE	169
PROPRANOLOL	23	RINOCLENIL	79
PROSTAM	66	RINOSAL	80
PROTELOS	93	RISEDRONATE	92, 93
PROTOGYL	178, 236	RISPERDAL	108
PRUREX	215	RISPERIDONE	108
PSEUDOEPHEDRINE	78, 79	RITALINE	
PULMICORT		RITONAVIR	
PULMOSERUM		RITUXIMAB	
PURINETHOL		RIVASTIGMINE	
PURINOL		ROCGEL	
PYOREX		ROCURONIUM BROMURE	
PYOSTACINE		RODOGYL	
PYRANTEL		ROMAC	
QUETIAPINE		RONALIN	
Αοπιππ π.π	100	KOMALIN	114

ROPINIROLE	114	SIMETHICONE	53, 55, 61
ROSAL	111	SIMETICONE	55
ROSUVASTATINE	47	SIMVASTATINE	46
ROTARIX	185	SIMVAX	46
ROTHACIN	89	SINAPRID	107
ROUVAX	183	SINGULAIR	73
ROVAMYCINE	163	SINTROM	42
ROXAM	90, 215	SINUSPAX	
ROXIMAX	165	SKENAN	99
ROXITHROMYCINE	164, 165	SMECTA	
RUDIVAX	183	SOLACY	
RULID		SOLIAN	
RUSCOGENINES		SOLOTIK	
RUSCOLOG		SOLUGEL	
RUTOSIDE		SOLU-MEDROL	
RYTHMODAN		SOLUPRED	
SABRIL		SOMATROPINE	
SACCHAROMYCES BOULARDII		SOPHTAL	
SAIFORAL		SORBITOCHOLINE	
SAIFOXYL		SORBITOL	
SALASOPYRINE		SOUFRANE	
SALBUMOL		SOUFRE	
SALBUTAMOL		SOULADOL	
SALICYLAMIDE		SPASMED	
SALICYLATE DE CHOLINE		SPASMOCALM	
SALICYLATE DE DIETHYLAMINE		SPASMOMEN	
SALICYLATE DE METHYLE		SPIRA	
SALICYLATE DE PHENYL PROPYLE.		SPIRAMYCINE	
SALMETEROL		SPIRAZOL	
SANDIMMUM	,	SPIRIVA	
SANDOSTATINE		SPIROGYL	
SARGENOR		SPIRONOLACTONE	
SAVEROL		SPIROX	,
SCANLUX	,	SPORALIM	
SEBIPROX		SRILANE	
SECTRAL		STABLON	
SEDACORON		STALORAL	
SEDATIF		STATINOR	
SEDATYL		STER-DEX	
SELEXID		STEROGYL	
SEPTANEST ADRENALINEE		STILNOX	
SEPTEAL		STIMOL	
SEPTISAN		STOCRIN	
SERC		STODAL	
SERENOA REPENS		STREPTOMYCINE	
SERETIDE		STRESAM	
SEREVENT		STRONTIUM	
SEROPLEX		STRUCTUM	
		SUCRALFATE	
SEROQUELSEROTYL			
SERPAFAR		SUCRAZIDE SUFENTANIL	
SERTRALINE		SULFAGUANIDINE	
		SULFAGUANIDINESULFASALAZINE	
SERVAL SEVILLAR		SULFASALAZINE SULFATE DE MAGNESIUM	
SEVIKAR			
SHANVAC B		SULFATRIM	
SICCAFLUID		SULFIRAME	
SIFLOKS		SULODEXIDE	
SILDENAFIL	b /	SULPIRIDE	10/

SULPIRIL	107	TERBINAFINE	176, 211
SUMATRIPTANE	120	TERBISIL	
SUPLASYN		TERBUTALINE	,
SUPRADOL		TERCYD	
SUPRAMYLASE		TERGYNAN	
SUPRASONE		TESTOSTERONE	
SUPRASTENE		TETAGAM	
SURMONTIL		TETRACAINE	
SYMBICORT TURBUHALER		TETRACYCLINE	
SYNEPHRINE		TETRADOX	
SYNERGIC		TETRAHYDROZOLINE	
SYNFLORIX		TETRAXIM	
		TETRAZEPAM	
SYNTHOL			
T 12/8		THEOPHYLLINE	
TACROLIMUS		THIAMAZOLE	
TADENAN		THIAMPHENICOL	
TAHOR		THIMEROSAL	
TALIN		THIOBACTIN	
TALLIS	,	THIOCOLCHICOSIDE	
TAMARIN		THIOMED	
TAMIFEN		THIOPENTAL	
TAMOXIFEN		THIOPHENECARBOXYLATE	
TAMOXIFENE	133	THIOPHENICOL	
TAMSULOSINE	66	THIOVALONE	
TANAKAN		THYMOL	
TANGANIL	232	THYRO-4	130
TANIN	219	THYROZOL	
TARDIPEN	154	TIAGAM	88
TARDYFERON	199	TIANEPTINE	113
TAREG	28	TIAPRAM	88
TARGOCID	170	TIAPRIDAL	107
TAVACET	167	TIAPRIDE	107
TAVAFLOX	167	TICLOPIDINE	39
TAVANIC	167	TILBROQUINOL	64
TAVER	117	TILDIEM	25
TAXOTERE	195	TILIQUINOL	64
TAZIDINOL	38	TILL	209
TAZOBACTAM	160	TIMOLOL	227, 228
TAZOCILLINE	160	TINIDAZOLE	236
TEDEMA	111	TINZAPARINE	42
TEGELINE	187	TIORFAN	62
TEGRETOL	117	TITANOREINE	64
TEICO	170	TITANOREINE LIDOCAINE	64
TEICOPLANINE	170	TIXOCORTOL	80, 233
TEINTURES MERES	243	TOBRACOL	
TELEBRIX	240	TOBRACORT	226
TELFAST		TOBRADEX	226
TELMISARTAN		TOBRAMYCINE	
TEMESTA		TOBREX	,
TENDINYL		TOLNAFTATE	
TENOATE DE SODIUM		TOLTERODINE	
TENONITROZOLE		TOMYCOSE	
TENORDATE		TONICALCIUM	
TENORETIC		TOPAAL	
TENORMINE		TOPLEXIL	
TENSOPRIL		TORENTAL	
TENSYNEL		TORVA	
TERALITHE		TOT'HEMA	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	113	- V 1 111/1/1/1	

TOUFILEX	77	UTEPLEX	95
TOXINE BOTULIQUE	123	UTROGESTAN	135
TRAMADOL		UVIMAG	201
TRAMAL		VAAMOX	
TRANDATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VACCIN ANTI- PNEUMOCOCCIQUE.	
TRANXENE		VACCIN ANTIGRIPPE	
TRAVATAN		VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE	
TRAVOPROST		VACCIN ANTIRABIQUE	
TRETINOINE		VACCIN ANTIROUGEOLE	
TRIAMCINOLONE		VACCIN ANTIRUBEOLE	
TRIAMTERENE		VACCIN CONTRE DE L'HEPATITE A.	
TRI-B		VACCIN CONTRE LA FIEVRE THYPH	
TRICIDINE		······································	
TRICLOBACTER		VACCIN CONTRE L'HEPATITE B	
		VACCIN D+P+T	
TRICLOCARBAN		VACCIN D+T+C	
TRIFED		VACCIN D+T+CVACCIN D+T+C+P	
TRIHEXYPHENIDYLE			
TRIMEBUTINE		VACCIN D+T+C+P+HIB	
TRIMEGAM		VACCIN DTP (DTC) ADSORBE	
TRIMETAZIDINE		VACCIN HIB	
TRIMETHYLPHLOROGLUCING		VACCIN R+O+RU	
TRIMIPRAMINE	111	VAGILEN	
TRINITRINE	17	VAINCOR	
TRIPROLIDINE	78	VALACICLOVIR	179
TRIPTORELINE	141	VALECORT	213, 214
TRITAZIDE	30	VALOXINE	117
TRIVASTAL	38	VALPROMIDE	117
TROLAMINE		VALSARTAN	
TROPICAMIDE		VALSOTENS	28
TROXERUTINE		VANCO	
TRUZOPT		VANCOMYCINE	
TUAMINOHEPTANE		VASCOR	
TUBERCULINE		VASELINE	
TUBES DOSES LEHNING		VASOBRAL	
TUBES GRANULES LEHNING.		VASOCARD	
TUNOLOL		VASOGASE	
TUSSIPAX		VASOTRIM	
		VASTAREL	
TYPHERIX		VAXIGRIP	
UBISTESIN ADRENALINEE			
U-CEF		VELITEN	
UCIDERM		VENLAFAXINE	
UCIDERM PLUS		VERAPAMIL	
ULCAR		VERATROL	
ULTIVA		VERATROLE	
ULTRA-LEVURE	61	VERAX	
ULTRAVIST	240	VERAX BLU	
UN-ALFA	205	VESSEL DUE F	38
UNICAINE	237	VFEND	
UNICROM	225	VIATEC	67
UNIDEX	129	VIBRA	168
UNIGENTA		VIBRAMYCINE	168
UNIPHRINE	,	VIGABATRIN	118
UNITAG		VIGASPIR	
UPFEN		VINCRISTINE	
UPSA C		VINORELBINE	
UPSA C CALCIUM		VIRAFERONPEG	
URBANYL		VIRGAN	
		VIRG/IIV	
UROMITEXAN	190	у 11XL/1/X	144

VISIODIS	222	XYLOCAINE	237
VIT D3	93	XYZALL	122
VITAMIN E	206	YOHIMBINE	67
VITAMINE A	219, 229	YOHIMBINE CHLORHYDRATE	67
VITAMINE B1	203, 204, 206	Z ZOLE	177
VITAMINE B12	203, 204, 206	ZALDIAR	86
VITAMINE B6	201, 204	ZANIDIP	25
VITAMINE C	205, 230, 233	ZARTAN	28
VITAMINE D	201, 205, 219	ZAVEDOS	194
VITAMINE D3	205	ZECLAR	164
VITAMINE E	206, 230	ZEFFIX	180
VITAMYL	205	ZELDOX	108
VITASCORBOL SS TAMPONNE.	205	ZELITREX	179
VOCOZOLE	211	ZENEXOR	111
VOLFENAC	88	ZIDOVUDINE	180
VOLTAREN OPHTA CD	224	ZINC OXYDE	219
VOLTARENE	88	ZINNAT	157
VOLTARENE	88	ZINOX	157
VORICONAZOLE	176	ZIPRAZIDONE	108
VOTREX	88	ZITHROMAX	164
WARIACTIV-CHLORURE D'ETH	IYLE 238	ZOLADEX	141
WINRHO SDF	188	ZOLEN	107
XALACOM	227	ZOLOFT	112
XALATAN	227	ZOLOL	228
XALIPLAT	192	ZOLPIDEM	103
XAMIOL	215	ZOLTAN	67
XEDOL	88	ZOMAX	164
XEDOL EMULGEL	215	ZOVATIN	47
XYLAR	164	ZOVIRAX	224
XXI ENE	222		

ADRESSE UTILES

Ministère de la Santé Publique (MSP) :

1006 Bab Sâadoun – Tunis

Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) :

31, Rue de Khartoum 1002 le Belvédère Tunis

Tel: (+216) 71 783 195 / 781 487 / 790 639

Fax: (+216) 71 797 816 E-mail: dpm@rns.tn

Direction de l'Inspection Pharmaceutique (D.I.P):

5, 7 Rue de Kharthoum 1002 le Belvédère Tunis

Complexe Diplomat, 11^{ème} Etage

Tél: (+216) 71 84 00 42 / 71 84 00 44

Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (L.N.C.M):

11, Rue Jebel Lakhdar

1006 Bab Sâadoun - Tunis

Tél: (+216) 71 57 01 17

Compte: C.C.P (Compte Courant Postal) 17.001.0000000 26.35.50.88

Centre National de Pharmacovigilance (C.N.P.V):

Sis Hôpital Charles Nicolle

Boulevard 9 Avril 1938

1006 - Tunis

Tél: (+216) 71 56 47 63

Pharmacie Centrale de Tunisie (P.C.T):

Avenue 10 Décembre 1948

1082 Cité Mahrajène - Tunis

Tél: (+216) 71 78 30 11

Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (A.N.C.S.E.P):

2 Rue Ibn Nadim – Montplaisir - Tunis

Tél: (+216) 71 90 39 42 / 71 90 37 98

Fax: (+216) 71 90 92 33

• Chambre Nationale de l'Industrie Pharmaceutique (C.N.I.P):

UTICA

17, Rue Abderrahmen Jaziri

1002 Belvédère - Tunis

Tél: (+216) 71 79 34 32

• Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (C.N.O.P):

Maison du Pharmacien

56, Rue Ibn Charaf

1002 Belvédère - Tunis

Tel: (+216) 71 795 722

Fax: (+216) 71 790 847

• Conseil National de l'Ordre des Médecins (C.N.O.M) :

16, Rue de Touraine

1082 - Tunis

Tel: (+216) 71 792 736

Fax: (+216) 71 788 729

• Conseil National de l'Ordre des Médecins Dentistes (C.N.O.M.D) :

68, Avenue Farhat Hached

Escalier C 4^{ème} Etage

100 - Tunis

Tel: (+216) 71 353 638

Fax: (+216) 71 330 434